

Листовка: информация за пациента

Еторикоксиб Сандоз 30 mg филмирани таблетки
Etoricoxib Sandoz 30 mg film-coated tablets

Еторикоксиб Сандоз 60 mg филмирани таблетки
Etoricoxib Sandoz 60 mg film-coated tablets

Еторикоксиб Сандоз 90 mg филмирани таблетки
Etoricoxib Sandoz 90 mg film-coated tablets

Еторикоксиб Сандоз 120 mg филмирани таблетки
Etoricoxib Sandoz 120 mg film-coated tablets

За възрастни и юноши на и над 16 години

еторикоксиб (etoricoxib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Еторикоксиб Сандоз и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Еторикоксиб Сандоз
3. Как да приемате Еторикоксиб Сандоз
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Еторикоксиб Сандоз
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Еторикоксиб Сандоз и за какво се използва

- Еторикоксиб Сандоз е лекарство от групата лекарства, наречени селективни COX-2 инхибитори. Те принадлежат към група лекарства, наречени, нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС).
- Еторикоксиб Сандоз помага за намаляване на болката и отока (възпалението) в ставите и мускулите при остеоартрит, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит и подагра.
- Еторикоксиб Сандоз също се използва за краткотрайно лечение на умерена болка след хирургична операция.
- Еторикоксиб Сандоз е показан за употреба при възрастни и юноши на и над 16 години.



Какво представлява остеоартритът?

Остеоартритът е заболяване на ставите. То възниква вследствие на непрекъснатото разграждане на хрущяла, който покрива края на костите. Това причинява оток (възпаление), болка, чувствителност, скованост и обездвижване.

Какво представлява ревматоидният артрит?

Ревматоидният артрит е продължително възпалително заболяване на ставите. Причинява болка, скованост, подуване и нарастваща загуба на двигателна способност в засегнатите стави. Може да причини също възпаление в други части на тялото.

Какво представлява подагратата?

Подагратата е заболяване с внезапни, рецидивиращи пристъпи на силно болезнено възпаление и зачервяване на ставите. Причинява се от отлагане на минерални кристали в ставите.

Какво представлява анкилозиращият спондилит?

Анкилозиращият спондилит е възпалително заболяване на гръбначните прешлени и големите стави.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Еторикоксиб Сандоз**Не приемайте Еторикоксиб Сандоз:**

- ако сте алергични към еторикоксиб или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако сте алергични към нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), включително ацетилсалицилова киселина и COX-2 инхибитори (вижте "Възможни нежелани реакции", точка 4);
- ако имате активна стомашна язва или стомашно-чревно кървене;
- ако имате тежко чернодробно заболяване;
- ако имате тежко бъбречно заболяване;
- ако сте бременна или кърмите (вижте "Бременност и кърмене");
- ако сте под 16-годишна възраст;
- ако имате възпалително чревно заболяване, като болест на Крон, улцерозен колит или колит;
- ако Вашият лекар е диагностицирал проблеми със сърцето, включително сърдечна недостатъчност (умерена или тежка), стенокардия (болка в гърдите) или ако сте прекарвали сърдечен удар, операция за байпас, периферна артериална болест (нарушено кръвоснабдяване на краката, поради стесняване или запушване на артериите) или някакъв вид инсулт (включително мини инсулт или преходна исхемична атака). Еторикоксиб може слабо да повиши при Вас риска от сърдечен удар и инсулт и поради това не трябва да се използва от хора, които са имали проблеми със сърцето или са прекарвали инсулт;
- ако имате високо кръвно налягане, неконтролирано с лечение (консултирайте се със своя лекар, ако не сте сигурни дали кръвното Ви налягане е адекватно контролирано)

Ако считате, че някои от горните състояния се отнасят за Вас, не приемайте таблетките преди да се консултирате с лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Еторикоксиб Сандоз, ако някое от следните състояния се отнася за Вас:

- имали сте стомашно кървене или язва;
- обезводнени сте, например поради продължително повръщане или диария;
- имате отоци, поради задръжка на течности;
- имали сте сърдечна недостатъчност или друга форма на сърдечно заболяване;



- имали сте високо кръвно налягане. Еторикоксиб Сандоз може да повиши кръвното налягане при някои хора, особено във високи дози и затова Вашият лекар ще каже, че е необходимо да проверява редовно стойностите на кръвното Ви налягане;
- имали сте чернодробно или бъбречно заболяване;
- провеждате лечение на инфекция. Еторикоксиб може да маскира или да прикрие състояние на повишена температура, което е признак на инфекция;
- Вие сте жена, която се опитва да забременее;
- Вие сте в старческа възраст (т.е. над 65-годишна възраст);
- имате диабет, висок холестерол или пушите. Това може да повиши риска от сърдечно заболяване.

Ако не сте сигурни дали някое от горепосочените се отнася за Вас, **консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете Еторикоксиб Сандоз**, дали това лекарство е подходящо за Вас.

Еторикоксиб Сандоз действа еднакво добре при възрастни и млади пациенти. Ако сте в старческа възраст (т.е. над 65-годишна възраст), Вашият лекар ще Ви каже, че е необходимо да Ви преглежда редовно. Не е необходима корекция на дозата при пациенти в старческа възраст.

Други лекарства и Еторикоксиб Сандоз

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Вашият лекар ще Ви каже, че е необходимо да контролира състоянието Ви, за да се увери, че лекарството действа добре, след като започнете да приемате Еторикоксиб Сандоз, особено ако приемате някое от следните лекарства:

- лекарства против съсирване на кръвта (антикоагуланти), като варфарин;
- рифампицин (антибиотик);
- метотрексат (лекарство за потискане на имунната система, често използвано при ревматоиден артрит);
- лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане и сърдечна недостатъчност, наречени АСЕ инхибитори и блокери на ангиотензиновите рецептори, например еналаприл и рамиприл, и лосартан и валсартан;
- литий (лекарство, използвано за лечение при някои видове депресия);
- диуретици (отводняващи таблетки);
- циклоспорин или такролимус (лекарства, използвани за потискане на имунната система);
- дигоксин (лекарство, за лечение на сърдечна недостатъчност и аритмии);
- миноксидил (лекарство, използвано за лечение на високо кръвно налягане);
- салбутамол под формата на таблетки или перорален разтвор (лекарство за лечение на астма);
- противозачатъчни таблетки;
- хормоно-заместителна терапия;
- ацетилсалицилова киселина, рискът от стомашни язви е по-голям, ако приемате Еторикоксиб Сандоз с ацетилсалицилова киселина;
- Еторикоксиб Сандоз може да се приема с ниска доза ацетилсалицилова киселина. Ако приемате ниска доза ацетилсалицилова киселина за предотвратяване на сърдечен удар или инсулт, трябва да не спирате приема на ацетилсалицилова киселина, докато не се консултирате със своя лекар;
- не приемайте високи дози ацетилсалицилова киселина или други противовъзпалителни лекарства, докато приемате Еторикоксиб Сандоз.

Бременност, кърмене и фертилитет

Бременност

Еторикоксиб Сандоз не трябва да се приема през периода на бременност. Ако сте бременна, ~~смятате~~ че може да сте бременна или планирате бременност, не приемайте Еторикоксиб Сандоз. ~~Ако~~ забременеете, спрете приема на Еторикоксиб Сандоз и се консултирайте с Вашия лекар. Посъветвайте се с Вашия лекар, ако не сте сигурни или се нуждаете от допълнителен съвет.



Кърмене

Не е известно дали еторикоксиб се екскретира в кърмата при хора. Ако кърмите или планирате да кърмите, консултирайте се с Вашия лекар, преди да приемете Еторикоксиб Сандоз. Ако приемате Еторикоксиб Сандоз, не трябва да кърмите.

Фертилитет

Еторикоксиб може да затрудни зачеването.

Вие трябва да информирате Вашия лекар, ако планирате бременност или имате проблеми със забременяването.

Шофиране и работа с машини

Съобщавани са случаи на замаяност и сънливост при някои пациенти, приемащи Еторикоксиб Сандоз.

Не шофирайте, ако почувствате замаяност или сънливост.

Не работете с уреди или машини, ако почувствате замаяност или сънливост.

Еторикоксиб Сандоз съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се лекаря си преди да приемете това лекарство.

3. Как да приемате Еторикоксиб Сандоз

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

За Еторикоксиб Сандоз 30 mg филмирани таблетки:

Остеоартрит

Препоръчителната доза е 30 mg (отговаря на 1 таблетка Еторикоксиб Сандоз 30 mg филмирани таблетки) веднъж дневно, която може да бъде повишена най-много до 60 mg (еквивалентно на 2 таблетки Еторикоксиб Сандоз 30 mg филмирани таблетки) веднъж дневно, ако е необходимо.

Ревматоиден артрит

Препоръчителната доза е 90 mg (отговаря на 3 таблетки Еторикоксиб Сандоз 30 mg филмирани таблетки) веднъж дневно.

Анкилозиращ спондилит

Препоръчителната доза е 90 mg (отговаря на 3 таблетки Еторикоксиб Сандоз 30 mg филмирани таблетки) веднъж дневно.

Състояния с остра болка

Еторикоксиб трябва да се използва само в периоди на пристъп на болка.

Подагра

Препоръчителната доза е 120 mg (отговаря на 4 таблетки Еторикоксиб Сандоз 30 mg филмирани таблетки) веднъж дневно, която трябва да се използва само в периоди на остра болка, като лечението е ограничено до най-много 8 дни.

Постоперативна болка след зъбна операция

Препоръчителната доза е 90 mg (отговаря на 3 таблетки Еторикоксиб Сандоз 30 mg филмирани таблетки) веднъж дневно, като лечението е ограничено до най-много 3 дни.

За Еторикоксиб Сандоз 60 mg филмирани таблетки:



Остеоартрит

Препоръчителната доза е 30 mg (не може да се постигне с концентрацията от 60 mg) веднъж дневно, която може да бъде повишена до най-много 60 mg (отговаря на 1 таблетка Еторикоксиб Сандоз 60 mg филмирани таблетки) веднъж дневно, ако е необходимо.

Ревматоиден артрит

Препоръчителната доза е 90 mg веднъж дневно. Тази дозировка не може да се постигне с Еторикоксиб Сандоз 60 mg. За лечението на ревматоиден артрит се предлага друга концентрация (Еторикоксиб Сандоз 90 mg).

Анкилозиращ спондилит

Препоръчителната доза е 90 mg веднъж дневно. Тази дозировка не може да се постигне с Еторикоксиб Сандоз 60 mg. За лечението на анкилозиращ спондилит се предлага друга концентрация (Еторикоксиб Сандоз 90 mg).

Състояния на остра болка

Еторикоксиб трябва да се използва само в периоди на пристъп на болка.

Подагра

Препоръчителната доза е 120 mg (отговаря на 2 таблетки Еторикоксиб Сандоз 60 mg филмирани таблетки) веднъж дневно, която трябва да се използва само в периоди на остра болка, като лечението е ограничено до най-много 8 дни.

Постоперативна болка след зъбна операция

Препоръчителната доза е 90 mg веднъж дневно, като лечението е ограничено до най-много 3 дни. Тази дозировка не може да се постигне с Еторикоксиб Сандоз 60 mg. За лечението на постоперативна болка след дентална операция се предлага друга концентрация (Еторикоксиб Сандоз 90 mg).

За Еторикоксиб Сандоз 90 mg филмирани таблетки:

Остеоартрит

Препоръчителната доза е 30 mg веднъж дневно, която може да бъде повишена до най-много 60 mg веднъж дневно, ако е необходимо. Тази дозировка не може да се постигне с Еторикоксиб Сандоз 90 mg. За лечението на остеоартрит се предлага друга концентрация (Еторикоксиб Сандоз 30 mg).

Ревматоиден артрит

Препоръчителната доза е 90 mg (отговаря на 1 таблетка Еторикоксиб Сандоз 90 mg филмирани таблетки) веднъж дневно.

Анкилозиращ спондилит

Препоръчителната доза е 90 mg (отговаря на 1 таблетка Еторикоксиб Сандоз 90 mg филмирани таблетки) веднъж дневно.

Състояния на остра болка

Еторикоксиб трябва да се използва само в периоди на пристъп на болка.

Подагра

Препоръчителната доза е 120 mg веднъж дневно, която трябва да се използва само в периоди на остра болка, като лечението е ограничено до най-много 8 дни. Тази дозировка не може да се постигне с Еторикоксиб Сандоз 90 mg. За лечението на подагра се предлага друга концентрация (Еторикоксиб Сандоз 120 mg).

Постоперативна болка след зъбна операция



Препоръчителната доза е 90 mg (отговаря на 1 таблетка Еторикоксиб Сандоз 90 mg филмирани таблетки) веднъж дневно, като лечението е ограничено до най-много 3 дни.

За Еторикоксиб Сандоз 120 mg филмирани таблетки:

Остеоартрит

Препоръчителната доза е 30 mg веднъж дневно, която може да бъде повишена до най-много 60 mg веднъж дневно, ако е необходимо. Тази дозировка не може да се постигне с Еторикоксиб Сандоз 120 mg. За лечението на този вид артрит се предлага друга концентрация (Еторикоксиб Сандоз 30 mg).

Ревматоиден артрит

Препоръчителната доза е 90 mg веднъж дневно. Тази дозировка не може да се постигне с Еторикоксиб Сандоз 120 mg. За лечението на ревматоиден артрит се предлага друга концентрация (Еторикоксиб Сандоз 90 mg).

Анкилозиращ спондилит

Препоръчителната доза е 90 mg веднъж дневно. Тази дозировка не може да се постигне с Еторикоксиб Сандоз 120 mg. За лечението на анкилозиращ спондилит се предлага друга концентрация (Еторикоксиб Сандоз 90 mg).

Състояния на остра болка

Еторикоксиб трябва да се използва само в периоди на пристъп на болка.

Подагра

Препоръчителната доза е 120 mg (отговаря на 1 Еторикоксиб Сандоз 120 mg филмирана таблетка) веднъж дневно, която трябва да се използва само в периоди на остра болка, като лечението е ограничено до най-много 8 дни.

Постоперативна болка след зъбна операция

Препоръчителната доза е 90 mg веднъж дневно, като лечението е ограничено до най-много 3 дни. Тази дозировка не може да се постигне с Еторикоксиб Сандоз 120 mg. За лечението на постоперативна болка след дентална операция се предлага друга концентрация (Еторикоксиб Сандоз 90 mg).

Употреба при деца и юноши

Еторикоксиб Сандоз не трябва да се приема от деца или юноши под 16-годишна възраст.

Старческа възраст

Не е необходима корекция на дозата при пациенти в старческа възраст. Необходимо е повишено внимание при пациенти в старческа възраст.

Хора с чернодробни проблеми

- Ако имате леко чернодробно заболяване, не трябва да приемате повече от 60 mg дневно.
- Ако имате умерено тежко чернодробно заболяване, не трябва да приемате повече от 30 mg дневно.

Не приемайте по-голяма от препоръчителната доза за Вашето състояние. Вашият лекар ще Ви каже, че е необходимо периодично да обсъжда с Вас лечението Ви. Важно е да използвате най-ниската доза, с която постигате контрол върху болката си и не трябва да приемате Еторикоксиб Сандоз по продължително време от необходимото. Това се налага поради риск от инфаркт или инсулт, който може да се повиши след продължително лечение, особено с високи дози.

Път/начин на приложение



Еторикоксиб Сандоз е за перорално приложение. Приемайте таблетките веднъж дневно. Еторикоксиб Сандоз може да се приема със или без храна. Началото на действието на Еторикоксиб Сандоз може да е по-бързо, когато се приема на гладно.

Ако приемете повече от необходимата доза Еторикоксиб Сандоз

Никога не трябва да приемате повече таблетки от броя, предписан от Вашия лекар. Ако приемете прекалено много таблетки, незабавно трябва да потърсите медицинска помощ.

Ако сте пропуснали да приемете Еторикоксиб Сандоз

Важно е да приемате Еторикоксиб Сандоз както е предписал Вашият лекар. Ако пропуснете доза, просто продължете с нормалната схема на следващия ден. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако забележите някоя от следните прояви, трябва да спрете приема на Еторикоксиб Сандоз и незабавно да уведомите Вашия лекар:

- задух, болка в гърдите или подуване на глезена, или при влошаването им;
- пожълтяване на кожата и очите (жълтеница) – това е признак на чернодробни проблеми;
- силна и продължителна стомашна болка или черни изпражнения;
- алергична реакция – може да включва кожни проблеми, като язва или мехурчета, или оток на лицето, устните, езика или гърлото, който може да затрудни дишането.

При лечение с Еторикоксиб Сандоз могат да се проявят следните нежелани реакции:

Много чести: (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

- болка в стомаха

Чести: (могат да засегнат до 1 на 10 души)

- сух алвеолит (възпаление и болка след изваждане на зъб);
- подуване на краката и/или ходилата, поради задръжка на течности (оток);
- замаяност, главоболие;
- палпитации (учестено или неравномерно сърцебиене), неравномерен сърдечен ритъм (аритмия);
- повишено кръвно налягане;
- хрипове или задух (бронхоспазм);
- запек, газове, гастрит (възпаление на стомашната лигавица), киселини, диария, нарушено храносмилане (диспепсия)/стомашно неразположение, гадене, повръщане, възпаление на хранопровода, язви в устата;
- промени в кръвните изследвания, свързани с черния дроб;
- кръвонасядане;
- слабост и умора, грипоподобно състояние;

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)

- гастроентерит (възпаление на стомашно-чревния тракт, което включва стомаха и тънките черва/стомашен грип), инфекция на горните дихателни пътища, инфекция на пикочните пътища;
- намален брой червени клетки, намален брой бели кръвни клетки, намален брой тромбоцити;



- свръхчувствителност (алергична реакция, включително уртикария, която може да е много сериозна и да налага незабавна медицинска помощ);
- повишен или понижен апетит, повишаване на теллото;
- тревожност, депресия, понижена мисловна способност; виждане, усещане или чуване на неща, които не съществуват (халюцинации);
- промяна на вкуса, безсъние, изтръпване или мравучкане, сънливост;
- замъглено виждане, раздразнение на очите и зачервяване;
- звънтене в ушите, вертиго (световъртеж в неподвижно състояние);
- нарушен сърдечен ритъм (предсърдно мъждене), учестен сърдечен ритъм, сърдечна недостатъчност, стягане, напрежение или тежест в гърдите (стенокардия), сърдечен удар;
- зачервяване на лицето, инсулт, мини инсулт (преходна искемична атака), изразено повишаване на кръвното налягане, възпаление на кръвоносните съдове;
- кашлица, задух, кървене от носа;
- подуване на стомаха или червата, промени в дефекацията, сухота в устата, стомашна язва, възпаление на стомашната лигавица, което може да бъде сериозно и може да доведе до кървене, синдром на раздразненото черво, възпаление на панкреаса;
- подуване на лицето, кожен обрив или сърбеж, зачервяване на кожата;
- мускулни крампи/спазми, мускулна болка/схващане;
- високи нива на калий в кръвта, промени в резултатите от изследвания на кръвта или урината, свързани с бъбреците, сериозни бъбречни проблеми;
- болка в гърдите.

Редки: (могат да засегнат до 1 на 1 000 души)

- ангиоедем (алергична реакция с подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото, която може да причини задух или затруднено преглъщане и да бъде много сериозна и да налага незабавна медицинска помощ)/анафилактични/анафилactoидни реакции, включително шок (сериозна алергична реакция, която налага незабавна медицинска помощ);
- обърканост, безпокойство;
- чернодробни проблеми (хепатит);
- ниски нива на натрий в кръвта;
- чернодробна недостатъчност, пожълтяване на кожата и/или очите (жълтеница);
- тежки кожни реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +35928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Еторикоксиб Сандоз

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката след надписа “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Помолете Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.



6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Еторикоксиб Сандоз

- Активното вещество е еторикоксиб (*etoricoxib*).
 - *Еторикоксиб Сандоз 30 mg: Всяка филмирана таблетка съдържа 30 mg еторикоксиб.*
 - *Еторикоксиб Сандоз 60 mg: Всяка филмирана таблетка съдържа 60 mg еторикоксиб.*
 - *Еторикоксиб Сандоз 90 mg: Всяка филмирана таблетка съдържа 90 mg еторикоксиб.*
 - *Еторикоксиб Сандоз 120 mg: Всяка филмирана таблетка съдържа 120 mg еторикоксиб.*
- Другите съставки са безводен калциев хидрогенфосфат, микрокристална целулоза, повидон K29-32, магнезиев стеарат, кроскармелоза натрий, хипромелоза, лактоза монохидрат, титанов диоксид (E171), триацетин.
Таблетките от 30, 60 и 120 mg също съдържат индиго кармин алуминиев лак (E132) и жълт железен оксид (E172).

Как изглежда Еторикоксиб Сандоз и какво съдържа опаковката

Еторикоксиб Сандоз филмирани таблетки се предлагат в четири концентрации

Таблетките от 30 mg са синьозелени, кръгли, двойноизпъкнали филмирани таблетки
Таблетките от 60 mg са тъмозелени, кръгли, двойноизпъкнали филмирани таблетки
Таблетките от 90 mg са бели, кръгли, двойноизпъкнали филмирани таблетки
Таблетките от 120 mg са светлозелени, кръгли, двойноизпъкнали филмирани таблетки

Опаковки от 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 филмирани таблетки в блистери или в опаковки за таблетки с капачка на винт, съдържаща сушител (силициев гел). Сушителят е предназначен да поддържа таблетките сухи и не трябва да се поглъща.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Sandoz d.d.
Verovškova 57,
1000 Ljubljana
Словения

Производители

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1,
Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben
Германия

Pharmacare Premium Ltd.
HHF 003, Hal Far Industrial Estate
Birzebbugia, BBG 3000
Малта

Този лекарствен продукт е одобрен в страните-членки на ЕИП със следните наименования:



Австрия	Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg – Filmtabletten
Белгия	Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmomhulde tabletten
България	Еторикоксиб Сандоз 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg филмирани таблетки
Чешка република	Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg
Хърватия	Etorikoksib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmom obložene tablete
Кипър	Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg
Естония	COXITOR
Финландия	Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Франция	Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg comprimé pelliculé
Германия	Etoricoxib – 1 A Pharma 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg Filmtabletten
Унгария	Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmtableta
Ирландия	Etoricoxib 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg Film-coated tablets
Латвия	Coxitor 60 mg, 90 mg, 120 mg apvalkotās tabletes
Литва	Coxitor 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg plėvelė dengtos tabletės
Люксембург	Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimé pelliculé
Нидерландия	Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmomhulde tabletten
Норвегия	Etoricoxib Sandoz
Полша	Etoricoxib Sandoz
Португалия	Etoricoxib Sandoz
Румъния	Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimate filmate
Словакия	Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg
Словения	Etorikoksib Lek 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmsko obložene tablete
Испания	Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Швеция	Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmdragerad tablett

Дата на последно преразглеждане на листовката:
ММ/ГГГГ

