

## **ЛИСТОВКА**

## Листовка: информация за потребителя

### Сарженор 1 g/5 ml перорален разтвор Sargenor 1 g/5 ml oral solution

аргинин аспартат  
(arginine aspartate)

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 15 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Сарженор и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Сарженор
3. Как да приемате Сарженор
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Сарженор
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Роз. № ..... 9800104	
Разрешение № ..... 62579 30-05-2023	
BG/MAM/P - .....	
Одобрение № .....	

#### 1. Какво представлява Сарженор и за какво се използва

Сарженор е тонизиращ лекарствен продукт, който се използва за краткотрайно симптоматично лечение на умора. Той представлява перорален разтвор, съдържащ аргинин аспартат като активно вещество.

Ако след 15 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Сарженор

##### Не приемайте Сарженор

- ако сте алергични към активното вещество или някое от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)

##### Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Сарженор.

Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към фруктоза не трябва да приемат това лекарство.

В случай, че страдате от захарен диабет или спазвате съответната диета, трябва да имате предвид, че всяка ампула съдържа 1 g захароза.



При пациенти със скорошен инфаркт на миокарда, този лекарствен продукт трябва да се приема само под лекарско наблюдение.

Този лекарствен продукт съдържа метил р-хидроксибензоат и пропилфидроксибензоат, които могат да причинят алергични реакции (евентуално забавени), обрив и уртикария.

#### **Деца и юноши**

При поява на умора при деца под 12 години, дори и при краткотрайна продължителност на лечението, трябва да се консултирате с лекар!

Лечението не трябва да продължава повече от 15 дни.

Ако умората продължава след 15-ия ден или ако забележите необичайни ефекти, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **Други лекарства и Сарженор**

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, накърно сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Този лекарствен продукт съдържа аргинин аспартат (комбинация на две аминокиселини). Тези аминокиселини се съдържат и в други лекарства. Препоръчва се да не се приемат заедно, за да се избегне евентуално предозиране.

#### **Сарженор с храна, напитки и алкохол**

Приемът на това лекарство не Ви освобождава от необходимостта да водите здравословен начин на живот – редовни физически упражнения, добре балансирана диета (главно избягвайте употребата на алкохол, никотин и/или стимуланти), редовен сън, почивка.

#### **Бременност и кърмене**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не се препоръчва употребата на Сарженор перорален разтвор по време на бременност и кърмене.

#### **Шофиране и работа с машини**

Сарженор не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

### **3. Как да приемате Сарженор**

#### **Дозировка и начин на приложение**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **Възрастни и деца над 12 години:**

До 2 – 3 ампули дневно, препоръчително преди хранене.

#### **Деца от 3 до 12 години:**

½ - 2 ампули дневно, в зависимост от възрастта.



Сарженор се приема през устата, разтворен в чаша вода, препоръчително по време на хранене.

Продължителността на лечението не трябва да надвишава 15 дни.

**Указание за употреба**

Ампулите имат маркиращи пръстени, един или повече, от двете страни, където се намира предварително определена точка на счупване.



Краят на ампулата трябва да бъде счупен в тези предварително определени точки. Разтворът изтича само при счупване на двата края!

**Ампулите могат да се отварят на ръка, следвайки стъпките по-долу:**

1. Дръжте ампулата в наклонена позиция до чашата за пиене, която ще използвате (не над нея!)
2. Счупете горния край, като го огънете с лек натиск. Използвайте хартиена кърпа, за да приложите по-силен натиск.



3. Обърнете ампулата на обратно (разтворът все още не тече)
4. Дръжте ампулата в наклонена позиция до чашата за пиене. Само счупеният край трябва да е над чашата.



5. Счупете другия край. Сега разтворът ще изтича.
6. Уверете се, че разтворът в чашата не съдържа парчета!



#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Наблюдавани са следните нежелани реакции, като честотата им не може да бъде определена:

- мехуро-подобни обриви по кожата (макулопапулозни обриви).
- повишаване нивото на глюкоза в кръвта.
- диария, повръщане, гадене (при високи дози).

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарства (ИАЛ)  
ул. Дамян Груев № 8  
1303, гр. София  
Р. България  
Тел.: +359 2 8903 417  
e-mail: bda@bda.bg  
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### **5. Как да съхранявате Сарженор**

Не се изискват специални условия на съхранение.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и алмулата след „Годен до:“ и „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

##### **Какво съдържа Сарженор**

Всяка ампула с 5 ml перорален разтвор съдържа:

- Активно вещество: 1 g аргинин аспартат. 1 ml перорален разтвор съдържа 200 mg аргинин аспартат.
- Помощни вещества: захароза, метил паракидроксибензоат (Е 218), пропил паракидроксибензоат (Е 216), есенция-кайсия, карамел (Е 150), пречистена вода.

##### **Как изглежда Сарженор и какво съдържа опаковката**

Сарженор се доставя в ампули, опаковани в картонена кутия по 20 или 40 броя. Всяка ампула съдържа 5 ml разтвор за перорално приложение.



**Притежател на разрешението за употреба и производител**

**Притежател на разрешението за употреба**

Майлан ЕООД

Офис сграда „Сердика офиси“

бул. Ситняково № 48, ет. 7

1505 София

България

**Производител**

MEDA Manufacturing

Avenue J.F. Kennedy

B.P.100, 33701 Merignac Cedex

Франция

**Дата на последно преразглеждане на листовката**

март 2023

