

Листовка: информация за пациента

Траумил S перорални капки, разтвор Traumeel S oral drops, solution

Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Траумил S и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Траумил S
3. Как да приемете Траумил S
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Траумил S
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка	Приложение 2
Крм Рег. №	20000088
Брзрешение №	- 63 804
BG/MA/MP	, 31-10-2023
Одобрение №	/

1. Какво представлява Траумил S и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Използва се при наранявания, като навсяхвания, изкълчвания, натъртвания, кръвоизливи и изливи в ставите след счупвания на костите; постоперативни и посттравматични отоци и подувания на меките части. При възпалителни и свързани с възпаления дегенеративни процеси на различни органи и тъкани особено на опорния и двигателния апарат (тендовагинит, стилоидит, епикондилит, бурсит, химероскопуларен периартрит), артроза на тазобедрените, коленните и малките стави.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Траумил S

Не приемайте Траумил S

- ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта или свръхчувствителност към арника, лайка, бял равнец или друго растение от сем. Сложноцветни.

По принцип ехинацея не трябва да се приема при прогресиращи системни заболявания като туберколоза, левкемия или левкемио-подобни заболявания, колагеноза, авто-имунни заболявания, мултиплена склероза, ХИВ инфекции, СПИН и други хронични вирусни заболявания.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Траумил S.
Ако симптомите продължат или се влошат да се преоценят лечението.



Други лекарства и Траумил S
Не са известни лекарствени взаимодействия.

Траумил S с храна, напитки и алкохол
Няма несъвместимости.

Фертилитет, бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Траумил S не е противопоказан при бременни и кърмачки.

Шофиране и работа с машини
Траумил S не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

Траумил S съдържа етанол
Този продукт съдържа 140 mg алкохол (етанол) за доза от 10 капки (35 об.% алкохол).
Количеството в 10 капки се равнява на по-малко от 3,5 ml бира или 1,4 ml вино.
Количеството алкохол е пренебрежимо малко и не предполага да има реакция при възрастни и юноши, а при деца ефектът е малко вероятно да бъде забележим. При малки деца понякога може да се наблюдава сънливост. Алкохолът в този лекарствен продукт може да повлияе ефекта на други лекарства. Ако сте бременна или кърмите, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете този лекарствен продукт. Ако сте пристрастени към алкохол, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемете Траумил S

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

При възрастни и деца над 6 годишна възраст обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При подувания на меките тъкани - 3 пъти по 30 капки дневно.

Употреба при деца

При кърмачета и деца до 2 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно.
От 2 до 6 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно.

Начин на приложение

Този лекарствен продукт не се приема с храна. При деца капките се накапват в малко вода.

Продължителност на употреба

Тъй като този продукт съдържа ехинацея, да не се използва непрекъснато повече от 8 седмици без консултация с Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Траумил S
Траумил S няма доза на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете Траумил S

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете указаната схема.



Ако сте спрели употребата на Траумил S

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. В много редки случаи може да се появи реакция на свръхчувствителност или алергична кожна реакция (зачеряване, оток и сърбеж) при пациенти, свръхчувствителни към растения от сем. Сложноцветни, т.е. арника, лайка, бял равнец и в такъв случай приемането на продукта трябва да се спре. Наблюдавани са кожен обрив и сърбеж и в много редки случаи на подуване на лицето, задух, замайване и понижаване на кръвното налягане след лечение с продукти, съдържащи екстракти от ехинацея.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +359 28903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Траумил S

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност – 5 години.

Срок на годност след първо отваряне на бутилката – 6 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Траумил S

100 g съдържат:

- Активни вещества:

Achillea millefolium	D3	5 g
Aconitum napellus	D3	10 g
Arnica montana	D2	5 g
Atropa belladonna	D4	25 g
Bellis perennis	D2	2 g



<i>Calendula officinalis</i>	D2	5 g
<i>Echinacea</i>	D2	2 g
<i>Echinacea purpurea</i>	D2	2 g
<i>Hamamelis virginiana</i>	D2	5 g
<i>Hepar sulfuris</i>	D8	10 g
<i>Hypericum perforatum</i>	D2	1 g
<i>Matricaria recutita</i>	D3	8 g
<i>Mercurius solubilis Hahnemannii</i>	D8	10 g
<i>Symphytum officinale</i>	D8	8 g

- Други съставки (помощни вещества): Пречистена вода, етанол 96%

Съдържа 35 об.% алкохол.

Как изглежда Траумил S и какво съдържа опаковката

Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от PP и апликатор-капкомер от PE, поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Германия

Тел: 0049 (0)7221 501 00, Факс: 0049 (0)7221 501 485

Дата на последно преразглеждане на листовката 02/2023

