

Листовка: информация за пациента

Гропринозин 500 mg таблетки инозин ацедобен димепранол

Groprinosin 500 mg tablets inosine acedoben dimepranol

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаките на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Гропринозин 500 mg таблетки (по-долу Гропринозин) и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Гропринозин
3. Как да приемате Гропринозин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Гропринозин
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. № 2023 0018	
Разрешение № - 63538 , 25 - 09 - 2023	
BG/MA/MP /	
Одобрение № /	

1. Какво представлява Гропринозин и за какво се използва

Гропринозин съдържа активното вещество инозин ацедобен димепранол. Това е антивирусно лекарство, което повишава имунитета (стимулира имунната система). Може да се използва при следните заболявания:

- грип/вирусни инфекции на дихателните пътища;
- херпес на устните или гениталиите, причинени от херпес симплекс (*Herpes simplex*) вирус;
- афтозен стоматит;
- херпес зостер;
- варицела;
- инфекции, причинени от цитомегаловирус или Епщайн-Бар-вирус;
- инфекции, причинени от Човешкия папилома вирус (напр. генитални брадавици - кондилома акумината);
- вирусни хепатити;
- морбили;
- рубеола;
- заушка;
- подостър склерозиращ паненцефалит.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Гропринозин

Не приемайте Гропринозин

- ако сте алергични към инозин ацедобен димепранол или към някоя от съставките на това лекарство (изброени в точка 6). Симптомите на алергичната реакция може да се изразяват в обрив, сърбеж, затруднено дишане или подуване на лицето/устини/ухо/гърло или езика.
- ако имате пристъп на подагра (силна ставна болка с подуване и зачервяване на кожата/ми



- излив около ставите);
- ако имате повишени нива на пикочна киселина в кръвта според лабораторните изследвания.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Гропринозин:

- ако сте имали пристъпи на подагра или повищена концентрация на пикочна киселина в кръвта или урината. Гропринозин може да причини временно повишаване на концентрациите на пикочна киселина в кръвта и урината;
- ако сте имали камъни в бъбреците или пикочната система;
- ако имате бъбречни проблеми.

В случай на продължително лечение (3 месеца или повече), Вашият лекар ще Ви назначи редовни кръвни изследвания и ще проследява функцията на бъбреците и черния Ви дроб. При продължително лечение може да се образуват камъни в бъбреците.

Ако имате признаки на алергична реакция като обрив (копривна треска), сърбеж, затруднено дишане, подуване на лицето, устните, гърлото или езика, прималяване, трябва веднага да спрете да приемате лекарството и да се свържете с лекар.

Деца и юноши

Не използвайте Гропринозин при деца на възраст под една година.

Други лекарства и Гропринозин

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, насъкоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Ако приемате някое от изброените по-долу лекарства, обърнете специално внимание на лекаря си, тъй като те могат да взаимодействват с Гропринозин:

- лекарства, използвани за лечение на подагра (алопуринол и други лекарства);
- лекарства, повишаващи елиминирането на пикочната киселина, включително урикозурици (напр. пробенецид) и диуретици (отводняващи таблетки), напр. фуроземид, тораземида, етакринова киселина, хидрохлоротиазид, хлорталидон, индапамид;
- лекарства, които потискат имунната система (така наречените имуносупресори, използвани при пациенти след трансплантиация на органи или при лечение на атопичен дерматит);
- азидотимидин (AZT, зидовудин – лекарство, използвано за лечение на пациенти с инфекция на ХИВ).

Гропринозин с храна, напитки и алкохол

Таблетките могат да се погълнат цели или да се разтварят в малко количество течност (вода или овкусена течност).

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не приемайте Гропринозин, ако сте бременна или кърмите, освен по изрична препоръка от Вашия лекар. Вашият лекар ще прецени дали ползите от лекарството надвишават възможния рисък.

Шофиране и работа с машини

В някои случаи по време на лечение с инозин ацедобен димепранол са наблюдавани съняливост и световъртеж, които може да наручат способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Гропринозин



Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Само за перорално приложение. Приемайте таблетката с достатъчно количество течност. Ако имате затруднения при прегълдането на цялата таблетка, може да я счупите и разтворите в малко количество овкусена течност.

Дозата зависи от Вашето телесно тегло (без мастната тъкан), вида и тежестта на Вашето заболяване. Вашата доза и схемата на дозиране ще бъде определена от Вашия лекар.

Общата дневна доза трябва да бъде разделена на еднакви единични дози, които се приемат няколко пъти дневно.

Препоръчителната доза за *възрастни, включително старческа възраст* (над 65 години) е 50-100 mg/kg на телесно тегло дневно, обикновено 6 таблетки (3 g) дневно (т.е. 2 таблетки 3 пъти дневно) до максимална доза от 8 таблетки (4 g) дневно (т.е. 2 таблетки 4 пъти дневно). Не трябва да се надвишава максималната дневна доза от 4 g (8 таблетки).

Продължителността на лечението зависи от Вашия отговор към лечението. Употребата на лекарството обикновено продължава 1 до 2 дни или повече след отзучаване на симптомите, както е предписано от Вашия лекар.

Употреба при деца и юноши

За деца *над 1-годишна възраст* препоръчителната доза е 50 mg/kg на телесно тегло дневно (1 таблетка на 10 kg телесно тегло), приложена в няколко разделени дози.

Делителната черта е само за улесняване на счупването за по-лесно прегълдане, а не за да се разделя таблетката на две равни дози.

Ако сте приели повече от необходимата доза Гropринозин

До сега няма съобщения за случаи на предозиране. Трябва да се свържете с Вашия лекар, ако смятате, че сте приели или някой друг е приел твърде много таблетки.

Ако сте пропуснали да приемете Гropринозин

Ако сте пропуснали доза, вземете я възможно най-скоро след като си спомните, освен ако не е наблизило времето за Вашата следваща доза. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Гropринозин

Ако спрете лечението, очакваният терапевтичен ефект може да не бъде постигнат или симптомите на заболяването Ви може да се влошат.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Всяко лекарство може да причини алергична реакция, но тежките алергични реакции след прием на инозин ацедобен димепранол са много редки.

Спрете приема на лекарството и веднага се свържете с лекар, ако забележите някои от следните симптоми:

- внезапни хрипове;
- затруднено дишане;
- подуване на клепачите, лицето, гърлото, езика или устните;
- обрив или сърбеж, които засягат цялото тяло.



Възможните нежелани реакции на инозин ацедобен димепранол са изброени по-долу:

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 человека):

- повишаване на нивата на пикочна киселина в кръвта или в урината.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 человека):

- повишаване на стойностите на чернодробните ензими в кръвта;
- гадене, повръщане;
- дискомфорт в епигастроума;
- сърбеж по кожата;
- кожен обрив (като единствен симптом);
- главоболие;
- усещане за световъртеж;
- усещане за умора или неразположение;
- болки в ставите;
- повишаване на нивото на urea в кръвта.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 человека):

- диария или запек;
- нервност;
- съниливост или затруднено заспиване;
- повишаване на обема на урината.

С неизвестна честота (честотата не може да се установи въз основа на наличните данни):

- болка в епигастроума;
- замаяност;
- зачеряване на кожата;
- подуване на лицето, устните, клепача или гърлото, може да причини затруднено дишане (ангиоедем);
- копривна треска (уртикария);
- алергична реакция;
- внезапна и тежка алергична реакция, засягаща цялото тяло (анафилактична реакция).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8,

1303 София,

тел.: +35928903417,

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Гропринозин

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да не се съхранява над 25°C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след



„Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Грапринозин

- Активното вещество е инозин ацедобен димепранол. Всяка таблетка съдържа 500 mg инозин ацедобен димепранол.
- Другите съставки са: картофено нищесте, повидон K-25 и магнезиев стеарат.

Как изглежда Грапринозин и какво съдържа опаковката

Грапринозин таблетки са бели до кремави, овални, двойно изпъкнали таблетки, с дължина 17 mm и ширина 7 mm и с делителна черта върху едната страна.

Делителната черта е само за улесняване на счупването с цел по-лесно погълдане, а не за разделяне на равни дози.

Грапринозин таблетки са опаковани в Al/PVC/PE/PVDC блистери, поставени в картонена кутия с листовка с информация за пациента.

Грапринозин наличен в опаковки съдържащи 20, 30 или 50 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Gedeon Richter Plc.

1103 Budapest,

Gyömrői út 19-21.

Унгария

Производител

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Полша

Дата на последно преразглеждане на листовката:

