

Листовка: информация за потребителя

Стрепсилс Скреж 1,2 mg / 0,6 mg таблетки за смучене
2,4-Дихлорбензилов алкохол / Амилметакрезол

Strepsils® Cool 1,2 mg / 0,6 mg Lozenges
2,4-Dichlorobenzyl alcohol / Amylmetacresol

9500005
BG/14744-57735

08-02-2022

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошат или не се подобряват след 3 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представляват Стрепсилс Скреж и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Стрепсилс Скреж
3. Как да приемете Стрепсилс Скреж
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Стрепсилс Скреж
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представляват Стрепсилс Скреж и за какво се използва

Стрепсилс Скреж са таблетки за смучене с антибактериално действие срещу вируси предизвикващи инфекции на устната кухина.

Стрепсилс Скреж се прилага за поддържаща терапия при инфекциозно-възпалителни заболявания на устната кухина (възпаления на устната лигавица).

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Стрепсилс Скреж

Стрепсилс Скреж не трябва да се използва

- ако сте свръхчувствителни (алергични) към 2,4-Дихлорбензилов алкохол, Амилметакрезол, Леоментол, Ментол, Цинеол или към някоя от останалите съставки на Стрепсилс Скреж
- деца под 12 годишна възраст

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Стрепсилс Скреж.

Всяка таблетка Стрепсилс Скреж съдържа: глюкоза и захароза. Неподходящ за диабетици и хора с вродена непоносимост към захароза, глюкозо/галактозен или захарозо/изомалтозен синдром.



Обърнете специално внимание при употребата на Стрепсилс Скреж:

В случай на бактериални инфекции е ясна необходимостта от насочено лечение с антибиотик.

При съмнение за вирусна инфекция Стрепсилс Скреж не атакува причинителя на заболяването.

В случай на гъбична инфекция се налага лечение с подходящ антимиотик (лекарство за насочено лечение на гъбични инфекции).

Деца и юноши

Стрепсилс Скреж е противопоказан при деца под 12 годишна възраст.

Други лекарства и Стрепсилс Скреж

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не са известни лекарствени и други взаимодействия.

Приложение на Стрепсилс Скреж с храни и напитки

Стрепсилс Скреж не трябва да се прилага с храни и напитки. Да се прилага между храненията.

Бременност, фертилитет и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Не са налични или има ограничено количество от данни за използването на Амилметакрезол, 2,4-Дихлорбензилов алкохол и Легоментол.

Безопасността на Стрепсилс Скреж по време на бременност не е била установена, затова не се препоръчва.

Кърмене

Не е известно дали 2,4-Дихлорбензилов алкохол, Амилметакрезол, Легоментол или техните метаболити се екскретират в майчиното мляко. Не може да се изключи риска за новородените/бебетата. Безопасността на Стрепсилс Скреж по време на кърмене не е установена и затова не се препоръчва.

Фертилитет

Няма налични данни за ефекта върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини

Не са установени нежелани ефекти.

Важна информация относно някои от съставките на Стрепсилс Скреж

Това лекарство съдържа съвсем малки количества глютен (от пшенично нишесте).

Счита се, че е „без глютен“ и е малко вероятно да предизвиква проблеми ако имате цьолиакия.

Една таблетка за смучене съдържа не повече от 22,04 микрограма глютен.

Ако имате алергия към пшеница (което е различно от цьолиакия), Вие не трябва да приемате това лекарство.



Този лекарствен продукт съдържа 1,89 mg пропиленгликол във всяка таблетка за смучене.

Това лекарство съдържа аромати с Бензилов алкохол, Цинамилов алкохол, Цитрал, Цитронелол, d-Лимонен, Евгенол и Линалоол, които могат да причинят алергични реакции.

Съдържа 1,10 g глюкоза и 1,38 g захароза на една таблетка за смучене. Трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет.

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете този лекарствен продукт.

Съдържа сулфити (серен диоксид (E220)): В редки случаи може да причини тежки реакции на свръхчувствителност и бронхоспазм.

3. Как да приемете Стрепсилс Скреж

Винаги приемайте Стрепсилс Скреж точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Начин и продължителност на приема

За използване в устната кухина и гърлото.

Ако лекарят не е разпоредил друго, обичайната доза е:

Възрастни

Една таблетка през 2 – 3 часа, но не повече от 12 таблетки за смучене за 24 часа

Употреба при деца над 12 години

Една таблетка се смуче бавно през 2 – 3 часа; но не повече от 8 таблетки за смучене за 24 часа.

Не е подходящо за деца под 12 годишна възраст.

Пациенти в старческа възраст

Не е необходимо да се намалява дозата.

Както при всички таблетки за смучене, за да се избегне дразнене на устната лигавица, таблетката за смучене трябва да се мести в устата, докато се разтваря.

Стрепсилс Скреж е предвиден за заболявания, посочени в раздела за област на приложение. Трябва да се консултирате с лекар при тежки възпаления на гърлото или болки в гърлото, които са придружени с висока температура, главоболие, гадене или повръщане, или продължават повече от 3 дни.

Моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако имате чувството, че действието на Стрепсилс Скреж е твърде силно или твърде слабо.


Ако сте приели повече от необходимата доза Стрепсилс Скреж

При правилна употреба се изключва предозиране на Стрепсилс Скреж и досега не е познато такова.

Ако по невнимание приемете повече от Стрепсилс Скреж, моля веднага информирайте Вашия лекар.

Ако имате други въпроси за използването на този лекарствен продукт, питайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции



Както всички лекарства, Стрепсилс Скреж може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

За честотата на страничните ефекти се съди по следните категории: Много чести ($\geq 1/10$); Чести ($\geq 1/100$ до $< 1/10$); Нечести ($\geq 1/1,000$ до $< 1/100$); Редки ($\geq 1/10,000$ до $< 1/1,000$); Много редки ($< 1/10,000$); Неизвестна (не може да бъде определена от наличните данни). В отделните групи по честота нежеланите реакции са представени в низходящ ред според степента на сериозност.

С неизвестна честота

Реакциите на свръхчувствителност могат да се проявят под формата на обрив, ангиоедем, уртикария, бронхоспазм, и хипотония със синкоп; болки в корема, гадене, дискомфорт в устната кухина.

При някои чувствителни пациенти левоментола, ментола и цинеола могат да предизвикат реакции на свръхчувствителност (включително задух).

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Стрепсилс Скреж

Няма специални условия за съхранение.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Стрепсилс Скреж след срока на годност отбелязан на картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнери за домашни отпадъци.


Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще помагат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Стрепсилс Скреж съдържа:

Активните вещества са: 2,4-Дихлорбензилов алкохол и Амилметакрезол.

1 таблетка за смучане съдържа 1,2 mg 2,4-Дихлорбензилов алкохол и 0,6 mg Амилметакрезол.



Другите съставки са: ксилитол, ментово масло (съдържа ментол), левоментол, масло от джоджен (съдържа ментол), евкалиптовото масло (съдържа цинеол), захарен разтвор, глюкозен сироп.

Как изглежда Стрепсилс Скреж и съдържание на опаковката:

Стрепсилс Скреж са бели до бледо жълти, кръгли таблетки за смучене; Една опаковка съдържа 16 и 24 таблетки за смучене (N2).

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L.

48 Iancu de Hunedoara Boulevard, Building Crystal Tower

11th Floor, District 1, Bucharest, Румъния

Производител:

RB NL Brands B.V.

Schiphol Boulevard 207

1118 BH Schiphol,

Нидерландия

Дата на последно преразглеждане на листовката: ноември, 2021

