

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка Приложение 2	
Към Reg. №	20/11/0480
OG-MA/MP -64450	24-01-2024

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНТА

**АНТИМИКОБЕТА - ФОРТЕ 10g/100ml+2g/100ml разтвор за кожа**

**ANTIMYCOPETA-FORTE 10g/100ml+2g/100ml cutaneous solution**

**Салицилова киселина+2-нафтол (Salicylic acid+2-naphthol)**

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

### Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Антимикобета-форте и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Антимикобета-форте
3. Как да използвате Антимикобета-форте
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Антимикобета-форте
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### 1. Какво представлява Антимикобета-форте и за какво се използва

Лекарственият продукт Антимикобета-форте се прилага като:

- съпътстваща терапия при лечение на дерматомикози на гладката кожа и окосмената област на главата; интердигитална и ингвинална епидермофития.

### 2. Какво трябва да знаете преди да използвате Антимикобета-форте

#### Не използвайте Антимикобета-форте при:

- Ако сте чувствителни към салицилова киселина и 2-нафтол или някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в т.6);
- не се разрешава употребата на продукта при деца под 16 години;
- Ако сте бременна или кърмите.

#### Предупреждения и предпазни мерки

#### Говорете с Вашия лекар, преди да приложите Антимикобета-форте:

Антимикобета-форте не се прилага върху лигавици, открити рани и под оклутивни превръзки.

Антимикобета-форте не се приема вътрешно и при употреба му да се пазят очи.

Антимикобета-форте е запалим продукт.



**Антимикобета-форте** не се прилага при остро възпалена кожа с подмокряне, на големи площи и продължително време, включително и при пациенти с бъбречна недостатъчност и с нарушено периферно кръвоснабдяване (захарен диабет)!

#### **Други лекарства и Антимикобета-форте**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, насъкоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива отпусканi без рецептa, както и билкови продукти.

Говорете с Вашия лекар ако:

- Ако прилагате етерични масла;
- Ако прилагате амонячни разтвори;
- Ако прилагате живачни съединения.

#### **Антимикобета-форте с храна, напитки и алкохол**

При употребата на Антимикобета-форте, не съществува риск от повлияване на ефектите му от взаимодействия с храна. Употребата на алкохол може да потенцира нежелани прояви от страна на ЦНС.

#### **Бременност, кърмене и ферилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Прилагането на Антимикобета-форте по време на бременност и кърмене не се препоръчва.

#### **Шофиране и работа с машини**

При употребата на Антимикобета-форте не са известни ефекти върху способността на шофиране и работа с машини.

**Антимикобета-форте, съдържа Етанол 96%.**

### **3. Как да използвате Антимикобета-форте**

Винаги използвайте Антимикобета-форте, точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайното приложение е както следва: прилага се външно чрез нанасяне с помощта на подходящ тампон, върху засегнатото място на кожата 1- 2 пъти дневно.

### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, Антимикобета-форте, може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат не повече от 1 на 10 000 души):

- при някои пациенти, се характеризира с поява на алергични реакции – включително епителна мултиформа и анафилактични реакции.
- Да се има предвид, че салициловата киселина е силна органична киселина и може да предизвика дразнещо или изгарящо действие върху тъканите (дерматит, ерозии, улцерации).

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел. +359 92 803417, уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



## **5. Как да съхранявате Антимикобета-форте**

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Да се съхранява в оригинална опаковка, на сухо и защитено от пряка слънчева светлина място, при температура до 25 °C.

След първоначалното отваряне на опаковката – 4 месеца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлят лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

### **Какво съдържа Антимикобета-форте:**

Активно вещество: В 50 ml се съдържа активното вещество – салицилова киселина -5g и 2-нафтол – 1g.

Другите съставки са: ацетон, глицерол, етанол 96% и пречистена вода.

### **Как изглежда Антимикобета-форте и какво съдържа опаковката**

Безцветна до бледо-розова бистра вискозна течност.

Първична опаковка - кафяви бутилки от полипропилен от 50 ml с апликатор капкомер, затворени с капачки на винт от полипропилен.

### **Притежател на разрешението за употреба**

“КУПРО” ЕООД

ул. „Мано Тодоров“ № 28,

Горна Оряховица 5100

България

**Производител**

“КУПРО” ЕООД

ул. " Иван Момчилов“ № 2,

Горна Оряховица 5100

България

**Дата на последно преразглеждане на листовката**

Декември 2023

