

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**НАЗИК кидс 5% / 0,05% спрей за нос, разтвор  
Декспантенол / Ксилометазолин хидрохлорид**

**nasic kids 5% / 0,05% nasal spray, solution  
Dexpanthenol / Xylometazoline hydrochloride**

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Регист. №	20060661
Разрешение №	64286
ВГ/МА/МР -	05-01-2024
Одобрение №	

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**  
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

### Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява НАЗИК кидс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате НАЗИК кидс
3. Как да използвате НАЗИК кидс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате НАЗИК кидс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАЗИК КИДС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

**НАЗИК кидс** е спрей за нос.

Ксилометазолин има съдосвиващо действие, като по този начин предизвиква отбъване на лигавицата в носа.

Декспантенол е производно на пантотеновата киселина; витамин, който способства за зарастване на наранената лигавица и притежава мукопротективно (предпазващо лигавиците) действие.

**НАЗИК кидс** се използва при хрема и за подпомагане зарастването на лезии по назалната лигавица и съседните кожни участъци, за облекчаване на вазомоторен ринит и за лечение на нарушеното дишане през носа след назална хирургична операция.

**НАЗИК кидс** е предназначен за употреба при деца от 2 до 6 години.



## **2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЗИК КИДС**

### **Не използвайте НАЗИК кидс:**

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към ксилометазолин или декспантенол, или към някоя от останалите съставки на НАЗИК кидс (изброени в точка 6),
- ако страдате от сухо възпаление на лигавицата на носа и образуване на корички (сух ринит),
- след хирургично отстраняване на хипофизната жлеза през носа (трансфеноидална хипофизектомия) или други хирургични процедури, които откриват тъканите, покриващи мозъка (менинги),
- при кърмачета и малки деца под 2 години.

### **Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате НАЗИК кидс.

### **Обърнете специално внимание при употребата на НАЗИК кидс:**

- ако приемате инхибитори на моноаминооксидазата (МАО инхибитори) и други лекарствени продукти, които биха могли да повишат кръвното налягане,
- ако имате повищено вътречно налягане, особено при тясноъгълна глаукома,
- ако страдате от тежки сърдечно-съдови заболявания (напр. коронарна артериална болест, високо кръвно налягане (хипертония),
- ако страдате от заболяване на сърцето (например синдром на удължен QT интервал),
- ако имате тумор на надбъречната жлеза (феохромоцитом),
- ако страдате от метаболитни разстройства (напр. свръхактивност на щитовидната жлеза (хипертиреоидизъм), захарен диабет),
- ако страдате от порфирия,
- ако имате простатна хиперплазия.

Лекарственият продукт може да се използва при хроничен ринит само под лекарско наблюдение, поради опасност от намаляване на назалната лигавица.

### **Употреба при деца:**

Употребата повече от 7 дни и в дози по-високи от препоръчаната трябва да се избягват, особено при деца. Употребата на по-високи дози трябва да се провежда само под медицински контрол.

НАЗИК кидс съдържа концентрация на активните вещества, предназначена за деца на възраст между 2 и 6 години и затова не е подходящ за кърмачета и малки деца под 2 години.

За деца над 6 години и възрастни се предлага спрей за нос с по-високи концентрации на активните вещества.

**Други лекарства и НАЗИК кидс.** Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насъкоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.

Едновременната употреба на НАЗИК кидс с някои лекарствени продукти, които съдържат инхибитори или



трициклични антидепресанти, както и лекарства, които повишават кръвното налягане) може да доведе до повишаване на кръвното налягане в резултат на ефектите върху сърдечно-съдовите функции.

#### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

#### **Бременност**

**НАЗИК кидс** не трябва да се използва по време на бременност поради отсъствието на достатъчно данни за приложението на ксилометазолин хидрохлорид при бременни жени.

#### **Кърмене**

**НАЗИК кидс** не трябва да се използва от кърмещи жени, тъй като не е известно дали ксилометазолин хидрохлорид преминава в майчиното мляко. Не може да се изключи риск за кърмачето.

#### **Фертилитет**

Не е известен негативен ефект върху фертилитета поради лечение с ксилометазолин хидрохлорид.

#### **Шофиране и работа с машини**

При използване на този лекарствен продукт в съответствие с указанията, не се очакват прояви на някакъв ефект по отношение на способността за шофиране или работа с машини.

**НАЗИК кидс** съдържа 0,02 mgベンзалкониев хлорид на впръскване.

Бензалкониевият хлорид може да причини дразнене или подуване в носа, особено ако се използва продължително време.

### **3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЗИК КИДС**

Винаги използвайте **НАЗИК кидс** точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **Начин на приложение:**

За приложение в носа

#### **Стъклена бутилка с фиксиран впръскащ накрайник**



Отстранете защитната капачка от впръскащия накрайник. Преди първото приложение на спрея, трябва да се напомпа няколко пъти, до получаване на равномерно впръскване. След това, при всяко следващо приложение, дозиращият спрей е готов за употреба.





Вкарайте впръскация накрайник в ноздрата, така че спреят да бъде във вертикална позиция и впръскайте веднъж. След употреба почистете накрайника и отново поставете защитната капачка.

или

### Стъклена бутилка с впръскащ накрайник на винт



Отстранете по-дългата предпазна капачка. Развийте капачката от стъклената бутилка и завийте накрайника. Отстранете предпазната капачка на накрайника. Преди първото приложение на спрея, напомпете няколко пъти до получаване на равномерно впръскване.



Като държите накрайника максимално изправен го поставете последователно в двете ноздри и във всяка впръснете по веднъж. След употреба, избършете накрайника на спрея по хигиенни съображения и поставете отново предпазната капачка. След като веднъж сте използвали спрея, пулверизацията става мигновено и не се налага многократно натискане на помпата.

Обикновено началото на действието се наблюдава след 5-10 минути под формата на подобreno носно дишане.

Този ефект продължава до 10 часа след приложението.

#### Дозировка:

Ако не е изписано друго от лекар, при деца на възраст между 2 и 6 години се прилага по едно впръскване във всяка ноздра, до 3 пъти на ден, при необходимост. Дозировката зависи от индивидуалната чувствителност и клиничния ефект.

#### Продължителност на приложението:

**НАЗИК кидс** не трябва да се използва по-дълго от 7 дни, освен ако не е предписано друго от лекар или стоматолог. Продължителността на лечението при деца трябва винаги да се определя след консултация с лекар.

Необходим е период от няколко дни преди възстановяване на лечението.

Хроничната употреба на **НАЗИК кидс** може да предизвика трайно набъбване и евентуално атрофия на лигавицата на носа.

Пациентите, страдащи от глаукома, особено от тясноъгълна глаукома, трябва да се консултират с лекар преди употреба на **НАЗИК кидс**.

Ако смятате, че ефектът от лечението с **НАЗИК кидс** е твърде силен или твърде слаб, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

**Ако сте използвали повече от необходимата доза НАЗИК кидс (напр. предозиране или случайно поглъщане на голямо количество НАЗИК кидс), може да се появят следните симптоми:**

Свиване на зениците (миоза), разширяване на зениците (мидриаза), треска, изпотяване, бледост, посиняване на устните (цианоза) гадене, повръщане, гърчове, сърдечно-съдови нарушения като нарушения на сърдечния ритъм (тахикардия, брадикардия, сърдечни



аритмии), циркулаторен колапс, сърден арест и високо кръвно налягане (хипертония), дихателни нарушения (белодробен оток, респираторна дисфункция), психологични разстройства.

Може да се наблюдават и сънливост, понижаване на телесната температура, намалена сърдечна честота, рязко понижаване на кръвното налягане, спиране на дишането и кома.

Ако подозирате, че сте използвали твърде много от това лекарство, моля, свържете се незабавно с Вашия лекар.

**Ако сте пропуснали да използвате НАЗИК кидс**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза, а продължете лечението съгласно инструкциите за употреба.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, **НАЗИК кидс** може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много редки (могат да засегнат до 1 от 10 000 души): гърчове (особено при деца).

Нечести (могат да засегнат до 1 от 100 души): реакции на свръхчувствителност (например ангиоедем, кожен обрив, пруритус).

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души): сърцебиене (палпитации), ускорена сърдечна честота (тахикардия), повищено кръвно налягане (arterialна хипертония).

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души): неспокойствие, безсъние, халюцинации (особено при деца), умора (напр. сънливост, седация), главоболие, нарушения на сърдечния ритъм (сърдечна аритмия), при загуба на лекарствената активност, повищена конгестия на лигавицата, кървене от носа (епистаксис)

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): усещане за парене и сухота на носната лигавица, кихане.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев“ № 8  
1303 София  
Тел.: +35 928903417  
уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



## **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ НАЗИК КИДС**

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте **НАЗИК кидс** след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

След отваряне на опаковката, продуктът е годен за употреба в продължение на 12 седмици.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## **6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Какво съдържа НАЗИК кидс**

- *Активните вещества са:* ксилометазолин хидрохлорид и декспантенол. В 10 ml разтвор се съдържат 5 mg ксилометазолин хидрохлорид и 500 mg декспантенол. Всяко впръскване от 0,1 ml (еквивалентно на 0,10 g) от разтвора съдържа 0,05 mg ксилометазолин хидрохлорид и 5,0 mg декспантенол.
- *Другите съставки са:*ベンзалкониев хлорид 0,02 mg/0,1 ml, калиев дихидрогенфосфат, динатриев фосфат додекахидрат (Ph. Eur), пречистена вода.

### **Как изглежда НАЗИК кидс и какво съдържа опаковката**

Многодозов контейнер с помпа за впръскване. НАЗИК кидс има постоянно фиксирана разпръскаща дюза. Поради това, технически неизбежно е, да има остатъчно количество, до което разпръскащата дюза да не може да достигне. Както е посочено обаче, гарантираното минимално количество, което може да бъде използвано, е 10 ml.

**НАЗИК кидс** е бистър, безцветен спрей за нос, който се предлага в опаковки, съдържащи 10 ml разтвор.

Този спрей за нос се предлага и с по-висока концентрация на активното вещество, подходящ за възрастни и деца над 6 години.

### **Притежател на разрешението за употреба**

Cassella-med GmbH & Co. KG

Gereonsmühlengasse 1, 50670 Köln, Германия

Phone: +49 221 / 1652 – 0

E-mail: dialog@cassella-med.eu



**Производител**

Klosterfrau Berlin GmbH  
Motzener Str. 41, 12277 Berlin  
Германия  
Телефон: + 49 30 / 720070  
Факс +4930 / 720072 34

**Дата на последно преразглеждане на листовката**

Април/2023

Рег. №

**Свойства на НАЗИК кидс:**

Физиологичната роля на въздухопроводните пътища в носа е да затоплят, овлажняват и филтрират вдишвания въздух, като по този начин предпазват бронхиалното дърво от охлаждане и изсушаване. Поради тези функции, носните пътища са покрити с добре кръвоснабдена лигавица.

Различни фактори (напр. хрема или хирургични интервенции) могат да увредят назалната лигавица.

Подобни стимули предизвикват набъбване на лигавицата на носа, нарушен дишане през носа и усещане за „запушване“ на носа.

С оглед облекчаване на възпалителното набъбване на носната лигавица, предизвикано от хрема или хирургична интервенция, **НАЗИК кидс** назален спрей се прилага локално върху назалната лигавица, осигурявайки директно въздействие от страна на активните вещества ксилометазолин хидрохлорид и декспантенол.

Ксилометазолин хидрохлорид осигурява продължително отбъбване на оточната лигавица и облекчаване на дишането през носа, което се проявява в рамките на няколко минути след приложението. Рационалното засилване на този ефект се постига посредством комбинирането на ксилометазолин хидрохлорид с декспантенол. Декспантенол представлява производно на пантотеновата киселина, витамин необходим за всички тъкани в човешкия организъм, компонент на редовния хранителен режим.

