

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕВИТЕЛЯ

Към Рег. №

20030741

САЛИЦИЛОВ СПИРТ КУПРО 1% разтвор за кожа
SPIRITUS SALICYLICUS KUPRO 1% cutaneous solution

Салицилова киселина (Salicylic acid)

64449 24-01-2024

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Салицилов спирт Купро 1% и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Салицилов спирт Купро 1%
3. Как да използвате Салицилов спирт Купро 1%
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Салицилов спирт Купро 1%
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Салицилов спирт Купро 1% и за какво се използва

Лекарственият продукт Салицилов спирт Купро 1% се прилага в:

- комплексно лечение на себорея, акне и микози.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате Салицилов спирт Купро 1%

Не използвайте Салицилов спирт Купро 1% при:

- Ако сте чувствителни към салицилова киселина или някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в т.6);
- Ако имате открити рани, остро възпалена кожа с подмокряне;
- Ако сте с бъбречна недостатъчност и с нарушен периферно кръвоснабдяване (захарен диабет);
- При деца под 12 годишна възраст;
- Ако сте бременна или кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приложите Салицилов спирт Купро 1%:

Салицилов спирт Купро 1% не се прилага върху лигавици, на големи площи и продължително време и под формата на оклузивни превръзки, не се приема вътрешно и при употреба се пазят очите.



Други лекарства и Салицилов спирт Купро 1%

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива отпускати без рецепт, както и билкови продукти. Говорете с вашия лекар ако:

- Ако прилагате етерични масла;
- Ако прилагате амонячни разтвори;
- Ако прилагате живачни съединения.

Салицилов спирт Купро 1% с храна, напитки и алкохол

При употребата на Салицилов спирт Купро 1%, с алкохол може да се потенцира нежелани прояви от страна на ЦНС.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Прилагането на Салицилов спирт Купро 1% по време на бременност и кърмене не се препоръчва.

Шофиране и работа с машини

При употребата на Салицилов спирт Купро 1% не са известни ефекти върху способността на шофиране и работа с машини.

Салицилов спирт Купро 1%, съдържа Етанол.

3. Как да използвате Салицилов спирт Купро 1%

Винаги използвайте Салицилов спирт Купро 1% точно както Ви е казал вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо попитайте вашия лекар или фармацевт. Обичайното приложение е както следва: прилага се външно чрез нанасяне с помощта на подходящ тампон, върху съответния кожен участък 1-2 пъти дневно.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Салицилов спирт Купро 1%, може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат не повече от 1 на 1000 души):

- възможна е поява на алергични реакции включително егутхема multiforme (мултиформна еритема) и анафилактични реакции;

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат не повече от 1 на 10000 души):

- поради съдържанието на салициловата киселина е възможно при употреба да се предизвика дразнещо или изгарящо действие върху тъканите (дерматит, ерозии, улцерации).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Салицилов спирт Купро 1%

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25°C.

Поради незначителния парен натиск не се предвижда специален срок на годност след първоначалното отваряне на опаковката.



Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Салицилов спирт Купро 1%:

Активно вещество: В 100 ml се съдържа активното вещество – салицилова киселина – 1g.

Другите съставки са: етанол и пречистена вода.

Как изглежда Салицилов спирт Купро 1% и какво съдържа опаковката

Бистра течност.

Първична опаковка - тъмни бутилки 50ml и 100ml от полиетилентерафталат, затворени с бели непрозрачни капачки на винт от полиетилен висока плътност, поставени в картонена опаковка.

Притежател на разрешението за употреба

КУПРО ЕООД
ул. „Мано Тодоров“ № 28,
Горна Оряховица 5100
България

Производител
КУПРО ЕООД
ул. " Иван Момчилов" № 2,
Горна Оряховица 5100
България

Дата на последно преразглеждане на листовката
Декември 2023

