

Листовка: информация за потребителя

нео-ангин 1,20 mg/0,60 mg/5,90 mg таблетки за смучане
2,4 - дихлоробензил алкохол/амилметакрезол/левоментол

neo-angin® 1,20 mg/0,60 mg/5,90 mg lozenges
2,4 – dichlorobenzyl alcohol/amylnetacresol/levomenthol

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20000740
Разрешение №	1-20407 / 29.11.2012
Одобрение №	

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство, точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява нео-ангин и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете нео-ангин
3. Как да приемате нео-ангин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате нео-ангин
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява нео-ангин и за какво се използва

За симптоматично лечение на леки инфекции в устната кухина, вкл. ларингити, фарингити, тонзилити, гингивити.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете нео-ангин

Не приемайте нео-ангин

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на нео-ангин
- При деца под 6 годишна възраст

Предупреждени и предпазни мерки

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този продукт.



нео-ангин не е подходящ за приложение при деца под 6 годишна възраст. Прилагането на лекарствения продукт при малки деца може да доведе до бронхоспазъм и гърчове.

Други лекарства и нео-ангин

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително такива, отпускани без рецепта.

Не са известни взаимодействия с други лекарства при перорален прием.

нео-ангин с храна и напитки

нео-ангин може да се приема независимо от храненията.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, се посъветвайте с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Няма клинични данни за влиянието на нео-ангин по време на бременност и кърмене и затова този продукт трябва да се приема внимателно от бременни и кърмещи жени. Поради недостатъчна информация, не е възможно напълно да се изключи рискът за плода. Ето защо, ако сте бременна, моля консултирайте се с Вашия лекар преди приемането на този лекарствен продукт.

Шофиране и работа с машини

нео-ангин не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на нео-ангин

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този продукт.

Една таблетка за смучене съдържа 1,14 g глюкоза и 1,42 g захар (еквивалентни приблизително на 0,22 хлебни единици). Това трябва да се има предвид при пациенти с диабет. Захарното съдържание може да е вредно за зъбите (кариес).

нео-ангин съдържа оцветителя кохинил червено А (Е 124), който може да причини алергични реакции, включително астма. Реакциите на свръхчувствителност от оцветителя са по-чести при наличието на свръхчувствителност към ацетисалицилова киселина.

3. Как да приемате нео-ангин

Винаги приемайте нео-ангин точно както е указано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако не Ви е предписано друго от Вашия лекар, спазвайте следните указания:

Възрастни и деца над 6 годишна възраст трябва да приемат по 1 таблетка за смучене на всеки 2-3 часа. Таблетката трябва да се остави да се разтвори бавно в устата. Максималната дневна доза е 6 таблетки за смучене.



Продължителност на лечението

Трябва да се свържете с Вашия лекар, ако симптомите Ви се влошат или не се подобрят след 3-4 дни.

Ако сте приели повече от необходимата доза нео-ангин

Няма съобщения за случаи на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете нео-ангин

Ако сте пропуснали да приемете или сте приели по-малка от необходимата доза нео-ангин, продължете да вземате лекарството според указанията.

Ако сте спрели употребата на нео-ангин

Няма опасност от възникване на никакви проблеми при спиране на употребата на нео-ангин.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, нео-ангин може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Оценката на нежеланите реакции се базира на следната честота

Много чести	Повече от 1 от 10 пациенти
Чести	По-малко от 1 от 10 пациенти, но повече от 1 от 100 пациенти
Нечести	По-малко от 1 от 100 пациенти, но повече от 1 от 1000 пациенти
Редки	По-малко от 1 от 1000 пациенти, но повече от 1 от 10000 пациенти
Много редки	По-малко от 1 от 10000 пациенти, включително индивидуалните случаи

Много редки: възпаление на лигавицата на устата и стомаха

Оцветителят кохинил червено А (Е 124) може да причини алергични реакции.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля да уведомите Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате нео-ангин

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте нео-ангин след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25° С.



Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт, как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа нео-ангин

- Активните вещества са: 2,4-дихлоробензил алкохол 1,20 mg, амилметакрезол 0,60 mg, левоментол 5,90 mg
- Другите съставки са: масло от звездовиден анасон, ментово масло, захароза, глюкозен сироп, винена киселина, кохинил червено А (E124).

Как изглежда нео-ангин и какво съдържа опаковката

Червени, кръгли, полупрозрачни таблетки за смучене.

Оригинална опаковка – картонена кутия с 24 таблетки за смучене в PVC/алуминиеви блистери.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Divapharma GmbH

12274 Berlin

Германия

Представителство за България

Либра ЕАД

ул. Акад. Стефан Младенов 3

1700 София

Дата на последно одобрение на листовката

Юни/2011

