

## **ЛИСТОВКА**

## Листовка: информация за пациента

### Виатрикс 20 mg филмирани таблетки Viatrix 20 mg film-coated tablets ривароксабан (rivaroxaban)

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаките на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

#### Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Виатрикс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Виатрикс
3. Как да приемате Виатрикс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Виатрикс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. № .....	20220305 -
Разрешение № .....	63889 07-11-2023
БГЛА/МР .....	
Одобрене № .....	

#### 1. Какво представлява Виатрикс и за какво се използва

Виатрикс съдържа активното вещество ривароксабан.

Виатрикс се използва при възрастни за:

- предпазване от образуване на съсиреци в мозъка (инфаркт) и в други кръвоносни съдове на тялото Ви, ако имате един вид сърдечна аритмия, наречена неклапно предсърдно мъждане.
- лечение на съсиреци във вените на краката Ви (дълбока венозна тромбоза) и в кръвоносните съдове на белите Ви дробове (белодробен емболизъм) и за предпазване от повторното им образуване в кръвоносните съдове на краката и/или в белите дробове.

Виатрикс се използва при деца и юноши под 18 години и с телесно тегло 30 kg или повече за:


- лечение на кръвни съсиреци и предпазване от повторно образуване на кръвни съсиреци във вените или кръвоносните съдове на белите дробове след начално лечение от най-малко 5 дни с лекарства, които се инжектират, използвани за лечение на кръвни съсиреци.

Виатрикс принадлежи към група лекарства, наречени антитромбозни средства. Чрез действието си той блокира един фактор на кръвостъсирването (фактор Xa) и по този начин намалява склонността кръвта да образува съсиреци.

#### 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Виатрикс

#### Не приемайте Виатрикс

- ако сте алергични към ривароксабан или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако имате силно кървене;
- ако имате заболяване или състояние на орган в организма, което повишава риска за сериозно кървене (напр. стомашна язва, нараняване или кръвоизлив в мозъка, скорошна операция на мозъка или очите);
- ако приемате лекарства за предпазване от образуването на съсиреци (напр. дабигатран, апиксабан или хепарин), освен когато променяте антикоагулантното лечение или докато получавате хепарин през венозен или артериален катетър, за да го поддържате отворен;
- ако страдате от чернодробно заболяване, което води до повишен риск от кървене;
- ако сте бременно или кърмите.



**Не приемайте Виатрикс и информирайте Вашия лекар, ако някое от гореизброените се отнася за Вас.**

#### **Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Виатрикс.

#### **Обърнете специално внимание при употребата на Виатрикс**

-ако имате повишен риск от кървене, какъвто може да бъде случаят, например, при:

- тежко бъбречно заболяване при възрастни и умерено или тежко бъбречно заболяване при деца и юноши, понеже бъбречната Ви функция може да повлияе на количеството от лекарството, което действа в организма Ви;
  - ако приемате други лекарства за предпазване от образуването на съсиреци (напр. варфарин, дабигатран, апиксабан или хепарин) когато променяте антикоагулантното лечение или докато получавате хепарин през венозен или артериален катетър, за да го поддържа отворен (вж. точка “Други лекарства и Виатрикс”);
  - нарушения, свързани с кървене;
  - много високо кървно налягане, неовладяно с медикаментозно лечение;
  - заболявания на стомаха или червата, които може да доведат до кървене, напр. възпаление на стомаха или червата или възпаление на хранопровода, дължащо се на напр. на гастро-езофагеална рефлуксна болест (заболяване, при което стомашната киселина отива нагоре в хранопровода), или тумори, разположени в стомаха или червата, или гениталния тракт, или уринарния тракт;
  - проблем с кръвоносните съдове на очните дълни (ретинопатия);
  - белодробно заболяване, при което бронхите Ви са разширени и изпълнени с гной (бронхиектазии) или кървене от белия дроб в миналото;
- ако имате сърдечна клапна протеза;
- ако знаете, че имате заболяване, наречено антифосфолипиден синдром (нарушение на имунната система, което причинява повишен риск от образуване на кървни съсиреци), кажете на Вашия лекар, който ще вземе решение за необходимостта от промяна на лечението;
- ако Вашият лекар установи, че кървното Ви налягане е нестабилно, или се планира друго лечение или хирургична процедура за отстраняване на съсирак от белите Ви дробове.

**Ако някое от тези състояния се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар, преди да приемете Виатрикс. Вашият лекар ще реши дали да Ви лекува с това лекарство и трябва ли да бъдете наблюдавани по- внимателно.**

#### **Ако Ви предстои операция**

- Много е важно да приемате Виатрикс преди и след операцията точно във времето, определено от Вашия лекар.
- Ако операцията включва поставяне на катетър или инжекция в гръбначния стълб (напр. за епидурална или спинална упойка, или за намаляване на болка):
- Много е важно да приемате Виатрикс преди и след инжекцията или отстраняването на катетъра, точно когато Ви е казал Вашият лекар;
- Кажете на Вашия лекар веднага, ако усетите изтръпване или слабост в краката, или проблеми с червата или пикочния мехур, след края на упойката, тъй като е необходима спешна грижа.

#### **Деца и юноши**

**Таблетките Виатрикс не се препоръчват при деца с телесно тегло под 30 kg.**

Няма достатъчно информация за употребата на Виатрикс при деца и юноши при показанията за възрастни.

#### **Други лекарства и Виатрикс**

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, накратко след приемане или е възможно да приемате други лекарства, включително лекарства, отпускати без рецепта.

#### **• Ако приемате**

- някои лекарства за гъбични инфекции (напр. флуконазол, итраконазол, вориконазол, посаконазол), освен ако са само за приложение върху кожата;



- кетоконазол таблетки (използвани за лечение на синдром на Кушинг - когато организъмът произвежда излишък от кортизол);
- някои лекарства за бактериални инфекции (например кларитромицин, еритромицин);
- някои противовирусни лекарства за ХИВ / СПИН (напр. ритонавир);
- други лекарства за намаляване на кръвосъсирването (напр. еноксапарин, клопидогрел или антагонисти на витамин K, като варфарин и аценокумарол);
- противовъзпалителни и болкоуспокояващи лекарства (напр. напроксен или ацетилсалицилова киселина);
- дронедарон, лекарство за лечение на неправилен сърдечен ритъм;
- някои лекарства за лечение на депресия (селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRI) и инхибитори на обратното захващане на серотонина и норепинефрина (SNRI)).

**Ако някое от тези обстоятелства се отнася за Вас, информирайте Вашия лекар,** преди да приемете Виатрикс, понеже ефектът на Виатрикс може да бъде засилен. Вашият лекар ще реши дали да Ви лекува с това лекарство и трябва ли да бъдете наблюдавани по- внимателно.

Ако Вашият лекар смята, че имате повишен риск за развитие на стомашни или чревни язви, той може да назначи профилактично лечение за язва.

**• Ако приемате**

- някои лекарства за лечение на епилепсия (фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал);
- жълт кантарион (*Hypericum perforatum*), растителен продукт, използван за депресия;
- рифампицин (антибиотик).

**Ако някое от гореизброените се отнася за Вас, информирайте Вашия лекар,** преди да приемете Виатрикс, понеже ефектът на Виатрикс може да бъде намален. Вашият лекар ще реши дали да Ви лекува с Виатрикс и трябва ли да бъдете наблюдавани по- внимателно.

**Бременност, кърмене и фертилитет**

Не приемайте Виатрикс, ако сте бременна или кърмите. Ако има вероятност да забременеете, използвайте надеждно контрацептивно средство, докато приемате Виатрикс. Ако забременеете, докато приемате това лекарство, информирайте Вашия лекар незабавно, който ще реши как трябва да бъдете лекувана.

**Шофиране и работа с машини**

Виатрикс може да причини замаяност (честа нежелана реакция) или припадъци (нечеста нежелана реакция) (вижте точка 4, „Възможни нежелани реакции“). Не шофирайте, не карайте колело или не използвайте никакви инструменти или машини, ако имате тези симптоми.

**Виатрикс съдържа лактоза и натрий**

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.


**3. Как да приемате Виатрикс**

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Трябва да приемате Виатрикс заедно с храна.

Гълтайте таблетката (таблетките) за предпочитане с вода.

Ако се затруднявате да погълнете таблетката цяла, попитайте Вашия лекар за други начини да приемате Виатрикс. Таблетката може да се разтрости и размеси с вода или ябълково проре непосредствено преди да я приемете. Веднага след тази смес трябва да приемете храна.



Ако е необходимо, Вашият лекар може да Ви даде разтрощена таблетка Виатрикс също и през стомашна сонда.

### Каква доза да приемате

#### - Възрастни

- За предпазване от съсиреци в мозъка (инсулт) и другите кръвоносни съдове в тялото Ви Препоръчителната доза е една таблетка Виатрикс от 20 mg един път дневно. Ако страдате от бъбречни проблеми, дозата може да се намали до една таблетка Виатрикс от 15 mg един път дневно.  
Ако се нуждаете от процедура за лечение на блокираните кръвоносни съдове на сърцето (наречена перкутанна коронарна интервенция – ПКИ с поставяне на стент), има ограничени доказателства за намаляване на дозата до една таблетка Виатрикс 15 mg веднъж дневно (или до една таблетка Виатрикс 10 mg веднъж дневно, в случай, че вашите бъбреци не функционират правилно) в допълнение към антитромбозно лекарство като клопидогрел.
- За лечение на съсиреци във вените на краката Ви и на съсиреци в кръвоносните съдове на белите Ви дробове и за предпазване от повторно образуване на съсиреци Препоръчителната доза е една таблетка Виатрикс от 15 mg два пъти дневно през първите 3 седмици. За лечението след третата седмица препоръчителната доза е една таблетка Виатрикс от 20 mg един път дневно. След най-малко 6-месечно лечение на съсиреци Вашият лекар може да реши да продължи лечението или с една таблетка от 10 mg един път дневно, или с една таблетка от 20 mg един път дневно. Ако страдате от бъбречни проблеми и приемата една таблетка Виатрикс един път дневно, Вашият лекар може да реши да намали дозата за лечението след третата седмица до една таблетка Виатрикс от 15 mg един път дневно, ако рисъкът за кървене е по-висок от риска за повторно образуване на съсирик.

#### - Деца и юноши

Дозата Виатрикс зависи от телесното тегло и ще бъде изчислена от лекаря.

- Препоръчителната доза при деца и юноши с телесно тегло между 30 kg и по-малко от 50 kg е една таблетка Виатрикс 15 mg един път дневно.
- Препоръчителната доза при деца и юноши с телесно тегло 50 kg или повече е една таблетка Виатрикс 20 mg един път дневно.

Приемайте всяка доза Виатрикс с напитка (напр. вода или сок) по време на хранене. Приемайте таблетките всеки ден приблизително по едно и също време. Помислете да настроите аларма, която да Ви напомня.

За родители или болногледачи: моля наблюдавайте детето, за да осигурите прием на цялата доза.

Тъй като дозата Виатрикс е базирана на телесното тегло, важно е да спазвате насрочените посещения при лекар, защото може да е необходимо дозата да бъде коригирана, тъй като теглото се променя.


**Никога не коригирайте сами дозата Виатрикс.** Лекарят ще коригира дозата, ако е необходимо.

Не разделяйте таблетката в опит да набавите част от дозата в таблетката. Ако е необходима по-ниска доза, моля, използвайте другата възможна лекарствена форма Виатрикс гранули за перорална сусペンзия.

При деца и юноши, които не могат да погълнат таблетките цели, моля, използвайте Виатрикс гранули за перорална сусペンзия.

Ако няма налична перорална сусペンзия, може да разтрощите таблетката Виатрикс и да я смесите с вода или ябълково пюре непосредствено пред приема. Приемете ~~една~~ храна след приема на тази смес. Ако се налага, Вашият лекар може да Ви даде разтрощената таблетка Виатрикс и през стомашна сонда.

**Ако изплюете дозата или повърнете**



- по-малко от 30 минути след като сте приели Виатрикс, вземете нова доза.
- повече от 30 минути след като сте приели Виатрикс, **не вземайте нова доза**. В този случай вземете следващата доза Виатрикс в обичайното време.

Свържете се с лекаря, ако често изплювате дозата или повръщате след прием на Виатрикс.

#### **Кога да приемате Виатрикс**

Приемайте таблетката (таблетките) всеки ден, докато Вашият лекар Ви каже да спрете. Постарарайте се да приемате таблетката (таблетките) по едно и също време всеки ден – това ще Ви помогне да не забравяте. Вашият лекар ще реши колко дълго трябва да продължите лечението.

За да се предотврати образуването на кръвни съсиреци в мозъка (инфаркт) и други кръвоносни съдове във Вашето тяло: Ако сърдечната Ви дейност трябва да бъде възстановена до нормално състояние чрез процедура, наречена кардиоверсия, взимайте Виатрикс във времето, което Ви каже Вашият лекар.

#### **Ако сте пропуснали да приемете Виатрикс**

##### **- Възрастни, деца и юноши:**

Ако приемате една таблетка от 20 mg или 15 mg един път на ден и сте пропуснали една доза, приемете я веднага щом се сетите. Не приемайте повече от една таблетка за един ден, за да компенсирате пропуснатата доза. Приемете следващата таблетка на следващия ден и след това продължете да приемате по една таблетка един път дневно.

##### **- Възрастни:**

Ако приемате една таблетка от 15 mg два пъти на ден и сте пропуснали една доза, приемете я веднага щом се сетите. Не приемайте повече от две таблетки от 15 mg за един ден. Ако сте пропуснали да вземете една доза, може да вземете две таблетки от 15 mg едновременно, за да стане общата доза две таблетки (30 mg) за един ден. На следващия ден трябва да продължите да вземате по една таблетка от 15 mg два пъти дневно.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза Виатрикс**

Веднага се свържете с Вашия лекар, ако сте приели твърде много таблетки Виатрикс. Приемът на твърде голямо количество Виатрикс повишава риска от кървене.

#### **Ако сте спрели приема на Виатрикс**

Не спирайте приема на Виатрикс, без да сте се посъветвали с Вашия лекар, понеже Виатрикс лекува и предпазва от някои сериозни заболявания.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **4. Възможни нежелани реакции**


Както всички лекарства, Виатрикс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Като други подобни лекарства за намаляване образуването на кръвни съсиреци, Виатрикс може да доведе до кръвоизлив, който да е потенциално животозастрашаващ. Много силното кървене може също така да доведе до рязко спадане на кръвното налягане (шок). В някои случаи кръвоизливът може да не е видим.

**Информирайте Вашия лекар незабавно, ако при Вас или при Вашето дете се проявят едностранични следните нежелани реакции:**

##### **• Признаци на кървене**

- кръвоизлив в мозъка или в черепа (симптомите могат да включват главоболие, едностранична слабост, повръщане, гърчове, намалено ниво на съзнанието и скованост във времето. Сериозен спешен медицински случай. Потърсете медицинска помощ незабавно!);  
- продължително или много силно кървене;



- необичайна слабост, умора, бледност, замаяност, главоболие, необясним оток, задух, болка в гърдите или стенокардия.

Вашият лекар може да реши да Ви наблюдава по- внимателно или да промени лечението.

• **Признания на тежки кожни реакции**

- разпространяващ се интензивен кожен обрив, мехури или язви по лигавицата, напр. по устата или очите (синдром на Стивънс-Джонсън/токсична епидермална некролиза).
- лекарствена реакция, която причинява обрив, повишена температура, възпаление на вътрешните органи, отклонения в кръвните показатели и системно заболяване (DRESS синдром).

Честотата на тези нежелани реакции е много редки (до 1 на 10 000 души).

• **Признания на тежки алергични реакции**

- подуване на лицето, устните, устата, езика или гърлото; затруднено прегълъщане; уртикария и затруднено дишане; внезапно спадане на кръвното налягане.

Честотата на тежките алергични реакции е „много редки“ (анафилактични реакции, включително анафилактичен шок, може да засегнат до 1 на 10 000 души) и „нечести“ (ангиоедем и алергичен оток, може да засегнат до 1 на 100 души).

**Обобщен списък на възможните нежелани реакции, установени при възрастни, деца и юноши**

**Чести** (могат да засегнат до 1 на 10 души):

- намаление на броя на червените кръвни клетки, в резултат на което кожата може да стане бледа и да доведе до слабост или задух;
- кървене в стомаха или червата, кървене от пикочно-половите органи (включително кръв в урината и обилно менструално кървене), кървене от носа, кървене от венците;
- тромбоцитопения (нисък брой тромбоцити; това са клетки, които помагат съсирането на кръвта);
- кървене в окото (включително кървене от „бялото на очите“);
- кървене в тъкан или кухина на тялото (кръвонасядания, синини);
- кървави храчки;
- кървене от кожата или под кожата;
- кървене след операция;
- сълзене на кръв или течности от хирургическа рана;
- отоци по крайниците;
- болка в крайниците;
- увредена бъбречна функция (може да бъде видяно в изследванията, направени от Вашия лекар);
- висока температура;
- намаление на броя на червените кръвни клетки, в резултат на което кожата може да стане бледа и да доведе до слабост или задух;
- болки в стомаха, нарушен храносмилане, гадене или повръщане, запек, диария
- ниско кръвно налягане (със симптоми, като усещане за замаяност или прималяване при изправяне);
- намалена обща сила и енергичност (слабост, умора), главоболие, замаяност;
- обрив, сърбеж по кожата;
- изследванията на кръвта могат да покажат повишаване на някои чернодробни ензими.

**Нечести** (могат да засегнат до 1 на 100 души):

- кръвоизлив в мозъка или в черепа (вижте по-горе, Признания на кървене);
- холестаза (намалено отделяне на жълчката), хепатит вкл. хепатоцелуларно увреждане (възпален черен дроб, включително чернодробно увреждане);
- кръвоизлив в става, който да предизвика болка и оток;
- алергични реакции, включително кожни алергични реакции;
- нарушен чернодробна функция (може да се установи, ако лекарят Ви назначи изследвания).



- изследванията на кръвта може да покажат повишаване на билирубина, на някои панкреатични или чернодробни ензими или на броя на тромбоцитите;
- премаляване;
- общо неразположение;
- ускорен сърдечен ритъм;
- сухота в устата;
- уртикария.

**Редки** (могат да засегнат до 1 на 1000 души):

- кървене в мускул;
- пожълтяване на кожата и очите (жълтеница);
- локализиран оток;
- събиране на кръв (хематом) в слабините след усложнение от сърдечна процедура, при която е поставен катетър в артерия на Вашия крак (псевдоаневризма).

**Много редки** (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

- натрупване на еозинофили (гранулоцити), вид бели кръвни клетки, които причиняват възпаление в белите дробове (еозинофилна пневмония).

**С неизвестна честота** (от наличните данни не може да бъде направена оценка за честотата):

- бъбречна недостатъчност след тежко кървене;
- нарушение на бъбречната функция, възникващо при антикоагулантно лечение, понякога с наличие на кръв в урината (нефропатия, свързана с антикоагуланти);
- повищено напрежение в мускулите на краката или ръцете след кървене, което води до болка, оток, променена чувствителност, изтръпване или парализа (компартмент синдром след кървене).

**Нежелани реакции при деца и юноши**

Общо взето нежеланите реакции, наблюдавани при деца и юноши, лекувани с Виатрикс, са подобни по вид с тези, наблюдавани при възрастни, и са били предимно леки до умерени по тежест.

Нежелани реакции, които са наблюдавани по-често при деца и юноши:

**Много чести** (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

- главоболие;
- повищена температура;
- кървене от носа;
- повръщане.

**Чести** (могат да засегнат до 1 на 10 души):

- ускорена сърдечна дейност;
- изследванията на кръвта могат да покажат повишаване на билирубина (жълчен пигмент);
- тромбоцитопения (нисък брой тромбоцити, които представляват клетки, които спомагат за съсирването на кръвта);
- тежко менструално кървене.

**Нечести** (могат да засегнат до 1 на 100 души):

- изследванията на кръвта могат да покажат повишаване на един подвид на билирубина (директен билирубин, жълчен пигмент).

**Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на:

Изпълнителна агенция по лекарствата,  
ул. „Дамян Груев“ № 8,



1303 София,  
тел.: 02 8903417,  
уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

## 5. Как да съхранявате Виатрикс

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и на всеки блистер след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изиска специални температурни условия за съхранение. Съхранявайте в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Разтрощени таблетки

Разтрощените таблетки са стабилни във вода и ябълково пюре до 4 часа.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа Виатрикс

Активно вещество: ривароксабан.

Една филмирана таблетка съдържа 20 mg ривароксабан.

Помощни вещества:

#### Ядро на таблетката

Целулоза, микрокристална

Лактозаmonoхидрат

Повидон K30

Нишесте, прежелатинизирано

Кросповидон

Натриев лаурилсулфат

Магнезиев стеарат

#### Филмово покритие

Хипромелоза E464

Титанов диоксид E171

Макрогол 4000 E1521

Железен оксид, червен E172

### Как изглежда Виатрикс и какво съдържа опаковката

Кафяво-червени, кръгли, двойноизпъкнали филмирани таблетки с диаметър приблизително 7 mm.

Предлага се в блистери или блистери с единични дози, съдържащи 5, 5x1, 10, 10x1, 14x1, 15, 15 x 1, 28, 28x1, 30, 30x1, 42, 42x1, 50, 50x1, 56, 56x1, 98, 98x1, 100 и 100x1 филмирани таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.



**Притежател на разрешението за употреба**

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Германия

**Производител**

Hemopharm GmbH

Theodor-Heuss Strasse 52

61118 Bad Vilbel

Германия

**Дата на последно преразглеждане на листовката.**

Септември 2023



**СИГНАЛНА КАРТА НА ПАЦИЕНТА**  
**Виатрикс 20 mg филмирани таблетки**

Сигнална карта за пациента

STADA – logo

Виатрикс 20 mg филмирани таблетки

- ♦ Носете със себе си тази карта през цялото време
  - ♦ Представяйте тази карта на всеки лекар или зъболекар преди лечение
- Аз съм на антикоагулантно лечение с Виатрикс (ривароксабан)**

Име:

Адрес:

Дата на раждане:

Тегло:

Други лекарства/заболявания:

**В случай на спешна ситуация моля информирайте:**

Име на лекаря:

Телефонен номер на лекаря:

Печат на лекаря:

**Моля информирайте още:**

Име:

Телефон:

Родствена връзка:

**Информация за медицинските специалисти:**

- ♦ Не трябва да се използват INR стойности, понеже те не са надеждно средство за измерване на антикоагулантното действие на Виатрикс.

**Какво трябва да знам за Виатрикс?**

- ♦ Виатрикс разрежда кръвта, което Ви предпазва от образуване на опасни кръвни съсиреци.
- ♦ Виатрикс трябва да се приема точно както Ви е предписан от Вашия лекар. За да си осигурите оптимална защита от образуването на кръвни съсиреци, никога не пропускайте доза.
- ♦ Не трябва да спирате приема на Виатрикс, без преди това да сте говорили с Вашия лекар, тъй като рисъкът от образуване на съсиреци при Вас може да се повиши.
- ♦ Информирайте Вашия медицински специалист, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, преди да започнете прием на Виатрикс.
- ♦ Информирайте Вашия медицински специалист, че приемате Виатрикс преди всяка операция или инвазивна процедура.

**Кога трябва да потърся съвет от мой медицински специалист?**

Когато приемате лекарство за разреждане на кръвта, като Виатрикс, е важно да бъдете наясно с неговите възможни нежелани реакции. Най-честата нежелана реакция е кървене. Не започвайте да приемате Виатрикс, ако знаете, че сте с риск от кървене, без преди това да сте го обсъдили с Вашия лекар. Кажете на Вашия медицински специалист незабавно, ако имате някакви признания или симптоми на кървене, като например следните:

- ♦ болка
- ♦ оток или дискомфорт
- ♦ главоболие, замаяност или слабост
- ♦ необичайни синини по кожата, кървене от носа, кървене от венците, пораждане на венци
- ♦ кървенето спира бавно
- ♦ менструално или вагинално кървене, което е по-силно от нормалното
- ♦ кръв в урината, която може да бъде с розов или кафяв цвят, червени или черни изражнения
- ♦ изкашляне на кръв или повръщане на кръв или на материји, които изглеждат като утайка на кафе



**Как да приемам Виатрикс?**

- ♦ За да се осигури оптимална защита, Виатрикс
- 20 mg трябва да бъде приеман с храна

