

## Листовка: информация за пациента

### Зил Т инжекционен разтвор Zeel T solution for injection

Хомеопатичен лекарствен продукт

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

**Какво съдържа тази листовка**

1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Зил Т
3. Как да използвате Зил Т
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Зил Т
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА</b>	
Листовка - Промоция 2	
Към Рег. №	20180186
Разрешение №	02-04-2024
BG/MA/MP -	65071
Одобрение №	/

#### 1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Зил Т се използва при:

- Артроза/остеоартрит
- Гонартроза
- Полиартроза
- Спондилартроза
- Синдром на ротаторния маншон
- Ревматични ставни заболявания

#### 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Зил Т

**Не приемайте Зил Т**

- ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта.

**Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Зил Т.

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши се консултирайте с лекар или фармацевт.

**Други лекарства и Зил Т**

Не са известни лекарствени взаимодействия.

**Употреба на Зил Т с храна, напитки и алкохол**

Няма несъвместимости.

**Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

**Шофиране и работа с машини**



Зил Т не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

#### **Зил Т съдържа етанол**

Този лекарствен продукт съдържа 1,9 mg алкохол (етанол) във всяка ампула (0,1% w/w).

Количеството в една ампула се равнява на по-малко от 1 ml бира или 1 ml вино.

Количеството алкохол в този лекарствен продукт е малко и не предполага да има видими реакции.

#### **Зил Т съдържа натрий**

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) за доза, т.е. може да се счита, че е без съдържание на натрий.

### **3. Как да приемете Зил Т**

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

При възрастни и деца над 12 години обикновено 1 ампула (= 2,0 ml) 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 1 ампула (= 2,0 ml) дневно, след което се преминава към стандартната дозировка.


#### **Употреба при деца**

При деца от 6 до 11 години 2/3 от ампулата (= 1,3 ml) 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 2/3 от ампулата (= 1,3 ml) дневно, след което се преминава към стандартната дозировка.

Начин на приложение:

Зил Т може да се прилага s.c. (подкожно), i.d. (кожно), i.m. (мускулно) или i.a. (вътреставно).

#### **Инструкции за отваряне на ампулата:**



Дръжте внимателно. Не е нужно да режете ампулата, за да я отворите. Хванете ампулата под ъгъл и разклатете, за да няма разтвор в главата на ампулата. След това счупете ампулата като натиснете над цветната точка. Изхвърлете отпадъците след употреба.

#### **Ако сте използвали повече от необходимата доза Зил Т**

Зил Т няма доза на предозиране.

#### **Ако сте пропуснали да приложите Зил Т**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

#### **Ако сте спрели употребата на Зил Т**

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **4. Възможни нежелани реакции**



Както всички лекарства, Зил Т може да причини нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. В редки случаи са докладвани преходни алергични кожни реакции.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +35 928903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### **5. Как да съхранявате Зил Т**

Без специални условия на съхранение.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Не се използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия след “Годен до:”! Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарството, което вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

##### **Какво съдържа Зил Т**

1 ампула от 2,0 ml (=2,0 g) съдържа:

- Активни вещества:

Acidum thioccticum	D 8	2,0 mg
Arnica montana	D 4	200,0 mg
Cartilago suis	D 6	2,0 mg
Coenzym A	D 8	2,0 mg
Embryo totalis suis	D 6	2,0 mg
Funiculus umbilicalis suis	D 6	2,0 mg
Nadidum	D 8	2,0 mg
Natrium diethyloxalaceticum	D 8	2,0 mg
Placenta totalis suis	D 6	2,0 mg
Rhus toxicodendron	D 2	10,0 mg
Sanguinaria canadensis	D 4	3,0 mg
Solanum dulcamara	D 3	10,0 mg
Sulfur	D 6	3,6 mg
Symphytum officinale	D 6	10,0 mg

- Други съставки (помощни вещества): вода за инжекции, натриев хлорид.

##### **Как изглежда Зил Т и какво съдържа опаковката**

Ампули от безцветно стъкло тип I (2,0 ml) с маркировка цветна точка, 2 вложки по 5 ампули, поставени в картонена кутия.

##### **Притежател на разрешението за употреба и производител**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Германия

Phone: 0049 (0)7221 501 00, Fax: 0049 (0)7221 501 485

Дата на последно преразглеждане на листовката: февруари 2023

