

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Викс Симптомед Комплийт 500 mg/200 mg/10 mg прах за перорален разтвор
парацетамол/гуайфенезин/фенилефринов хидрохлорид
Vicks Symptomed Complete 500mg/200mg/10mg powder for oral solution/
paracetamol/guaifenesin/phenylephrine hydrochloride

20/10/19
39655
Разрешение № 15-09-2016
Освобождение №

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това е необходимо да използвате Викс Симптомед Комплийт внимателно, за да имате най-добри резултати от лечението с него.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Попитайте Вашия фармацевт, ако се нуждаете от повече информация или съвет.
- Трябва да се свържете с Вашия лекар, ако симптомите Ви се влошат или не се подобрят след 3 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Викс Симптомед Комплийт и за какво се използва
2. Преди да приемете Викс Симптомед Комплийт
3. Как да приемете Викс Симптомед Комплийт
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Викс Симптомед Комплийт
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВИКС СИМПТОМЕД КОМПЛИЙТ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Викс Симптомед Комплийт е предназначен за облекчение на симптоми на настинка и грип. Той съдържа три активни съставки:


- парацетамол е добре известен болкоуспокояващ продукт (аналгетик). Той е ефективен срещу болки, включително главоболие и възпалено гърло и може също да понижава температурата (антипиретик);
- гуайфенезин (като експекторант) разводнява секрета, което помага да се облекчи гръдната кашлица;
- фенилефринов хидрохлорид (назален деконгестант) намалява отока на носните проходи и така облекчава запушения нос.

Трябва да използвате Викс Симптомед Комплийт, ако имате болка/или висока температура, запушване на носа и гръдна кашлица.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ ВИКС СИМПТОМЕД КОМПЛИЙТ

Не приемайте Викс Симптомед Комплийт:

- ако сте алергични към парацетамол, гуайфенезин, фенилефринов хидрохлорид или някоя от останалите съставки (вижте точка 6);
- ако имате сърдечно заболяване;
- ако имате високо кръвно налягане (хипертония);
- ако имате проблем с черния дроб или тежко бъбречно заболяване;



- ако имате свръхактивност на щитовидната жлеза;
- ако сте диабетик;
- ако имате глаукома (повишено налягане в окото) от тясно-ъгълен тип;
- ако имате порфирия, което е наследствено нарушение, характеризиращо се с прекомерно количество пигменти в урината;
- ако приемате трициклични антидепресанти;
- ако приемате бета-блокери;
- ако приемате моноаминооксидазни инхибитори (МАОИ) - използвани за лечение на депресия или болестта на Паркинсон или сте ги приемали през последните 14 дни;
- ако приемате лекарства за намаляване на кръвното налягане или за лечение на стенокардия.

Не давайте Векс Симптомед Комплийт на деца под 12 годишна възраст.

Важно: съдържа парацетамол. Да не се приема едновременно с други продукти, които съдържат парацетамол.

Незабавно трябва да се потърси медицинска помощ в случай на предозиране, дори когато се чувствате добре, поради риска от забавено, сериозно чернодробно увреждане. Да не се приема едновременно с други продукти за лечение на грип, настинка или запушен нос.

Попитайте Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Векс Симптомед Комплийт:

- ако имате проблем с чернодробните функции;
- ако сте мъж и имате увеличена простатна жлеза, тъй като може да е по-трудно да уринирате;
- ако имате проблем с кръвообращението (включително синдром на Рейно);
- ако имате продължителна или хронична кашлица като тази при пушачи, астма, хроничен бронхит или емфизем.

Употреба на други лекарства

Попитайте Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Векс Симптомед Комплийт, ако приемате:

- лекарства, съдържащи парацетамол или други деконгестанти за настинка и грип. Ако приемате такива лекарства, не приемайте Векс Симптомед Комплийт;
- моноаминооксидазни инхибитори (МАОИ) - използвани за лечение на депресия или болестта на Паркинсон. **Не приемайте Векс Симптомед Комплийт, ако сте приемали МАОИ през последните 14 дни;**
- трициклични антидепресанти за депресия, като амитриптилин или имипрамин;
- лекарство за високо кръвно налягане (антихипертензивни продукти), включително бета-блокери или за подобряване на сърдечната функция или коригиране на нередовен сърдечен ритъм (дигоксин, ланоксин, дигитоксин);
- фенотиазини (които се използват или като антипсихотични лекарства за лечение на състояния като шизофрения или параноя, или за предотвратяване на гадене и повръщане);
- лекарство за гадене и повръщане (като метоклопрамид или домперидон);
- лекарство за разреждане на кръвта (антикоагуланти), като варфарин или други кумарини;
- лекарство за висок холестерол (като холестирамин);
- седативи (барбитурати);
- пробеницид или азидотимидин (зидовудин);
- изониазид (използван за лечение или предотвратяване на туберкулоза).

Прием на Векс Симптомед Комплийт с храна и напитки



Не приемайте този продукт с алкохолни напитки.

Бременност и кърмене

Прием на Викс Симптомед Комплийт по време на бременност или кърмене не се препоръчва: консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употреба.

Шофиране и работа с машини

Този продукт може да причини замайване или объркване. Ако сте засегнати, не шофирайте и не работете с машини.

Важна информация за някои от съставките на Викс Симптомед Комплийт

Този продукт съдържа:

- аспартам (E951), източник на фенилаланин. Може да бъде вреден за хора с фенилкетонурия;
- захароза. Ако Вашия лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемате този лекарствен продукт;
- натрий (157 mg на доза). Да се има предвид от пациенти на контролиран прием на натрий.

3. КАК ДА ПРИЕТЕ ВИКС СИМПТОМЕД КОМПЛИЙТ

Винаги приемайте Викс Симптомед Комплийт точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт; консултирайте се с тях, ако не сте сигурни в нещо.

Дозировка

Това лекарство е прах, който трябва да бъде разтворен във вода и приет като топла напитка. Изсипете едно саше от праха в чаша със стандартен размер и напълнете с гореща, но не вряща вода (около 250 ml). Оставете да изстине до температура, подходяща за пиене.

Възрастни и деца над 12-годишна възраст:

1 саше на всеки 4-6 часа както е указано. Не приемайте повече от 4 сашета на всеки 24-часов период.

Да не се дава на деца под 12 години.

Да не се превишава посочената доза.

Не приемайте това лекарство с алкохолни напитки.

Продължителната употреба на този продукт не се препоръчва. Консултирайте се с Вашия лекар, ако симптомите продължават повече от 3 дни или се влошават.

Ако приемете повече Викс Симптомед Комплийт отколкото е необходимо:

Незабавно потърсете медицинска помощ ако инцидентно сте приели повече отколкото трябва или ако дадете на дете повече, отколкото е препоръчано, дори ако Вие/детето се чувствате добре, поради риска от сериозно чернодробно увреждане.

Ако имате някакви допълнителни въпроси за употребата на този продукт, попитайте Вашия фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ



Както всички лекарства, Викс Симптомед Комплийт може да причини нежелани лекарствени реакции, макар че не всеки ги получава.

Ако изпитате някой от следните сериозни нежелани ефекти, незабавно спрете приема на това лекарство и потърсете спешно лекарска помощ.

- Много редки случаи на сериозни кожни реакции са докладвани. Тежки алергични реакции (анафилаксия), хрипове или затруднено дишане може да се появят рядко (редки: засягат по-малко от 1 на 1000 души, но повече от 1 на 10 000 души; Много редки: засягат по-малко от 1 на 10000 души).
- Много рядко може да се появят някои нарушения на кръвните клетки и панкреатит (възпаление на панкреаса) с парацетамол (засяга по-малко от 1 на 10000 души)

Други нежелани реакции

Честота	Нежелана реакция
Чести (засягат по-малко от 1 на 10 души, но повече от 1 на 100 души)	Загуба на апетит, гадене или повръщане
Редки (засягат по-малко от 1 на 1000 души, но повече от 1 на 10000 души)	Слаби алергични реакции (като кожни обриви или мехури), болка в стомаха, диария, Главоболие, замаяност Сърцебиене (палпитации), високо кръвно налягане, трудно заспиване (безсъние), нервност, треперене (тремор), раздразнителност, безпокойство, обърканост или тревожност.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, болничен фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Когато съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВИКС СИМПТОМЕД КОМПЛИЙТ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца

Да се съхранява под 25 °C.


Не приемайте Викс Симптомед Комплийт след срока на годност, отбелязан върху сашето или картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Викс Симптомед Комплийт

Всяко саше от това лекарство представлява единична доза, съдържаща **активните вещества**: 500 mg парацетамол, 200 mg гуайфенезин и 10 mg фенилефринов хидрохлорид.



Останалите съставки са: захароза, лимонена киселина, винена киселина, натриев цикламат, натриев цитрат, аспартам (E951), ацесулфам калий (E950), ментол на прах, аромат на лимон, аромат на лимонов сок, хинолоново жълто (E104). Вижте края на точка 2.

Как изглежда Викс Симптомед Комплийт и какво съдържа опаковката

Викс Симптомед Комплийт е почти бял прах, който е опакован в ламинирано саше в картонена опаковка. Продуктът е наличен в картонени опаковки с 5 и 10 сашета.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Тева Фармасютикълс България ЕООД
ул. Н. В. Гогол 15, ет.1, 1124 София
България

Производител

Wrafton Laboratories Limited Braunton, Devon, EX33 2DL Обединено кралство

Дата на последно одобрение на листовката

ММ/ГГГГ

