

Листовка: Информация за потребителя

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Файл №: 00000000000000000000000000000000

Приложение 2

Към Рег. №: 20060717

Алпекид ДЕНТО таблетки

AlpeKid DENTO tablets

Приложение №:

BG/MA/MP - 64387

17-01-2024

Обръжение №:

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако мислите, че детето Ви е получило някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте т. 4.
- Ако детето Ви не се почувства по-добре или състоянието му се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Алпекид ДЕНТО и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Алпекид ДЕНТО
3. Как да използвате Алпекид ДЕНТО
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Алпекид ДЕНТО
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Алпекид ДЕНТО и за какво се използва

Алпекид ДЕНТО е хомеопатично лекарство за лечение на оплакванията при поникване на зъби при кърмачета и малки деца като раздразненост, беспокойство, болки в ушите, болезнени венци, повишена температура и стомашно – чревно разстройство.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате Алпекид ДЕНТО

Не използвайте Алпекид ДЕНТО

- ако детето Ви е алергично към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в т. 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Консултирайте се с Вашия лекар:

- ако Вашето дете не се повлиява достатъчно от приема на Алпекид ДЕНТО,
- ако се появят допълнителни оплаквания.

Други лекарства и Алпекид ДЕНТО

Взаимодействия с други лекарства не са наблюдавани. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако Вашето дете приема, доскоро е приемало или е възможно да приема други лекарства.

Алпекид ДЕНТО с храни, напитки и алкохол



Употребата на това лекарство с храни и напитки не е препоръчителна. Спазвайте интервал от най-малко половин час.

Бременност, кърмене и фертилитет
Това лекарство е предназначено за деца.

Шофиране и работа с машини
Това лекарство е предназначено за деца.

АлпеКид ДЕНТО съдържа лактоза (млечна захар).
Ако Вашият лекар Ви е казал, че детето Ви има непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да използвате това лекарство.

3. Как да използвате АлпеКид ДЕНТО

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Препоръчителната доза е:

Деца под 1 година:
При остри оплаквания се приема по 1 таблетка на всеки час до максимум 6 таблетки на ден.
След отшумяване на оплакванията се приема по 1 таблетка 3 пъти на ден.

Деца на възраст от 1 до 6 години:
При остри оплаквания се приемат по 2 таблетки на всеки час до максимум 12 таблетки на ден.
След отшумяване на оплакванията се приемат по 2 таблетки 3 пъти на ден.

Таблетките се оставят да се разтопят бавно в устата. Ако е необходимо, таблетките могат да се разтворят в малко вода.

Ако сте използвали повече от необходимата доза АлпеКид ДЕНТО
Не се очакват вредни ефекти в случай на предозиране.

Ако сте пропуснали да използвате АлпеКид ДЕНТО
Не давайте на Вашето дете двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на АлпеКид ДЕНТО
Не се очакват никакви вредни ефекти

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Няма известни нежелани лекарствени реакции.



Забележка: При употреба на хомеопатични лекарства съществуващи оплаквания могат да се влошат временно (начално хомеопатично влошаване). В тези случаи прекратете приема на АлпеКид ДЕНТО и се консултирайте с Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако детето Ви получи някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

Уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате АлпеКид ДЕНТО

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте това лекарство след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа АлпеКид ДЕНТО

- Активни вещества са: Беладона (Belladonna) D6 15 mg, Хамомила (Chamomilla) D6 15 mg, Ферум фосфорикум (Ferrum phosphoricum) D6 15 mg, Хепар сулфурис (Hepar sulfuris) D12 15 mg, Пулсатила (Pulsatilla) D6 15 mg в една таблетка (100 mg)
- Другите съставки са: Целулоза, микрокристална, талк, лактоза моногидрат, магнезиев стеарат

Как изглежда АлпеКид ДЕНТО и какво съдържа опаковката

Бутилка от кафяво стъкло, с пластмасова капачка, съдържаща 150 таблетки; 30 таблетки в блистер, 1 или 2 блистера в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба:

Alpen Pharma GmbH

Steinenfeld 3

77736 Zell am Harmersbach

Германия

Производител:

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottistraße 24

76227 Karlsruhe

Германия



или

Dr. Gustav Klein GmbH
Im Steinenfeld 3
77736 Zell am Harmersbach
Германия

За допълнителна информация за това лекарство, моля обърнете се към локалния представител на Притежателя на разрешението за употреба:

Алпен Фарма ООД
България

Дата на последно преразглеждане на листовката:
Септември 2023

