

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка Приложение 2	
Към Reg. №	20011049
Разрешение №	
Тартефедрил перорални капки, разтвор - 65938 05-07-2024	
Tartephedreel oral drops, solution	
Договор №	/
Одобрение №	/

Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след едноседмично приложение на продукта не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Тартефедрил и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Тартефедрил
3. Как да приемете Тартефедрил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тартефедрил
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Тартефедрил и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Бронхити, включително астматични; непродуктивна кашлица, особено при астма и коклюш; катари на дихателните пътища

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Тартефедрил

Не приемайте Тартефедрил

- Ако имате свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.
- При продължителна персистираща симптоматика, задух или възпаление, или изкашляне на храчки или кръв се консултирайте с лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Тартефедрил. Ако симптомите продължат или състоянието Ви се влоши се консултирайте с лекар или фармацевт.

Други лекарства и Тартефедрил

Не са известни лекарствени взаимодействия

Тартефедрил с храна, напитки и алкохол

Няма несъвместимости

Фертилит, бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.



Шофиране и работа с машини

Тартефедрил не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

Тартефедрил съдържа етанол

Този продукт съдържа 140 mg алкохол (етанол) за доза от 10 капки (35 об.% алкохол).

Количество в 10 капки се равнява на по-малко от 3,5 ml бира или 1,4 ml вино.

Количество алкохол е пренебрежимо малко и не предполага да има видими реакции.

3. Как да приемете Тартефедрил

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е посъветвал Вашия лекар или фармацевт.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

При възрастни и деца над 6 годишна възраст, обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При остри състояния – по 10 капки на всеки 15 мин. (за период от 2 часа).

Употреба при деца

- при деца до 2 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно.

От 2 до 6 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно.

Начин на приложение

Този лекарствен продукт не трябва да се приема с храна. При деца капките се накапват в малко вода.

Ако сте приели повече от необходимата доза Тартефедрил

Тартефедрил няма доза на предозиране

Ако сте пропуснали да приемете Тартефедрил

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

Ако сте спрели употребата на Тартефедрил

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4. Възможни нежелани реакции

Както всяко лекарство, и това може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. В много редки случаи може да се появи реакция на свръхчувствителност

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg



Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Тартефедрил

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност – 5 години.

Срок на годност след първо отваряне на бутилката – 6 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

- Какво съдържа Тартефедрил

100 g съдържат:

Активни вещества:

Arsenum iodatum	D6	10.0 g
Atropa belladonna	D4	10.0 g
Blatta orientalis	D6	5.0 g
Illicium verum	D3	5.0 g
Kalium stibyltartaricum	D4	10.0 g
Lobelia inflata	D4	5.0 g
Naphthalinum	D6	5.0 g
Natrium sulfuricum	D4	10.0 g
Psychotria ipecacuanha	D4	5.0 g

Помощни вещества:

Етанол 96%

Пречистена вода

Съдържа 35 об.% алкохол

Как изглежда и какво съдържа опаковката:

Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от PP и апликатор-калкомер от PE, поставени в картонена кутия

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

Тел: 0049 (0)7221 501 00, Факс: 0049 (0)7221 501 485

Дата на последно преразглеждане на листовката:

03/2024

