

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА**

Листовка - Приложение 2

Към Рег. № 20150338

Разрешение №

BG/MA/MP-57272

Формация №

23. 04. 2021

Листовка: Информация за потребителя

Берберис-Хомакорд, перорални капки, разтвор  
Berberis-Homaccord, oral drops,**Хомеопатичен лекарствен продукт**

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка
- Ако след една седмица не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ

**Какво съдържа тази листовка:**

1. Какво представлява Берберис-Хомакорд и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Берберис-Хомакорд
3. Как да приемете Берберис-Хомакорд
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Берберис-Хомакорд
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява Берберис-Хомакорд и за какво се използва**  
Хомеопатичен лекарствен продукт.

При възпаление и дразнене на уринарния тракт.

**2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Берберис-Хомакорд**

- Не приемайте този продукт при алергия към някоя от основните или помощните му съставки. Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 138 mg за доза (10 капки), равно на 4 ml бира и 2 ml вино. Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.
- Употреба на други лекарства и Берберис-Хомакорд – не са известни лекарствени взаимодействия
- Употреба на Берберис-Хомакорд с храна и напитки – няма несъвместимости
- Бременност, кърмене и фертилитет – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство
- Шофиране и работа с машини – Берберис-Хомакорд не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

**3. Как да приемете Берберис-Хомакорд**

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Лекарството се приема поне 30 мин. преди ядене.

При деца капките се накапват в малко вода.

Приемайте този лекарствен продукт толкова дълго, колкото Ви е препоръчал Вашият лекар или фармацевт.

При възрастни и деца над 12 год. възраст обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При остри състояния – по 10 капки през 30 мин. до 1 час (до 12 приема дневно) след което се преминава към стандартната дозировка.



- Употреба при деца - При деца до 1 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно. При остри състояния - по 3 капки през 30 мин. до 1 час (до 12 приема дневно), след което се преминава към стандартната дозировка. От 2 до 5 год. възраст - по 5 капки 3 пъти дневно. При остри състояния - по 5 капки през 30 мин. до 1 час (до 12 приема дневно), след което се преминава към стандартната дозировка. От 6 до 11 год. възраст - по 7 капки 3 пъти дневно. При остри състояния - по 7 капки през 30 мин. до 1 час (до 12 приема дневно), след което се преминава към стандартната дозировка.
- Ако сте приели повече от обичайната доза – Берберис-Хомакорд няма доза на предозиране
- Ако сте пропуснали да приемете Берберис-Хомакорд – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
- Ако сте спрели употребата на Берберис-Хомакорд – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### 4. Възможни нежелани реакции

Както всяко лекарство, и това може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. За Берберис-Хомакорд няма съобщени нежелани реакции. Ако получите някаква нежелана реакция се посъветвайте с Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата  
ул. „Дамян Груев” № 8  
1303 София  
Тел.: +35 928903417  
уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### 5. Как да съхранявате Берберис-Хомакорд

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

Срок на годност – 3 години. Срокът на годност е до последния ден от месеца, отбелязан върху опаковката.

Срок на годност след отваряне на първичната опаковка – 6 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

- Какво съдържа Берберис-Хомакорд

100 g съдържат:

Активни вещества:

Berberis vulgaris	D2	0.4 g
Berberis vulgaris	D10	0.4 g
Berberis vulgaris	D30	0.4 g
Berberis vulgaris	D200	0.4 g
Citrullus colocynthis	D2	0.3 g
Citrullus colocynthis	D10	0.3 g
Citrullus colocynthis	D30	0.3 g
Citrullus colocynthis	D200	0.3 g



Veratrum album	D3	0.3 g
Veratrum album	D10	0.3 g
Veratrum album	D30	0.3 g
Veratrum album	D200	0.3 g

Помощни вещества:

Пречистена вода

Етилов алкохол (за приготвяне на хомеопатични разреждания)

**Съдържат 35 об.% алкохол**

- **Как изглежда и какво съдържа опаковката:** Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от PP и апликатор-капкомер от PE, поставени в картонена кутия

- **Притежател на разрешението за употреба и производител:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

- **Дата на последно преразглеждане на листовката:** 03.2021

