

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Потребителя	Към Рег. № <u>20040557</u>
Разрешение №	<u>66358</u> , 21-08-2024
BG/MA/MP	
Одобрение №	✓

Листовка: информация за потребителя

СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване
Бутамиратов цитрат

SINECOD 50 mg prolonged-release tablets
Butamirate citrate

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждате от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване
3. Как да приемате СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. **Какво представлява СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване и за какво се използва**

СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване съдържа активната съставка бутамиратов цитрат, която принадлежи към групата лекарствени средства за потискане на кашлицата.

СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване се използва за симптоматично лечение на кашлица от различен произход.

2. **Какво трябва да знаете, преди да приемете СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване**

Не приемайте СИНЕКОД 50mg таблетки с удължено освобождаване

- ако сте алергични към бутамиратов цитрат или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6 и в края на точка 2).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване.

Не приемайте едновременно с други отхрачващи лекарства.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако симптомите продължават или не се подобряват.



Други лекарства и СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване

Избягвайте едновременната употреба с други лекарства за лечение на кашлица, защото това може да доведе до задържане на бронхиален секрет в дробовите Ви.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително лекарства без лекарско предписание или хранителни добавки.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, не приемайте СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване, освен ако не Ви е препоръчано от Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

В редки случаи, СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване може да намали бдителността при някои хора, в сравнение с нормалното състояние. Ако това се прояви при вас, трябва да сте предпазливи в използването на това лекарство при шофиране или работа с машини. Вашето дете трябва да избягва карането на велосипед или скутер в уличното движение, когато използва СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване.

Важна информация за някои от помощните вещества в СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване

Лактоза монохидрат: ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Не приемайте СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване повече от една седмица без да се посъветвате с Вашия лекар.

Прилагайте най-ниската доза за лечение на симптомите и използвайте СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване за най-кратък период на лечение.

Юноши на възраст над 12 години: 1 таблетка два пъти дневно.

Възрастни: 1 таблетка три пъти дневно на 8-часов интервал. Таблетките да се гълтат цели.

Ако сте приели повече от необходимата доза СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване

Предозиране със СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване може да предизвика следните симптоми: сънливост, гадене, повръщане, диария, замаяност и ниско кръвно налягане. Ако сте приели повече от необходимата доза от това лекарство, консултирайте се незабавно с Вашия лекар.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните нежелани ефекти могат да се появят в редки случаи (могат да засегнат до 1 на всеки 1000 човека)

Сънливост, сърбящи кожни обриви, гадене, диария.

Тези нежелани реакции трябва да изчезнат веднага след намаляване на дозата или спиране на лечението.

Съобщаване на нежелани реакции



Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване в България:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
Ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417
Уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте в оригиналната опаковка - блистер.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване

Активно вещество: бутамиратов цитрат.

Другите съставки (помощни вещества) са: силициев диоксид, колоиден безводен, повидон, рициново масло, хидрогенирано, магнезиев стеарат, хипромелоза, съполимер на метакрилова киселина-етилакрилат, лактоза монохидат, винена киселина, еритрозин алуминиев лак, титанов диоксид, червен железен оксид, полисорбат 80, талк, полиакрилатна дисперсия.

Как изглежда СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване и какво съдържа опаковката

СИНЕКОД се предлага под формата на перорални капки, разтвор, сироп и таблетки с удължено освобождаване.

СИНЕКОД 50 mg таблетки с удължено освобождаване са керемиденочервени, лакирани, кръгли, биконвексни филмирани таблетки с надпис РТ от едната страна и знака на Zyma от другата страна. Разпространява се на блистери.

Опаковка: 10 таблетки на блистер.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

Haleon Hungary Kft., Csörsz utca 43, 1124 Budapest, Унгария

Производител:

Haleon Germany GmbH, Barthstrasse 4, 80339, München, Германия



Дата на последното преразглеждане на листовката

март 2024

