

Листовка: информация за пациента

НИЗОРАЛ 2% крем NIZORAL 2% cream Кетоконазол (*ketoconazole*)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

В тази листовка:

1. Какво представлява НИЗОРАЛ крем и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате НИЗОРАЛ крем
3. Как да използвате НИЗОРАЛ крем
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате НИЗОРАЛ крем
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка - Приложение 2	Листовка № ...
Номер	Към Роз. № Р0010017
Разрешение №	Разрешение № 66502
БГ/МА/МР -	БГ/МА/МР - 10 - 09 - 2024
Издава	Издава
Одобрение №	Одобрение № ✓

1. Какво представлява НИЗОРАЛ крем и за какво се използва

НИЗОРАЛ крем е лекарство за лечение на инфекции на кожата, причинени от гъбички или дрожди.

Използва се за лечение на кожни гъбични инфекции на торса, slabините, стъпалата, между пръстите на краката или ръцете, включително при жени за външно приложение при гъбични инфекции на срамните устни и граничещите с тях области (кандидозен вулвит).

НИЗОРАЛ крем се използва също за лечение на кожни инфекции, които обикновено се появяват по лицето и гърдите като червеникаво-кафяви петна с жълта или бяла коричка (себореен дерматит).

НИЗОРАЛ крем се използва също за лечение на разноцветен лишай по кожата.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате НИЗОРАЛ крем

Не използвайте НИЗОРАЛ крем

- ако сте алергични към кетоконазол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Симптомите на свръхчувствителност включват сърбеж и зачервена кожа, които могат да възникнат след приложение на НИЗОРАЛ крем.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате НИЗОРАЛ крем.

Не прилагайте НИЗОРАЛ крем върху очите.

Измийте внимателно ръцете си след прилагане на НИЗОРАЛ крем.

НИЗОРАЛ крем се употребява при възрастни пациенти.

Други лекарства и НИЗОРАЛ крем

Кортикостероиди (кортизонови лекарства) в крем, меклем или лосион.

Ако Вие употребявате кортекстероиди (кортизонови лекарства в крем, меклем или лосион), посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете лечение.



НИЗОРАЛ крем. Вие може да започнете лечение с **НИЗОРАЛ** крем незабавно, но не бива да спирате употребата на кортикостероидите.

Продължете Вашето лечение както следва:

- употребявайте кортикостероиди сутрин, а **НИЗОРАЛ** крем - вечер, за 1 седмица;
- след това, прилагайте кортикостероиди сутрин всеки 2-ри или 3-ти ден и **НИЗОРАЛ** крем всяка вечер, за следващите 1 до 2 седмици;
- след това, спрете употребата на кортикостероиди и, ако е необходимо, продължете само с **НИЗОРАЛ** крем.

Ако имате никакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, насърко сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

НИЗОРАЛ крем с храна, напитки и алкохол

Неприложимо.

Бременност, кърмене и фертилитет

Не са известни рискове при употребата на **НИЗОРАЛ** крем по време на бременност или кърмене.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Неприложимо.

НИЗОРАЛ крем съдържа стеарилов алкохол и цетилов алкохол, които могат да причинят локални кожни реакции (напр. контактен дерматит).

Това лекарство съдържа пропиленгликол, който може да причини дразнене на кожата. Не го използвайте при отворени рани или големи участъци увредена или наранена кожа (като изгаряния) без да сте говорили с Вашия лекар или фармацевт.

3. Как да използвате **НИЗОРАЛ крем**

НИЗОРАЛ крем трябва да се използва веднъж или два пъти дневно, според указанията на Вашия лекар.

В зависимост от вида на инфекцията, лечението може да продължи от 2 до 6 седмици.


Облекчаване на симптомите обикновено се наблюдава след 4 седмици. В случай, че това не стане, обърнете се към Вашия лекар.

Не спирайте употребата на крем за няколко дни след пълното изчезване на симптомите.

- За да отворите тубата, отвъртете капачката и след това прободете запечатената туба с шипчето на върха на капачката.
- Измийте инфицираната кожа и я подсушете добре.
- Втрийте **НИЗОРАЛ** крем внимателно върху инфицираната зона и около нея с върха на пръстите.
- Измийте ръцете си внимателно след като сте използвали **НИЗОРАЛ** крем, освен ако лечението е за ръцете.

При кожни инфекции на торса, слабините, стъпалата и на ръцете, прилагайте **НИЗОРАЛ** крем веднъж дневно.

При кожни инфекции, които обикновено се появяват по лицето и гърдите като червенице, кафяви петна с жълта или бяла коричка (себореен дерматит), прилагайте **НИЗОРАЛ** крем веднъж или два пъти дневно. Обикновено след 2 до 4 седмици настъпва подобряние на кожната инфекция, след което Вие може да продължите да нанасяте крема веднъж или два пъти седично.



Използвайте отделни кърпи за баня и ръце, за да се избегне заразяване на други хора.
Редовно сменяйте дрехите, влизащи в контакт с поразените кожни участъци, за да се избегне повторно самозаразяване.

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте използвали повече от необходимата доза НИЗОРАЛ крем

Ако сте използвали НИЗОРАЛ крем в по-голямо количество или по-често от препоръченото от Вашия лекар, е възможна појава на чувство за парене, зачервяване или оток. Ако това се случи, спрете прилагането на НИЗОРАЛ крем.

НИЗОРАЛ крем не трябва да се поглъща. Ако случайно погълнете НИЗОРАЛ крем, свържете се с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да използвате НИЗОРАЛ крем

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза НИЗОРАЛ крем.

Ако сте спрели употребата на НИЗОРАЛ крем

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Уведомете Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани реакции, докато използвате НИЗОРАЛ крем.

- Усещане за парене, сърбеж или зачервяване на кожата.
- Реакции на свръхчувствителност (алергични реакции), обрив, екзема, уртикария, възпаление или други локални кожни реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате НИЗОРАЛ крем

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелзан върху картонената опаковка.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 6 месеца.

Не използвайте НИЗОРАЛ крем, ако забележите видими белези на нарушаване на целостта на продукта.



Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа НИЗОРАЛ крем

Активното вещество е: кетоконазол

Другите съставки са:

пропиленгликол (Е 1520)

стеарилов алкохол

цетилов алкохол

сорбитанов стеарат

полисорбат

изопропилмиристат

натриев сулфит, безводен

пречистена вода

Как изглежда НИЗОРАЛ крем и какво съдържа опаковката

НИЗОРАЛ крем се предлага в туби по 15 грама и всеки грам от него съдържа 20 mg кетоконазол.

Притежател на разрешението за употреба

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Германия

Производители

Janssen Pharmaceutica N.V.,

Turnhoutseweg 30,

2340 Beerse,

Белгия

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

България

Стада България ЕООД

ул. Атанас Дуков № 29, етаж 4

гр. София 1407

Тел.: 02 962 46 26

e-mail: info@stada.bg

Дата на последно преразглеждане на листовката

04/2024

