

ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Нетилмицин НюЛайн Фарма 3 mg/ml капки за очи, разтвор
Netilmicin NewLine Pharma 3 mg/ml eye drops, solution
Нетилмицин (Netilmicin)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора.
- То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Нетилмицин НюЛайн Фарма и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Нетилмицин НюЛайн Фарма
3. Как да използвате Нетилмицин НюЛайн Фарма
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нетилмицин НюЛайн Фарма
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ДОПОЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20210238
Разрешение №	60103
Одобрение №	01-09-2022

1. Какво представлява Нетилмицин НюЛайн Фарма и за какво се използва

Нетилмицин НюЛайн Фарма съдържа активното вещество нетилмицин, антибиотик, който убива бактериите.

Той е показан при възрастни, за локално лечение на външни инфекции на окото и неговата заобикаляща област, причинени от чувствителни към нетилмицин бактерии.

Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Нетилмицин НюЛайн Фарма

Не използвайте Нетилмицин НюЛайн Фарма:

- ако сте алергични към нетилмицин, някой аминогликозиден антибиотик (гентамицин, тобрамицин, канамицин и пр.) или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Нетилмицин НюЛайн Фарма.

Ако използвате антибиотици за продължителен период от време, Вие може да станете по-податливи на очни инфекции.

Аминогликозидните антибиотици може да причинят сериозни проблеми със слуха и зрението, ако използвате друго лечение с антибиотици, включително приемани през устата. Нетилмицин НюЛайн Фарма, попитайте Вашия лекар за съвет.



Нетилмицин НюЛайн Фарма не е предназначен за инжектиране, затова не трябва да се инжектира в окото или да се въвежда в предната очна камера.

Във всички случаи по-горе или ако получите алергични реакции с това лекарство, прекъснете употребата и се консултирайте с Вашия лекар.

Деца и юноши

Безопасността и ефикасността на Нетилмицин НюЛайн Фарма при деца или юноши не са установени.

Други лекарства и Нетилмицин НюЛайн Фарма

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Нетилмицин НюЛайн Фарма може да се използва с други лекарства за офталмологична употреба, но е важно да се следват указанията в точка 3.

Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате:

- някакъв друг антибиотик, по-конкретно полимиксин В, колистин, виомицин, стрептомицин, ванкомицин или цефалоридин. Едновременната употреба на Нетилмицин НюЛайн Фарма с други аминогликозидни антибиотици може да повиши риска от проблеми с бъбреците, проблеми със слуха или да попречи на действието на останалите антибиотици;
- цисплатин (използван за противоракова терапия);
- диуретици (лекарства, които намаляват задържането на вода) като етакринична киселина и фуросемид.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Бременност

Това лекарство трябва да се използва само ако се смята за подходящо от Вашия лекар.

Кърмене

Нетилмицин НюЛайн Фарма не се препоръчва за употреба при кърмене, тъй като това лекарство се екскретира в кърмата в малки количества.

Шофиране и работа с машини

След употреба на Нетилмицин НюЛайн Фарма може да получите временно помътняване на зрението. Не шофирайте и не работете с машини, докато зрението Ви не се проясни.

Нетилмицин НюЛайн Фарма 3 mg/ml капки за очи, разтвор съдържа бензалкониев хлорид

Това лекарство съдържа 0,05 mg бензалкониев хлорид във всеки ml.

Бензалкониевият хлорид може да се абсорбира от меките контактни лещи и може да промени цвета на лещите. Трябва да свалите контактните лещи преди употребата на това лекарство и да изчакате поне 15 минути преди да ги поставите отново.

Бензалкониевият хлорид може също да причини дразнене на очите, особено ако имате „сухо око“ или нарушения на роговицата (прозрачния слой в предната част на окото). Ако имате необичайно усещане в окото, като парене или болка в окото след употребата на това лекарство, говорете с Вашия лекар.



3. Как да използвате Нетилмицин НюЛайн Фарма

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


Препоръчителната доза е 1 или 2 капки в засегнатото око 3 пъти дневно или както е указано от Вашия лекар.

Ако носите контактни лещи

При лечение на повърхностна очна инфекция се препоръчва да не се носят контактни лещи. Ако носите контактни лещи, трябва да ги свалите, преди да използвате капките за очи Нетилмицин НюЛайн Фарма. След използване на това лекарство трябва да изчакате 15 минути, преди отново да поставите контактните лещи.

Указания за употреба

- 1) Измийте/почистете добре ръцете си.
- 2) Натиснете надолу със завъртане капачката, за да пробие върха на бутилката.




- 3) Отвийте капачката, обърнете бутилката обратно и я стиснете леко, за да поставите една капка в засегнатото(ите) око(очи). Не докосвайте окото, клепачите или друга повърхност с върха на бутилката, за да се избегне замърсяване.



- 4) Поставете обратно и затегнете капачката върху капкомера на бутилката.



Дръжте засегнатото око затворено, притиснете с пръст вътрешния ъгъл на затвореното око и задръжте за 1 минута. Това е важно, тъй като намалява количеството лекарство, което преминава в останалата част от тялото Ви.



Ако сте използвали повече от необходимата доза Нетилмицин НюЛайн Фарма

Никога не са съобщавани случаи на предозиране при употребата на Нетилмицин НюЛайн Фарма.

Ако неволно накапете повече от необходимия брой капки, няма вероятност да получите проблеми. Приложете следващата доза по обичайния начин.

Ако сте пропуснали да използвате Нетилмицин НюЛайн Фарма

Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Нетилмицин НюЛайн Фарма

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.



Ако използвате Нетилмицин НюЛайн Фарма с други очни лекарства
Ако използвате друго очно лекарство, трябва да изчакате 5 минути помежду им.
Мазите за очи трябва да се поставят последни.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Повечето хора, лекувани с тези капки за очи, не получават нежелани реакции.

Следните нежелани реакции са възникнали с Нетилмицин НюЛайн Фарма:

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

- дразнене на очите;
- зачервяване на окото;
- обрив на клепача;
- оток на клепача;
- сърбеж на очите;
- алергична реакция;
- уртикария.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Нетилмицин НюЛайн Фарма

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка след „Годен до“ и „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец на неотворения и правилно съхраняван продукт.

Нетилмицин НюЛайн Фарма трябва да се използва в рамките на 28 дни след първото отваряне.

Да не се съхранява над 25°C.

Съхранявайте бутилката във външната кутия, за да се предпази от светлина.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Нетилмицин НюЛайн Фарма

- Активно вещество: нетилмицин. Всеки ml от разтвора съдържа 3 mg нетилмицин (като нетилмицин сулфат).
- Други съставки: натриев хлорид, бензалкониев хлорид, натриев хидроксид (за корекция на pH), пречистена вода.

Как изглежда Нетилмицин НюЛайн Фарма и какво съдържа опаковката

Нетилмицин НюЛайн Фарма представлява бистър и безцветен или бледожълт разтвор в бутилка от 5 ml, поставена в картонена кутия.



Притежател на разрешението за употреба и производител

SIFI S.p.A.
Via Ercole Patti 36
95025 Aci Sant'Antonio (CT)
Италия

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (<https://www.bda.bg>)

