

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**Волтарен 25 mg стомашно-устойчиви таблетки**  
**Voltaren 25 mg gastro-resistant tablets**

**Волтарен 50 mg стомашно-устойчиви таблетки**  
**Voltaren 50 mg gastro-resistant tablets**  
диклофенак натрий (diclofenac sodium)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

### Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Волтарен и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Волтарен
3. Как да приемате Волтарен
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Волтарен
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА</b> |                     |
| Листовка - Приложение 2                    |                     |
| Към Рег. №                                 | 20020736137         |
| Разрешение №                               |                     |
| BG/MA/MP -                                 | 67113-7, 15-11-2024 |
| Одобрение №                                |                     |

### 1. Какво представлява Волтарен и за какво се използва

Вашето лекарство се нарича Волтарен и се предлага под формата на стомашно-устойчиви таблетки. Всяка стомашно-устойчива таблетка съдържа 25 mg или 50 mg от лекарственото вещество диклофенак натрий. Волтарен принадлежи към група лекарства, наречени нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), които се прилагат за лечение на болка и възпаление.

### За какво се използва Волтарен

Волтарен е подходящ за лечение на следните състояния:

- Ревматични или дегенеративни ставни болки (артрит).
- Болки в гърба, синдром на „замръзнало рамо“, „тенис-лакът“ и други форми на ревматизъм.
- Пристъпи на подагра.
- Навяхвания, изкълчвания или други травми.
- Болка и отоци след операция.
- Болезнени гинекологични възпалителни състояния, включително болезнени менструални болки.
- Инфекции на ухото, носа или гърлото.

### Как действа Волтарен

Волтарен облекчава симптомите на възпаление, като болка и оток, като блокира синтеза на молекули (простагландини), които причиняват възпаление, болка и повишаване на температурата. Той не действа върху причините за възпалението или повишената температура.



Ако имате въпроси относно действието на Волтарен или защо Ви е предписано това лекарство, обърнете се към Вашия лекар.

## **2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Волтарен**

Следвайте внимателно всички указания на Вашия лекар, дори ако се различават от общата информация в тази листовка.

### **Не използвайте Волтарен**

- **ако сте алергични (свръхчувствителни) към диклофенак или към някоя от останалите съставки на Волтарен, изброени в края на тази листовка**
- **ако някога сте имали алергични реакции при приемане на лекарства срещу възпаление или болка (като ацетилсалицилова киселина, диклофенак или ибупрофен). Реакциите могат да включват астма, болка в гърдите, течащ нос, обрив по кожата, подуване на лицето, устните, езика, гърлото и/или на крайниците (признаци на ангиоедем). Ако смятате, че може да сте алергичен, обърнете се към Вашия лекар**
- **ако имате язва на стомаха или дванадесетопръстника**
- **ако имате стомашно-чревно кървене или перфорация, симптоми на които могат да бъдат кръв в изпражненията или черни изпражнения**
- **ако страдате от бъбречно или чернодробно увреждане**
- **ако страдате от тежко сърдечно заболяване**
- **ако сте в последните три месеца от бременността**
- **ако имате установено сърдечно заболяване и/или мозъчно-съдово заболяване, например ако сте имали сърдечен инфаркт, инсулт, микроинсулт (ПИП) или запушвания на кръвоносните съдове на сърцето или мозъка, или операция за отпушване на кръвоносните съдове или байпас**
- **ако имате или сте имали проблеми с кръвообращението (периферно артериално заболяване)**

Уверете се, че Вашият лекар е информиран, преди да приемете Волтарен

- **ако пушите**
- **ако имате диабет**
- **ако имате стенокардия, кръвни съсиреци, високо кръвно налягане, повишен холестерол или повишени триглицериди**

Нежеланите реакции могат да бъдат сведени до минимум чрез използване на най-ниската ефективна доза за най-краткия необходим период от време.

Информирайте Вашия лекар, ако наскоро сте били подложени на или Ви предстои операция на стомаха или червата, преди да използвате Волтарен, тъй като Волтарен понякога може да влоши зарастването на раната в червата след хирургична операция.

Ако имате някое от изброените състояния, **уведомете Вашия лекар преди да приемете Волтарен.**

### **Предупреждения и предпазни мерки**

- **ако имате установено заболяване на сърцето или кръвоносните съдове (още известно като сърдечно-съдово заболяване, включително неконтролирано високо кръвно налягане, застойна сърдечна недостатъчност, установена исхемична болест на сърцето или заболяване на периферните артерии), обикновено лечението с Волтарен не се препоръчва**
- **ако имате установено сърдечно-съдово заболяване (виж по-горе) или значими рискови фактори, като високо кръвно налягане, необичайно високи нива на мазнини в кръвта (холестерол, триглицериди), диабет или ако пушите и лекарят реши да Ви предпише Волтарен**



не трябва да повишавате дозата над 100 mg на ден, ако лечението Ви продължи повече от 4 седмици

- Важно е да приемате най-ниската доза от Волтарен, която облекчава болката Ви и/или отока, за най-краткия възможен период от време, с цел да запазите риска от сърдечно-съдови нежелани ефекти колкото е възможно по-малък
- **ако приемате Волтарен** едновременно с други противовъзпалителни лекарства включително ацетилсалицилова киселина, кортикостероиди, антикоагуланти или селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин „SSRIs” (вж. „Прием на други лекарства”)
- **ако страдате** от астма или сenna хрема (сезонен алергичен ринит)
- **ако имате** или сте имали някога гастроинтестинални проблеми, като стомашна язва, кървене или черни изпражнения, или стомашен дискомфорт или киселини след прием на нестероидни противовъзпалителни средства
- **ако имате** възпаление на дебелото черво (улцерозен колит) или на тънките черва (болест на Крон)
- **ако имате** бъбречно или чернодробно заболяване
- **ако сте** обезводнени (от болест, диария, преди или след операция)
- **ако имате** подути крака
- **ако имате** повишена склонност към кървене или друго заболяване на кръвта, включително рядко чернодробно заболяване, наречено порфирия

Ако имате някое от изброените по-горе състояния, **уведомете Вашия лекар преди да започнете да приемате Волтарен стомашно-устойчиви таблетки.**

- Ако, по всяко време на приема на Волтарен се появят някои признаци или симптоми на проблеми със сърцето или кръвоносните Ви съдове, като гръдна болка, задух, слабост или неясен говор, свържете се с Вашия лекар незабавно.
- Волтарен може да потисне симптомите на инфекция (главоболие, висока температура) и това може да я направи трудно откриваема и да затрудни лечението ѝ. Ако не се чувствате добре и имате нужда да се консултирате с лекар, не забравяйте да му кажете че приемате Волтарен.
- В много редки случаи пациенти приемащи Волтарен, както и при други противовъзпалителни лекарства, може да получат сериозни кожни алергични реакции (напр. обрив).

Ако имате някои от изброените симптоми по-горе, **незабавно уведомете Вашия лекар.**

#### **Проследяване по време на лечение с Волтарен**

Ако имате установено сърдечно заболяване или значителни рискове за сърдечно заболяване, Вашият лекар периодично ще оценява дали трябва да продължите лечението с Волтарен, особено в случай, че лечението Ви продължи повече от 4 седмици.

Ако имате чернодробно, бъбречно увреждане или заболяване на кръвта, по време на лечението ще Ви се правят кръвни изследвания. Така ще се проследява чернодробната Ви функция (нивото на трансаминазите), бъбречната Ви функция (нивото на креатинина) или броя на кръвните Ви клетки (бели и червени кръвни клетки и тромбоцити). Въз основа на тези кръвни изследвания, Вашият лекар ще прецени дали да прекрати лечението с Волтарен или да промени дозата.

#### **Деца и юноши**

Поради дозовата си единица Волтарен стомашно-устойчиви таблетки 50 mg не трябва да се предписва на деца и подрастващи под 14 години. Волтарен стомашно-устойчиви таблетки 25 mg могат да се използват при пациенти под 14 години. Волтарен стомашно-устойчиви таблетки не трябва да се прилагат при деца под 12 месеца.

#### **Хора в старческа възраст**

Пациентите в старческа възраст, особено при немощни или с ниско телесно тегло, могат да бъдат по-чувствителни към ефектите на Волтарен, отколкото другите възрастни пациенти. Затова те трябва особено внимателно да следват инструкциите на лекаря, и да приемат минималния брой стомашно-



устойчиви таблетки, облекчаващи симптомите. Много е важно по-възрастните пациенти незабавно да съобщават на лекаря си нежеланите реакции.

#### **Прием на други лекарства (взаимодействия с други лекарствени продукти, включително ваксини или биологични продукти)**

Уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Особено важно е да съобщите на Вашия лекар, ако сте взимали някои от следните лекарства:

- Литий или селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин (SSRIs) – лекарства, използвани за лечение на някои видове депресия
- Дигоксин (лекарство, използвано за сърдечни проблеми)
- Диуретици (лекарства за увеличаване количеството на отделената урина)
- ACE инхибитори или бета-блокери (класове лекарства използвани за лечението на високо кръвно налягане и сърдечна недостатъчност)
- Други противовъзпалителни лекарства като ацетилсалицилова киселина или ибупрофен
- Кортикостероиди (лекарства, употребявани за облекчение на възпалени части от тялото)
- Антикоагуланти (лекарства за предотвратяване съсирването на кръвта)
- Лекарства за лечение на диабет (като метформин), с изключение на инсулин
- Метотрексат (лекарство, използвано при лечение на някои видове рак или артрит)
- Циклоспорин, такролимус (лекарства, използвани главно при пациенти претърпели трансплантация)
- Триметоприм (лекарство, използвано за предпазване от или лечение на инфекции на пикочните пътища)
- Хинолонови антибактериални средства (лекарства за лечение на инфекции)
- Вориконазол (лекарство, използвано за лечение на гъбични инфекции)
- Фенитоин (лекарство, използвано за лечение на припадъци)
- Рифампицин (антибиотик, използван за лечение на бактериални инфекции).

#### **Прием на Волтарен с храни и напитки**

- Волтарен стомашно-устойчиви таблетки трябва да се поглъщат цели с чаша вода или друга течност.
- Препоръчително е Волтарен стомашно-устойчиви таблетки да се приемат преди хранене или на празен стомах.

#### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или мислите, че може да сте бременна, уведомете **Вашия лекар**.

Не трябва да приемате Волтарен стомашно-устойчиви таблетки през първите 6 месеца от бременността, освен ако не е абсолютно необходимо и по препоръка на Вашия лекар.

Както и при останалите противовъзпалителни лекарства, не трябва да приемате Волтарен стомашно-устойчиви таблетки през последните 3 месеца на бременността, тъй като може да увреди нероденото дете или да предизвика проблеми при раждането. Може да причини бъбречни и сърдечни проблеми при още нероденото Ви бебе. Може да повлияе на Вашата склонност и тази на Вашето бебе към кървене и може да бъде причина, раждането да започне по-късно или да бъде по-продължително от очакваното.

Ако се приема повече от няколко дни от 20-ата седмица на бременността нататък, Волтарен стомашно-устойчиви таблетки може да причини бъбречни проблеми при още нероденото Ви бебе, което може да доведе до намалено количество на околоплодната течност, която заобикаля бебето (олигохидрамнион) или стесняване на кръвоносен съд (дуктус артериозус) в сърцето на бебето.



се нуждаете от лечение по-дълго от няколко дни, Вашият лекар може да препоръча допълнително проследяване.

Трябва да уведомите своя лекар, ако кърмите.

Не трябва да кърмите докато приемате Волтарен, тъй като това може да навреди на Вашето дете.

Вашият лекар ще обсъди с Вас потенциалния риск от приемането на Волтарен при бременност или кърмене.

#### **Жени с детероден потенциал**

Волтарен може да затрудни забременяването. Не трябва да приемате Волтарен стомашно-устойчиви таблетки, ако планирате да забременеете или имате трудности със зачеването.

#### **Важна информация за някои от помощните вещества на Волтарен стомашно-устойчиви таблетки**

Волтарен стомашно-устойчиви таблетки 25 и 50 mg съдържат лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, обърнете се към него преди да започнете да приемате това лекарство.

### **3. Как да приемате Волтарен**

Следвайте внимателно указанията на Вашия лекар. Не превишавайте препоръчаната дозировка.

#### **Колко Волтарен да приемате**

Не превишавайте препоръчаната дозировка, предписана от лекаря Ви. Много важно е да приемате най-ниската доза Волтарен стомашно-устойчиви таблетки, облекчаваща болката Ви, и да не продължавате приема повече от необходимото.

Вашият лекар ще Ви каже колко точно стомашно-устойчиви таблетки Волтарен да приемете. В зависимост от това как Ви се отразява лечението, Вашият лекар може да предложи по-висока или по-ниска доза.

#### **Деца и юноши**

При деца над 1 годишна възраст и подрастващи трябва да се прилагат 0,5 до 2 mg/kg телесно тегло дневно, разпределени в 2 до 3 отделни приема, в зависимост от тежестта на състоянието.

Да не се превишава максималната дневна доза от 150 mg.

Например при дете тежащо 20 kg трябва да се прилага дневна доза от 10 до 40 mg. За лечение на ювенилен ревматоиден артрит дозировката може да се повиши до максимум 3 mg/kg, разпределени в няколко приема.

#### **Възрастни**

В повечето случаи лечението започва с дозировка от 100 до 150 mg дневно. При по-леки случаи, както и за продължително лечение обикновено са достатъчни 75 до 100 mg дневно. Общата дневна дозировка трябва да се приема на 2 до 3 отделни приема. Не приемайте повече от максималната дневна дозировка от 150 mg. При болезнени менструални цикли започнете лечение с еднократна доза от 50 до 100 mg веднага, щом почувствате първите симптоми. Продължете с дозировка до три пъти дневно по 50 mg, колкото е необходимо. Ако максималната дневна дозировка от 150 mg е неефективна при 2 до 3 менструални цикъла, Вашият лекар може да ви препоръча да приемате до 200 mg дневно при следващите менструални цикли. Не приемайте повече от 200 mg дневно.



### **Кога да приемате Волтарен**

За предпочитане преди хранене или на празен стомах.

### **Как да приемате Волтарен**

Волтарен стомашно-устойчиви таблетки трябва да се поглъщат цели, с чаша вода или друга течност. Препоръчително е стомашно-устойчивите таблетки да се приемат преди хранене или на празен стомах. Не трябва да ги разчупвате или сдъвквате.

### **Колко дълго да приемате Волтарен**

Следвайте точно инструкциите на Вашия лекар.

Ако приемате Волтарен повече от няколко седмици, трябва да отидете на редовен преглед при Вашия лекар, за да сте сигурни, че не проявявате незабележими нежелани реакции.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **Ако сте приели повече от необходимата доза Волтарен**

Ако случайно сте приели по-голямо количество стомашно-устойчиви таблетки Волтарен, отколкото Ви е предписано, уведомете Вашия лекар или фармацевт или незабавно потърсете медицинска помощ.

Може да се нуждаете от медицинска помощ.

### **Ако сте пропуснали да приемете Волтарен**

Ако пропуснете приема на една доза, вземете я веднага, щом си спомните. В случай, че е настъпило време за следващата доза, пропуснете забравената и пак продължете по предписаната Ви схема. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

## **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, Волтарен може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

### **Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни**

**С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)**

Спрете да използвате Волтарен и уведомете веднага Вашия лекар, ако забележите:

- Леки спазми и болезненост в корема, започващи скоро след началото на лечението с Волтарен и последвани от ректално кървене или кървава диария, обикновено в рамките на 24 часа от появата на коремната болка.
- Болка в гърдите, която може да е признак на потенциално сериозна алергична реакция, наречена синдром на Кунис.

**Нечести (могат да засегнат до 1 на всеки 100 души, особено когато приемат висока дневна доза (150 mg) за дълъг период от време)**

- Внезапна и притискаща болка в гръдния кош (симптоми на инфаркт на миокарда или сърдечен удар)
- Задух, затруднено дишане в легнало положение, подуване на стъпалата или краката (симптоми на сърдечна недостатъчност)

**Редки или много редки (могат да засегнат до 1 на всеки 1 000 души или до 1 на всеки 10 000 души)**

- спонтанно кървене или кръвонасядане (симптоми на тромбоцитопения)
- висока температура, чести инфекции, постоянно възпалено гърло (симптоми на агранулоцитоза)
- затруднено дишане или преглъщане, обрив, сърбеж, копривна треска, замаяност, главоболие, свръхчувствителност, анафилактични или анафилактоидни реакции)



- подуване основно на лицето и гърлото (симптоми на ангиоедем)
- тревожни мисли или настроения (симптоми на психични нарушения)
- нарушения на паметта
- гърчове
- безпокойство
- скованост на врата, повишена температура, гадене, повръщане, главоболие (симптоми на асептичен менингит)
- внезапно и тежко главоболие, гадене, замаяност, вкочаненост, трудност или невъзможност за говорене, слабост или парализа на крайниците или лицето (симптоми на мозъчно съдови инциденти или сърдечен удар)
- намалено чуване (симптом на увреден слух)
- главоболие, замаяност (симптоми на високо кръвно налягане, хипертония)
- обрив, лилаво-червени петна, повишена температура, сърбеж (симптоми на васкулит)
- внезапно затруднено дишане и чувство на тежест в гърдите с хрипове или кашляне (симптоми на астма или пневмония, ако има висока температура)
- повръщане на кръв (симптоми на хематемеза) и/или потъмняване или кървави изпражнения (симптоми на стомашно-чревен кръвоизлив)
- кървава диария (симптоми на хеморагична диария)
- черни фекалии (симптоми на мелена)
- стомашна болка, гадене (симптоми на стомашно-чревна язва, кървене или перфорация)
- диария, коремна болка, температура, гадене, повръщане (симптоми на колит, включително хеморагичен колит, исхемичен колит и обостряне на улцерозен колит или болест на Крон)
- внезапна силна болка в горната част на стомаха (симптом на панкреатит)
- пожълтяване на кожата или очите (симптоми на жълтеница), гадене, липса на апетит, потъмняване на урината (симптоми на хепатит/чернодробна недостатъчност)
- грипоподобни симптоми, чувство на умора, болки в мускулите, повишено ниво на чернодробните ензими в кръвни изследвания (симптоми на чернодробно увреждане, включително флуминантен хепатит, некроза на черния дроб, чернодробна недостатъчност)
- мехури (симптом на булозен дерматит)
- червена или пурпурна кожа (възможен признак на възпаление на кръвоносните съдове), кожен обрив с мехури по устните, очите и устата, кожно възпаление с лющене и белене на кожата (симптоми на еритема мултиформе или при температура – синдром на Стивънс-Джонс или токсична епидермална некролиза)
- кожен обрив с лющене и белене (симптоми на ексфолиативен дерматит)
- повишена чувствителност на кожата към слънцето (симптом на фоточувствителност)
- морави петна по кожата (симптоми на пурпура или пурпура на Шонлайн-Хенох, ако е причинена от алергия)
- подуване, чувство на слабост, нарушено уриниране (симптоми на остра бъбречна недостатъчност)
- повишен белтък в урината (симптом на протеинурия)
- подуване на лицето или коремната област, високо кръвно налягане (симптоми на нефротичен синдром)
- увеличаване или намаляване на количеството отделена урина, сънливост, обърканост, гадене (симптоми на тубулоинтерстициален нефрит)
- силно намалено отделяне на урина (симптом на бъбречна папиларна некроза)
- цялостно подуване (симптом на едема)
- внезапна болка в гърдите и алергични реакции (признаци на синдром на Кунис)

Ако имате някое от изброените състояния, уведомете Вашия лекар незабавно.



**Други нежелани реакции, които може да възникнат**

**Чести** (могат да засегнат до 1 на всеки 10 души)

Главоболие, замаяност, виене на свят, гадене, повръщане, диария, лошо храносмилане (симптоми на диспепсия), коремна болка, газове, загуба на апетит (симптоми на намален апетит), отклонения в резултатите от чернодробни изследвания (напр. повишени стойности на трансаминазите), кожен обрив.

**Нечести** (могат да засегнат до 1 на всеки 100 души)

Сърцебиене, гръдна болка.

**Редки** (могат да засегнат до 1 на всеки 1 000 души)

Сънливост, стомашна болка (симптом на гастрит), чернодробно увреждане, обрив със сърбеж (симптоми на уртикария).

**Много редки** (могат да засегнат до 1 на всеки 10 000 души)

Намален брой на червените кръвни клетки (анемия), намален брой на белите кръвни клетки (левкопения), дезориентация, депресия, трудност при заспиване (симптоми на безсъние), нощни кошмари, раздразнителност, изтръпване на крайниците (симптоми на парестезия), треперене (симптом на тремор), вкусови нарушения (симптом на дисгеузия), зрителни нарушения\* (симптоми на нарушено зрение, замъглено виждане, двойно виждане), шум в ушите (симптом на тинитус), запек, възпаление на устата (симптоми на стоматит), подуване, зачервяване и възпаляване на езика (симптоми на глосит), нарушения на хранопровода (симптоми на нарушен хранопровод), крампи в горната част на корема, най-вече след хранене (симптоми на диафрагма-подобни стеснения на червата), червен, парещ и сърбящ обрив (симптоми на екзема), зачервяване на кожата (симптом на еритема), косопад (симптом на алоpecia), сърбеж (симптом на пруритус), кръв в урината (симптом на хематурия).

**\*Зрителни нарушения:** Ако по време на лечението с Волтарен се появят симптоми на зрителни нарушения, свържете се с Вашия лекар, тъй като може да се наложи преглед на очите, за да се изключат други причини.

**Уведомете Вашия лекар, ако се прояви някоя от тези нежелани реакции.**

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Ако приемате Волтарен в продължение на повече от няколко седмици, трябва да се подлагате на редовни медицински прегледи, за да сте сигурни, че подобни нежелани ефекти няма да останат незабелязани.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



## 5. Как да съхранявате Волтарен

Да се съхранява при температура под 30°C.

Да не се употребява след изтичане на срока на годност, указан на опаковката.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа Волтарен

- Активното вещество във Волтарен е диклофенак натрий (*diclofenac sodium*).
- Другите съставки са безводен колоиден силициев диоксид, лактоза монохидрат, царевично нишесте, натриев нишестен гликолат (тип А), повидон, микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, хипромелоза, жълт железен оксид (Е 172), макроголицерол хидроксистеарат, полиоксиетилен 40, хидрогенирано рициново масло, пречистен талк, титаниев диоксид (Е171), метакрилова киселина кополимер, полиетиленгликол макрогол 8000, симетикон. Само при **Волтарен стомашно-устойчиви таблетки 50 mg**: червен железен оксид (Е 172).

Ако имате въпроси относно този лекарствен продукт, моля обръщайте се към Вашия лекар или фармацевт.

### Притежател на разрешението за употреба

Novartis Europharm Limited  
Vista Building  
Elm Park, Merrion Road  
Dublin 4  
Ирландия

### Производител

Novartis Pharma GmbH  
Roonstrasse 25  
90429 Nuernberg  
Германия

Novartis Farmacéutica, S.A.  
Gran Via de les Corts Catalanes, 764  
08013 Barcelona  
Испания

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Novartis Bulgaria EOOD  
бул. „Никола Вапцаров“ № 55  
ЕКСПО 2000, сграда 4, ет. 4  
София 1407  
тел: 02/489 98 28; факс: 02/489 98 29

**Дата на последно преразглеждане на листовката:**

