

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка Приложение 2
КБМ Рес. № 20130072
Разрешение № 67007/06-11-2024
Стойност №

Листовка: информация за пациента

Запринел плюс 5 mg/1,25 mg филмирани таблетки
Zaprinel plus 5 mg/1,25 mg film-coated tablets

периндоприлов тозилат/индапамид (perindopril tosilate/indapamide)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Запринел плюс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Запринел плюс
3. Как да приемате Запринел плюс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Запринел плюс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Запринел плюс и за какво се използва

Какво представлява Запринел плюс

Запринел плюс е комбинация от две активни съставки, периндоприл и индапамид. Те са антихипертензивни и се използват за лечение на високо кръвно налягане (хипертония) при възрастни.

За какво се използва Запринел плюс

Периндоприл принадлежи към клас лекарства наречени АСЕ инхибитори. Той действа като разширява кръвоносните съдове и така облекчава сърцето в изпомпването на кръвта през тях. Индапамид е диуретик. Диуретиците повишават количеството на отделената от бъбреците урина. Все пак, индапамид се различава от останалите диуретици, тъй като само леко повишава количеството на отделената урина. Всяка от активните съставки понижава кръвното налягане и двете действат едновременно, за да контролират Вашето кръвно налягане.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Запринел плюс

Не приемайте Запринел плюс

- ако сте алергични към периндоприл или други АСЕ инхибитори, или към индапамид или други сулфонамиди, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6),
- ако по време на предшестващо лечение с АСЕ инхибитор сте имали симптоми като хрипове, оток на лицето или езика, силен сърбеж или тежък кожен обрив, или ако Ви е или член на Вашето семейство е имал тези симптоми при някакви други обстоятелства (състояние наречено ангионевротичен оток),
- ако имате тежко чернодробно заболяване или страдате от състояние наречено чернодробна енцефалопатия (дегенеративно заболяване на мозъка),
- ако имате тежко бъбречно заболяване, при което кръвоснабдяването на Вашите бъбреци е намалено (стеноза на бъбречната артерия),



- ако сте на диализно лечение или някакъв друг вид филтрация на кръвта. В зависимост от апарата, който е използван, Запринел плюс може да не е подходящ за вас
- ако имате ниско ниво на калий в кръвта,
- ако се съмнявате или имате декомпенсирана сърдечна недостатъчност (тежко задържане на течности, затруднено дишане),
- ако сте бременна повече от 3 месеца (По-добре е да избягвате употребата на Запринел плюс по време на ранна бременност – вижте “Бременност, кърмене и фертилитет”),
- ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство, за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.
- ако сте приемали или в момента приемате сакубитрил/валсартан, лекарство за сърдечна недостатъчност, тъй като има повишен риск от ангиоедем (бързо образуване на оток под кожата в област като напр. гърлото) (виж „Предупреждения и предпазни мерки“ и „Други лекарства и Запринел плюс“).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Запринел плюс:

- ако приемате някое от следните лекарства, рискът от ангиоедем може да бъде повишен:
 - рацекадотрил – лекарство, използвано за лечение на диария),
 - лекарства, използвани за предотвратяване на отхвърлянето на органен трансплантат и при рак (напр. темсиrolimus, сиролимус, еверолимус) и други лекарства, принадлежащи към класа, на така наречените mTog инхибитори,
 - линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин и други лекарства, принадлежащи на класа на така наречените глиптени (използвани за лечение на диабет);
 - сакубитрил (предлага се с валсартан като комбинация с фиксирана доза) - използван за лечение на хронична сърдечна недостатъчност.
- ако имате аортна стеноза (стесняване на главния кръвоносен съд, който излиза от сърцето) или хипертрофична кардиомиопатия (заболяване на сърдечния мускул) или стеноза на бъбречната артерия (стесняване на артерията, която кръвоснабдява бъбрека),
- ако имате сърдечна недостатъчност или някакви други сърдечни проблеми,
- ако имате проблеми с бъбреците, или сте на диализа,
- ако имате мускулни нарушения, включително болка в мускулите, чувствителност, слабост или крампи,
- ако имате необичайно повишени нива в кръвта на хормон, наречен алдостерон (първичен алдостеронизъм),
- ако имате чернодробни проблеми,
- ако боледувате от колагеноза (кожно заболяване), като системен лупус еритематодес или склеродермия,
- ако имате атеросклероза (уплътняване на артериите),
- ако страдате от хиперпаратиреоидизъм (повишена функция на паращитовидните жлези),
- ако имате подагра,
- ако имате диабет,
- ако сте на диета с ограничен прием на сол или използвате заместители на солта, които съдържат калий,
- ако приемате литий или калий-съхраняващи диуретици (спиронолактон, триамтерен) или хранителни добавки съдържащи калий, тъй като тяхната употреба заедно със Запринел плюс трябва да се избягва (вижте точка “Други лекарства и Запринел плюс”),
- ако сте в старческа възраст,
- ако сте имали реакции на фоточувствителност,
- ако имате тежка алергична реакция с подуване на лицето, устните, устата, езика или гърлото, което може да предизвика затруднено преглъщане или дишане (ангиоедем). Това може да се случи по всяко време на лечението. Ако развиете такива симптоми, трябва да спрете лечението и незабавно да се консултирате с лекар.
- ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:



- ангиотензин II-рецепторен блокер (ARB) (известни също като сартани – например валсартан, телмисартан, ирбесартан), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета.
 - алискирен.
- ако почувствате, че зрението Ви намалява или болка в окото. Това могат да бъдат симптоми на натрупване на течност в съдовия слой на окото (хороидален излив) или увеличаване на налягането във Вашето око и могат да се появят в рамките на часове до седмици от приема на Запринел плюс. Това може да доведе до трайна загуба на зрението, ако не се лекува. Ако по-рано сте имали алергия към пеницилин или сулфонамид, може да сте изложени на по-висок риск от развитие на това усложнение.

Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви.

Вижте също информацията озаглавена “Не приемайте Запринел плюс”

- ако сте с африкански произход, тъй като при Вас може да има повишен риск от ангиоедем и това лекарство може да е по-малко ефективно за намаляване на кръвното Ви налягане, отколкото при пациенти които не са чернокожи,
- ако сте пациент на хемодиализа, на диализа с мембрани с висок поток.

Ангиоедем

Ангиоедем (тежка алергична реакция изразена с подуване на лицето, устните, езика или гърлото, със затруднено преглъщане или дишане) се съобщава при пациенти лекувани с ACE инхибитори, включително Запринел плюс. Това може да се случи във всеки момент по време на лечението. Ако развиете такива симптоми, трябва да спрете приема на Запринел плюс и незабавно да се консултирате с лекар. Вижте също точка 4.

Ако мислите че сте бременна (или може да забременеете), трябва да информирате Вашия лекар. Запринел плюс не се препоръчва за употреба по време на ранна бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна повече от три месеца, тъй като може да е причина за сериозно увреждане на Вашето бебе, ако го използвате през този период (вижте точка “Бременност, кърмене и фертилитет”).

Когато приемате Запринел плюс, Вие трябва да информирате Вашия лекар или медицинския екип:

- ако Ви предстои упойка и/или операция,
- ако наскоро сте имали диария или повръщане или сте обезводнени,
- ако сте на диализа или LDL-афереза (метод за отстраняване на холестерола от кръвта Ви посредством апарат),
- ако сте на хипосенсибилизиращо лечение за намаляване ефекта на алергия към пчели или ухапване от оси,
- ако Ви предстои медицинско изследване, което изисква инжектиране на йод-съдържащи контрастни вещества (вещество, което прави видими вътрешните органи по време на рентгеново изследване),
- ако получите промени в зрението или болка в едното или и в двете очи, докато приемате Запринел плюс. Това може да е признак че развивате глаукома (повишено налягане в окото (очите)). Трябва да прекратите лечението със Запринел плюс и да се консултирате с лекар.

Спортистите трябва да знаят, че Запринел плюс съдържа активна съставка (индапамид), която може да е причина за положителна реакция на допинг.

Деца и юноши

Запринел плюс не трябва да се дава на деца и юноши.

Други лекарства и Запринел плюс

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.



Трябва да избягвате употребата на Запринел плюс с:

- литий (използван за лечение на мания или депресия),
- алискирен (лекарство за лечение на хипертония), ако нямате захарен диабет или проблеми с бъбреците,
- хранителни добавки, съдържащи калий (включително заместители на солта), калий-съхраняващи диуретици и други лекарства, които могат да повишат количеството на калий в кръвта (напр. триметоприм и ко-тримоксазол при инфекции, предизвикани от бактерии; циклоспорин, лекарство, потискащо имунната система, което се използва за предотвратяване на отхвърлянето на органен трансплантат; и хепарин, лекарство, използвано за разреждане на кръвта за предотвратяване на образуването на тромби),
- естрамустин (използван при лечение на рак),
- други лекарства за лечение на високо кръвно налягане: инхибитори на ангиотензин-конвертиращ ензим и ангиотензин-рецепторни блокери.

Лечението със Запринел плюс може да бъде повлияно от други лекарства. Вашият лекар може да промени дозата и/или да предприеме други предпазни мерки. Такива са:

- други лекарства за лечение на високо кръвно налягане,
- може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки: Ако приемате ангиотензин II-рецепторен блокер (ARB) или алискирен (вижте също информацията озаглавена "Не приемайте Запринел плюс" и "Предупреждения и предпазни мерки") или диуретици (лекарства, които повишават количеството урина, отделено от бъбреците),
- калий-съхраняващо лекарства за лечение на сърдечна недостатъчност: еплеренон и спиронолактон в дози от 12,5 mg до 50 mg на ден,
- лекарства, които най-често се използват за лечение на диария (рацекадотрил) или за предотвратяване отхвърлянето на трансплантирани органи (сиролимус, еверолимус, темсиролимус и други лекарства от класа на mTOR инхибиторите). Вижте точка „Предупреждения и предпазни мерки“.
- сакубитрил/валсартан (използван за продължително лечение на сърдечна недостатъчност). Вижте разделите „Не приемайте Запринел плюс“ и „Предпазни мерки и предупреждения“.
- обезболяващи лекарства,
- йод-контрастно вещество,
- моксифлоксацин, спарфлоксацин (антибиотици: използвани за лечение на бактериални инфекции),
- метадон (използван за лечение на зависимост),
- прокаинамид (за лечение на неравномерно биене на сърцето),
- алопуринол (за лечение на подагра),
- мизоластин, терфенадин или астемизол (антихистамини за копривна треска или алергии),
- кортикостероиди използвани за лечение на различни състояния, включително тежка астма и ревматоиден артрит,
- имunosупресори използвани за лечение на автоимунни заболявания или след трансплантация на орган, за профилактика отхвърлянето на присадката (като циклоспорин, такролимус),
- лекарства за лечение на рак,
- еритромицин прилаган инжекционно (антибиотик),
- халофантрин (използван за лечение на някои видове малария),
- пентамидин (за лечение на пневмония),
- инжекционно злато (използвано за лечение на ревматоиден полиартрит),
- винкамин (използван за лечение на симптоматични когнитивни нарушения при пациенти в старческа възраст, включително загуба на паметта),
- бепридил (използван за лечение на ангина пекторис),
- лекарства използвани за лечение на ритъмни нарушения на сърцето (напр. хинидин, хидрохинидин, дизопирамид, амиодарон, соталол, ибутилид, дофетилид, дигиталис, бретилиум),
- дигоксин или други сърдечни гликозиди (за лечение на сърдечни проблеми),
- цизаприд, дифеманил (използвани за лечение на стомашни и храносмилателни проблеми).



- баклофен (за лечение на схващане на мускулите, наблюдавано при заболявания като множествена склероза),
- лекарства за лечение на диабет като инсулин, метформин или глиптини,
- калций, включително калциеви добавки,
- стимулиращи лаксативи (напр. сена),
- нестероидни противовъзпалителни средства (напр. ибупрофен) или високи дози салицилати (като ацетилсалицилова киселина, която се съдържа в много лекарства, използвани за облекчаване на болка и понижаване на висока температура, както и за предотвратяване на съсирването на кръвта),
- амфотерицин В, прилаган инжекционно (за лечение на тежки гъбични инфекции),
- лекарства за лечение на психични заболявания като депресия, тревожност, шизофрения (напр. трициклически антидепресанти, невролептици (като амисулпирид, сулпирид, султоприд, тиаприд, халоперидол, дроперидол)),
- тетракозактид (за лечение на болестта на Крон)
- триметоприм (за лечение на инфекции),
- вазодилататори, включително нитрати (продукти, които разширяват кръвоносните съдове),
- лекарства за лечение на ниско кръвно налягане, шок или астма (напр. ефедрин, норадреналин или адреналин).

Запринел плюс с храна и напитки

Препоръчително е Запринел плюс да се приема преди хранене.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Трябва да информирате Вашия лекар, ако мислите че сте (или може би сте) бременна. Обикновено Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете употребата на Запринел плюс преди да забременеете или веднага след като сте забременели и ще Ви препоръча да приемате друго лекарство вместо Запринел плюс. Употребата на Запринел плюс не се препоръчва по време на ранна бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна повече от три месеца, тъй като може да причини сериозни увреждания на Вашето бебе, ако се използва след третия месец от бременността.

Кърмене

Запринел плюс не се препоръчва по време на кърмене.

Информирайте незабавно Вашия лекар, ако кърмите или планирате да кърмите.

Веднага посетете Вашия лекар.

Фертилитет

Ефектите на периндоприл и индапамид върху фертилитета при хора са неизвестни.

Шофиране и работа с машини

Запринел плюс обикновено не се отразява на бодростта, но при някои пациенти може да се появят реакции като замаяност или слабост свързани с понижаване на кръвното налягане. Ако се появят, това може да ограничи способностите Ви за шофиране или работа с машини.

Запринел плюс съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

Запринел плюс съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.



3. Как да приемате Запринел плюс

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Препоръчителната доза е една таблетка веднъж дневно. Вашият лекар може да промени дозовия режим, ако имате бъбречно увреждане. Вземайте таблетката за предпочитане сутрин, преди хранене. Поглъщайте таблетката с чаша вода.

Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.

Ако сте приели повече от необходимата доза Запринел плюс

Ако сте приели твърде много таблетки, обадете се на най-близкия спешен център или веднага информирайте Вашия лекар. Най-вероятният ефект при предозиране е ниското кръвно налягане. При забелязано падане на кръвното налягане (свързано с гадене, повръщане, спазми, замаяност, сънливост, психическа обърканост, промяна в количеството урина, произведена от бъбреците), лягането и поставянето на краката на по-високо може да помогне.

Ако сте пропуснали да приемете Запринел плюс

Важно е да вземете лекарството си всеки ден, тъй като редовното лечение е по-ефективно. Все пак, ако забравите да вземете дозата си Запринел плюс, приемете следващата доза в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на Запринел плюс

Тъй като лечението на високото кръвно налягане продължава цял живот, трябва да се консултирате с Вашия лекар преди да спрете употребата на този лекарствен продукт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете приема на лекарствения продукт и незабавно посетете лекар, ако получите някоя от следните нежелани реакции, които могат да бъдат сериозни:

- силна замаяност или припадък, поради ниско кръвно налягане (чести: могат да засегнат до 1 на 10 човека),
- бронхоспазм (стягане в гърдите, хрипене и недостиг на въздух) (нечести: могат да засегнат до 1 на 100 човека),
- оток на лицето, устните, устата, езика или гърлото, затруднено дишане (ангиоедем) (виж точка 2 "Предупреждения и предпазни мерки") (нечести: могат да засегнат до 1 на 100 човека),
- тежки кожни реакции включително еритема мултиформе (кожен обрив, който често започва с червени сърбящи петна по лицето, ръцете или краката) или интензивен кожен обрив, уртикария, зачервяване на кожата по цялото тяло, силен сърбеж, образуване на мехури, лющене и подуване на кожата, възпаление на лигавиците (синдром на Стивънс-Джонсън) или други алергични реакции (много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 души),
- сърдечно-съдови нарушения (неравномерна сърдечна дейност, стенокардия (болка в гърдите, челюстта и гърба, предизвикани от физическо напрежение), сърдечен удар (много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 човека),
- слабост на ръцете или краката, или проблеми с говора, които могат да бъдат признак на възможен инсулт (много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 души),
- възпаление на панкреаса, което може да причини силни болка в корема и гърба, придружени от чувство на силно неразположение (много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 души),



- пожълтяване на кожата или очите (жълтеница), което може да е признак на хепатит (много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 души),
- животозастрашаващ неравномерен сърдечен ритъм (с неизвестна честота),
- заболяване на мозъка, причинено от чернодробна болест (чернодробна енцефалопатия) (с неизвестна честота),
- мускулна слабост, крампи, чувствителност или болка и особено ако в същото време не се чувствате добре или имате висока температура - това може да е причинено от аномално разпадане на мускулите (с неизвестна честота).

В низходящ ред в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции може да включват:

- Чести (могат да засегнат до 1 на 10 човека)
ниски нива на калий в кръвта, кожни реакции при пациенти с предразположение към алергични и астматични реакции, главоболие, замаяност, вертиго, изтръпване и мравучкане, зрителни нарушения, тинитус (шум в ушите), кашлица, задух (диспнея), стомашно-чревни нарушения (гадене, повръщане, коремна болка, нарушения на вкуса, диспепсия или нарушено храносмилане, диария, констипация), алергични реакции (като кожни обриви, сърбеж), спазми, умора,
- Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 човека)
промени в настроението, депресия, нарушения на съня, уртикария, пурпура (червени петънца като убождане от карфица по кожата), образуване на струпвания от мехури по кожата, бъбречни проблеми, импотентност (невъзможност за постигане и поддържане на ерекция), изпотяване, много голям брой еозинофили (вид бели кръвни клетки), промяна в лабораторните показатели: високо ниво на калий в кръвта, обратимо при спиране на лечението, ниско ниво на натрий, което може да доведе до дехидратация и ниско кръвно налягане, сънливост, припадък, сърцебиене (усещане на сърдечния ритъм), тахикардия (учестен сърдечен ритъм), хипогликемия (много ниско ниво на кръвната захар) при пациенти с диабет, васкулит (възпаление на кръвоносните съдове), сухота в устата, реакция на фоточувствителност (повишена чувствителност на кожата към слънцето), артралгия (болки в ставите), миалгия (болка в мускулите), болка в гърдите, неразположение, периферен оток, треска, повишени урея и креатинин в кръвта, падане.
- Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 човека)
тъмна на цвят урина, гадене или повръщане, мускулни крампи, състояние на обърканост и припадъци. Това може да са симптоми на състояние, наречено СНАДХ (синдром на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон). Зачервяване, влошаване на псориазис, намалено или липсващо отделяне на урина, остра бъбречна недостатъчност, промени в лабораторните показатели: понижен хлорид в кръвта, понижен магнезий в кръвта, повишено ниво на чернодробните ензими, високо ниво на серумен билирубин, слабост.
- Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 човека)
състояние на обърканост, еозинофилна пневмония (рядък вид пневмония), ринит (запушен нос), алергична реакция на тънките черва (ангиоедем на червата), промени в кръвните показатели, като понижен брой бели и червени кръвни клетки, понижен хемоглобин, понижен брой кръвни тромбоцити, високи нива на калций в кръвта, нарушена чернодробна функция,
- С неизвестна честота (оценка на честотата не може да бъде направена от наличните данни)
Промяна в електрокардиограмата, промени в параметрите на лабораторните изследвания: високи нива на пикочна киселина в кръвта и високи нива на кръвна захар, намаляване на зрението или болка в окото поради високо налягане (възможни признаци за натрупване на течност в съдовия слой на окото (хороидален излив) или остра закритоъгълна глаукома), промяна в цвета, изтръпване и болка в пръстите на ръцете или краката (феномен на Рейно), мускулен разпад, който често води до увреждане на бъбреците (рабдомиолиза). Ако страдате от системен лупус еритематодес (тип заболяване на колагена) може да настъпи влошаване.

Може да се проявят нарушения на кръвта, бъбреците, черния дроб или задстомашната жлеза, както и промени в лабораторните показатели (кръвни изследвания). Вашият лекар може да поиска по-често провеждане на кръвни изследвания, за да контролира състоянието Ви.



Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Запринел плюс

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и етикета на първичната опаковка след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

След отваряне да се използва в рамките на 100 дни.

Съхранявайте първичната опаковка плътно затворена, за да се предпази от влага.

Това лекарство не изисква специални температурни условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Запринел плюс

- Активните вещества са периндоприлов тозилат и индапамид. Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg периндоприлов тозилат (съответстващ на 3,408 mg периндоприл) и 1,25 mg индапамид.
- Другите съставки са лактоза монохидрат, царевично нишесте, натриев хидроген карбонат, прежелатинизирано нишесте (царевично), повидон, магнезиев стеарат, частично хидролизиран поливинилов алкохол, титанов диоксид (E171), макрогол/PEG 3350 и талк.

Как изглежда Запринел плюс и какво съдържа опаковката

Запринел плюс 5 mg/1,25 mg филмирани таблетки са бели, продълговати, двойно изпъкнали филмирани таблетки, с вдлъбнато релефно изображение "P" "I", с делителна черна от едната страна и гладки от другата.

Таблетките се предлагат в опаковки от 30, 60, 90, 90 (3x30) или 100 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem
Нидерландия

Производители

Teva Operations Poland Sp.z.o.o.
Mogilska 80, 31-546 Krakow
Полша



Pharmachemie B.V.
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem
Нидерландия

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13, 4042 Debrecen
Унгария

Това лекарство е разрешено за употреба в държавите - членки на Европейското икономическо пространство и в Обединеното кралство (Северна Ирландия) под следните имена:

България	Запринел плюс 5 mg/1,25 mg филмирани таблетки
Естония	Perindopril/Indapamide Teva
Франция	Perindopril /Indapamide Teva
Северна Ирландия	Perindopril tosilate/Indapamide Teva
Италия	Perindopril e Indapamide Teva
Литва	Perindopril/Indapamide Teva 5mg/1,25mg plėvele dengtos tabletės
Латвия	Perindopril/Indapamide Teva 5mg/1,25mg apvalkotās tabletes
Нидерландия	Perindopril Tosilaat/Indapamide Teva 5 mg/1,25 mg, filmomhulde tabletten
Полша	Indix Combi
Румъния	Perindopril Tosilat/Indapamidă Teva 5 mg/1.25 mg comprimate filmate
Словения	Perivol Combo 5 mg/1,25 mg filmsko obložene tablete

Дата на последно преразглеждане на листовката

