

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

БРОНХОТОН

4,6 mg/5,75 mg/5 ml сироп

Ефедринов хидрохлорид/ Глауцинов хидробромид сироп

BRONCHOTON®

4,6 mg/5,75 mg/5 ml syrup

Ephedrine hydrochloride/ Glaucine hydrobromide

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 5 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява БРОНХОТОН сироп и за какво се използва
2. Преди да използвате БРОНХОТОН сироп
3. Как да използвате БРОНХОТОН сироп
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате БРОНХОТОН сироп
6. Допълнителна информация

ДОПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	9800210
Разрешение №	БГ/МА/МР-55725
Одобрение №	/ 31-01- 2019

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БРОНХОТОН сироп И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Как действа БРОНХОТОН сироп?

Комбинираният лекарствен продукт БРОНХОТОН е с противокашлично, бронхоантисептично и бронхоразширяващо действие. Глауцинът подтиска центъра на кашлицата, подобно на кодеина, като не дава неговите нежелани лекарствени реакции. Ефедринът възбуджа дишането, разширява бронхите и намалява отока на бронхиалната лигавица.

Какво лекува БРОНХОТОН сироп?

Симптоматично лечение на кашлица при остри респираторни инфекции на горните дихателни пътища, остри и хронични бронхити, бронхиална астма, коклюш.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ БРОНХОТОН сироп

Не използвайте БРОНХОТОН сироп:



- ако сте свръхчувствителни към активните вещества или към някое от помощните вещества на лекарствения продукт;
- при стенокардия;
- при атеросклероза;
- при тиреотоксикоза;
- при хипертония;
- при сърдечна недостатъчност;
- при феохромоцитом;
- при аденоама на простатата с ретенция на урината;
- при глаукома;
- при аритмии;
- при деца под 3-годишна възраст.

Обърнете специално внимание при употребата на БРОНХОТОН сироп:

Този продукт съдържа 1,2 об.% етанол. Представлява опасност за страдащите от чернодробни заболявания, алкохолизъм, епилепсия, мозъчни увреждания или заболявания, както и за бременни и деца. Може да промени или засили действието на други продукти.

5 ml сироп съдържат 1,975 g захароза. Неподходящ при хора с вродена непоносимост към фруктозата, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захарозно/изомалтазен дефицит.

Да се прилага при деца от 3 до 6 г. под лекарско наблюдение. Да не се приема в по-късните часове на деня, поради съдържащия се ефедрин и възбуджащото му действие. Да не се прилага при бременни и кърмачки. Не бива да се приема от спортсти. Ако болния е приемал ИМАО да се приема две седмици след спиране на лечението.

Взаимодействие с други лекарства:

Моля информирайте Вашия фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецептa.

- Комбинацията БРОНХОТОН - инсулин или БРОНХОТОН - орални антидиабетични продукти може да намали ефекта на антидиабетичните лекарствени продукти;
- Комбинация БРОНХОТОН – гванетидин (антихипертензивен продукт) увеличава риска от ритъмни нарушения, може да антагонизира ефекта на антихипертензивните продукти;
- Комбинация БРОНХОТОН – дексаметазон (синтетичен кортикоステроиден продукт, притежаващ засилена противовъзпалителна активност) – намалява терапевтичния ефект на дексаметазона;
- Комбинация БРОНХОТОН - МАО инхибитори (антидепресанти) - възможност за аритмии, главоболие, хипертензивни кризи, мозъчни кръвоизливи;
- БРОНХОТОН не бива да се приема едновременно с муколитици като амброксол, бромхексин и N-ацетилцистеин;
- БРОНХОТОН не бива да се използва при предстояща анестезия с циклопропан или халотан;
- По време на приема на БРОНХОТОН не бива да се приемат продукти, алкализиращи урината, както и натриев бикарбонат.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Да не се прилага при бременни и кърмачки.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте тъй като Ефедринът може да предизвика мидриаза и да повлияе шофирането.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ БРОНХОТОН сироп

Винаги използвайте БРОНХОТОН сироп точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако лекарят не е предписал друго обичайната доза е:

Възрастни - по 1 супена лъжица 3 пъти дневно;

Деца над 3 години - по 1 чаена лъжичка 3 пъти дневно;



Деца над 10 години - по 2 чаени лъжички 3 пъти дневно.

Ако сте използвали повече от необходимата доза БРОНХОТОН сироп:

При предозиране могат да се появят гадене, повръщане, нервна възбуда, трепор, световъртеж, затруднено уриниране.

При предозиране се прави стомашна промивка.

Лечението е симптоматично.

Ако сте пропуснали да използвате БРОНХОТОН сироп:

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, БРОНХОТОН сироп може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

- Реакции на свръхчувствителност;
- Участване работата на сърцето;
- Повишаване на артериалното налягане;
- Подтикване перисталтиката на червата;
- Разширяване на зениците;
- Възбуждащ ефект върху централната нервна система (психично и двигателно беспокойство, особено при предозиране, безсъние);
- Понижение на апетита;
- Повишаване възбудимостта на дихателната система;
- При децата е възможно предизвикване на съниливост.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ БРОНХОТОН сироп

При температура под 25°C, на сухо и защитено от светлина място.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност:

4 години.

Преди употреба погледнете датата на изтичане на срока на годност, която е отбелязана върху опаковката.

Лекарственият продукт да не се използва след датата на изтичане срока на годност, посочена върху опаковката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа БРОНХОТОН сироп?

5 ml сироп съдържат като активни вещества 4,6 mg Ефедринов хидрохлорид; 5,75 mg Глауцинов хидробромид и като помощни вещества Босилково масло; Лимонена киселина моногидрат; Захароза;



Метил парахидроксибензоат; Пропил парахидроксибензоат; Полисорбат 80; Етанол (96 %);
Пречистена вода.

Как изглежда БРОНХОТОН сироп и какво съдържа опаковката?

БРОНХОТОН е бистра сироповидна течност, с жълтокафяв цвят, парливо-сладникав вкус и със специфичен мириз, на босилково масло, сироп в тъмни флакони по 125 g, поставени в индивидуална картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба:

ДАНСОН-БГ ООД

2400 гр. Радомир, България, ул. "Отец Паисий" №26

тел.: +35924519300

e-mail: office@danhson.bg

Производител:

ВЕТПРОМ АД

2400 гр. Радомир, България, ул. "Отец Паисий" №26

тел.: +35924519300

e-mail: office@vpharma.bg

Дата на последна редакция на листовката 11/2018 г.

