

Листовка: информация за пациента

Към Рег. № 20170037138

АКАРД 75 mg стомашно-устойчиви таблетки

АКАРД 150 mg стомашно-устойчиви таблетки

Ацетилсалицилова киселина

Одобрение № 86144747-57263-4

06.01.2022

ACARD 75 mg gastro-resistant tablets

ACARD 150 mg gastro-resistant tablets

Acetylsalicylic acid

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Акард и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Акард
3. Как да приемате Акард
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Акард
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Акард и за какво се използва

Акард съдържа ацетилсалицилова киселина, която в ниски дози принадлежи към група лекарства, наречени антитромбоцитни средства. Тромбоцитите са малки клетки в кръвта, които предизвикват съсирването на кръвта и участват в тромбозата. При възникване на кръвен съсирик в артерия, той спира кръвотока и намалява притока на кислород. Когато това се случи в сърцето, може да предизвика инфаркт или стенокардия; в мозъка може да предизвика инсулт.

Акард се използва, за да се намали рисъкът от образуване на кръвни съсирици и по този начин да се предотвратят по-нататъшни:

- инфаркти
- инсулти
- сърдечносъдови проблеми при пациенти, които страдат от нестабилна стенокардия (вид болка в гърдите).

Акард се използва и за предотвратяване на образуването на кръвни съсирици след някои видове сърдечна операция, за разширяване или деблокиране на кръвоносните съдове.

Акард не се препоръчва при спешни ситуации. Той е ограничен до вторична профилактика при хронично лечение.



2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Акард

Не приемайте Акард

- ако сте алергични към ацетилсалицилова киселина, към други салицилати или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка б);
- ако имате хеморагична диатеза или коагулационни нарушения: хемофилия (нарушение на кръвосъсирването, което забавя процеса на съсиране на кръвта), тромбоцитопения (състояние, при което имате нисък брой на тромбоцитите в кръвта. Това състояние понякога се свързва с нарушен кървене);
- ако имате или никога сте имали язва на stomахa или тънките черва или всякакъв друг вид кървене като инсулт;
- ако имате тежко бъбречно увреждане;
- ако имате тежко чернодробно увреждане;
- ако имате тежка сърдечна недостатъчност;
- ако имате астма. Анамнеза на аспиринов астматичен пристъп поради салицилати или лекарствени продукти с подобно действие, особено нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС);
- ако приемате метотрексат (например за рак или ревматоиден артрит) в дози от 15 mg/седмица или по-големи;
- ако сте в третия триместър на бременността;
- при деца и юноши на възраст под 16 години, поради риск от синдром на Рей (вж. по-долу).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Акард:

- ако сте в първия или втория триместър на бременността;
- ако кърмите;
- в случай на свръхчувствителност към нестероидни противовъзпалителни и антиревматични лекарствени продукти или други алергенни вещества;
- ако приемате антикоагуланти (използвани за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци);
- ако приемате ибупрофен, който може да повлияе на антитромбоцитния ефект на ацетилсалицилова киселина;
- ако имате бъбречно или чернодробно увреждане;
- ако имате високо кръвно налягане и/или сърдечна недостатъчност
- ако имате история на пептична язва или stomашно-чревно кървене;
- ако сте в напреднала възраст;
- ако имате подагра;
- ако имате тежки менструални цикли;
- ако страдате от дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа.

Акард не е подходящ за употреба като противовъзпалително средство/аналгетик/антипириетик.

Трябва веднага да потърсите медицинска помощ, ако симптомите Ви се влошат или ако се появят сериозни или неочеквани нежелани реакции, например симптоми на необичайно кървене, сериозни кожни реакции или други признаци на сериозна алергия (вижте точка „Възможни нежелани реакции“).

Акард не трябва да се прилага в продължение на 5 дни преди планова операция (включително малки процедури, като например изваждане на зъб).

Деца и юноши

Ацетилсалициловата киселина може да предизвика синдром на Рей, когато се дава на деца. Синдромът на Рей е рядко заболяване, което засяга мозъка и черния дроб и може да бъде животозастрашаващо. По тази причина, Акард не трябва да се използва при деца и юноши до 16 години.



Други лекарства и Акард

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не използвайте едновременно Акард:

- ако приемате лекарство, наречено метотрексат (например за рак или ревматоиден артрит) в доза по-висока от 15 mg на седмица или по-голяма.

Посъветвайте се с Вашия лекар преди да приемате някое от следните лекарства заедно с Акард:

- метотрексат, използван в дози по-ниски от 15 mg/седмица;
- кумаринови производни, хепарин (използван за предотвратяване на кръвосъсирването);
- селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRI), като сертрапол или пароксетин (за депресия);
- други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), включително салицилати и ибупрофен (за облекчаване на болката и за лечение на възпаление);
- бензпромарон и пробенецид (за подагра);
- дигоксин (за лечение на проблеми със сърцето);
- антидиабетни средства, например инсулин и сулфанилурейни;
- тромболитични лекарствени продукти или други антитромботични инхибитори (например тиклопидин);
- диуретици (например фуросемид);
- кортикоステроиди (използвани за много състояния като болка, подуване, алергия, астма, ревматизъм и кожни проблеми);
- АСЕ-инхибитори, например еналаприл, каптоприл (за лечение на високо кръвно налягане);
- валпроева киселина (за лечение на епилепсия);
- ацетазоламид (за лечение на глаукома);
- антиациди (за стомашно разстройство) и адсорбенти (например каолин за диария);
- сульфонамидни антибиотици;
- циклоспорин (използван при трансплантиране на органи за предотвратяване на отхвърлянето);
- метоклопрамид (за гадене или повръщане);
- зафирлукаст (за астма).

Метамизол (вещество за намаляване на болката и температурата) може да понижи ефекта на ацетилсалициловата киселина върху агрегацията на тромбоцитите (слепване на кръвни клетки и образуване на кръвен съсирек), когато се приема едновременно. Следователно, тази комбинация трябва да се използва с повишено внимание при пациенти, които приемат ниска доза аспирин за кардиопротекция (предпазване).

Акард с храна, напитки и алкохол

Избягвайте употребата на алкохол заедно с приема на Акард.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате лекарството, ако сте в първите 6 месеца на бременността. Не го използвайте в последните 3 месеца на бременността.

Тъй като ацетилсалициловата киселина се отделя в майчиното мляко, Акард не трябва да се приема от майки, които кърмят, поради съществуващия рисков от синдром на Рей при детето. Високи дози при майката могат да нарушият функцията на тромбоцитите при детето.

Шофиране и работа с машини

Ацетилсалицилова киселина не повлиява способността за шофиране или работа с машини.



Акард съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на стомашно-устойчива таблетка, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

3. Как да приемате Акард

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Трябва да потърсите съвет от лекар преди започване на лечението за първи път.

Препоръчителната доза е 75 mg до 150 mg дневно.

Старческа възраст

Като цяло, ацетилсалициловата киселина трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти в старческа възраст, които са по-податливи на нежелани реакции. Лечението трябва да се преразглежда на редовни интервали.

Употреба при деца и юноши

Акард е противопоказан при деца под 16-годишна възраст (вижте раздел „Предупреждения и предпазни мерки“).

Бъбречно и чернодробно увреждане

Акард трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с нарушена бъбречна или чернодробна функция (да се избягва при тежки увреди).

Начин на приложение

Перорална употреба.

Таблетките трябва да се погълнат цели след хранене с достатъчно количество течност (½ чаша вода).

Стомашно-устойчивата таблетка има покритие и не се разпада в стомаха, като по този начин намалява дразненият ефект на ацетилсалициловата киселина върху стомашната лигавица и следователно не трябва да се натрошава, чупи или дъвче.

Ако сте приели повече от необходимата доза Акард

В случай на предозиране, се свържете с Вашия лекар, а в случай на остро отравяне, пациентът трябва незабавно да бъде откаран в болница.

Симптомите на предозиране обикновено са: шум в ушите, хипервентилация, треска, гадене, повръщане, замъглено зрение, главоболие, замайване, объркване, нарушения на киселинно-алкалния и електролитния баланс, хипогликемия, кожни обриви.

В случай на остро предозиране, могат да се възникнат делириум, трепор, задух, изпотяване, възбуда и кома.

Ако сте пропуснали да приемете Акард

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка, само вземете следващата доза в обичайното време.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.



Спрете да използвате това лекарство и се свържете с Вашия лекар, ако получите:

- първи признаци на алергична реакция (например оток на лицето, устните, езика, гърлото, причиняващи затруднено дишане или прегълъщане);
- необичайно кървене, като например кървави храчки, кръв в повърнати матери и или урина, или черни изпражнения.

След това лекарят ще прецени тежестта на признаците и ще реши как да се процедира.

Други нежелани реакции на ацетилсалициловата киселина:

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

- лошо храносмилане (киселини в стомаха, гадене, повръщане) и болки в корема.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 души)

- стомашно-чревно възпаление, стомашна и/или дуоденална язва, много рядко водещи до стомашно-чревни кръвоизливи и перфорации, характеризирани се с клинични и лабораторни признаци;
- реакции на свръхчувствителност, характеризирани се с лабораторни и клинични признаци, включително: астма, затруднено дишане или хрипотене, ангиоедем, кожни реакции, оток; тежки реакции на свръхчувствителност, включително анафилактичен шок;
- сильно кървене, например стомашно-чревен кръвоизлив и вътречерепен кръвоизлив (особено при пациенти с неконтролирано високо кръвно налягане и/или по време на едновременното приложение на антихемостатици), което в отделни случаи може да бъде потенциално животозастрашаващо;
- преходна чернодробна дисфункция с повишени трансаминази (група от ензими, които показват как работи черният дроб);
- необичайни тежки или продължителни менструални цикли.

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души)

- ниска кръвна захар;
- тежки кожни реакции, включително синдром на Stevens-Johnson и токсична епидермална некролиза;
- нарушена бъбречная функция, уратни камъни в бъбреците.

С неизвестна честота (не може да бъде изчислена от наличните данни)

- повишен риск от кървене, удължаване на времето на кървене, тромбоцитопения - намаляване на броя на тромбоцитите;
- периоперативна хеморагия, хематоми, кървене от носа, урогенитално кървене, кървене от венците;
- световъртеж и шум в ушите (тинитус), които обикновено са симптоми на предозиране;
- чернодробна недостатъчност, синдром на Рей;
- реакции на свръхчувствителност, характеризирани се с лабораторни и клинични признаци, включително: сериозна алергична реакция, която причинява подуване на лицето или гърлото, кожни реакции, задръжка на течности (оток), обрив, уртикария, сърбеж, сърдечни и дихателни нарушения.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303, София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



5. Как да съхранявате Акард

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да не се съхранява над 25°C. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Акард

- Активното вещество е ацетилсалицилова киселина.
Всяка стомашно-устойчива таблетка Акард 75 mg съдържа 75 mg ацетилсалицилова киселина.
- Всяка стомашно-устойчива таблетка Акард 150 mg съдържа 150 mg ацетилсалицилова киселина.
- Другите съставки са:
 - целулоза на прах, царевично нишесте, натриев нишестен гликолат (тип C) - в ядрото на таблетката;
 - хипромелоза, триетилцитрат, симетиконова емулсия, съполимер на метакрилова киселина и етилакрилат (1:1), талк, титанов диоксид, колоиден безводен силициев диоксид, натриев хидрогенкарбонат, натриев лаурилсулфат - в покритието на таблетката.

Как изглежда Акард и какво съдържа опаковката

Акард 75 mg е бяла, с форма на сърце и двойноизпъкнала филмирана таблетка.

Акард 150 mg е бяла, кръгла и двойноизпъкнала филмирана таблетка.

Акард 75 mg се предлага в блистери от по 30, 60 или 120 стомашно-устойчиви таблетки.

Акард 150 mg се предлага в блистери от по 30 или 60 стомашно-устойчиви таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A.

19, Pelplińska Street

83-200 Starogard Gdańsk, Полша

Производител

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A.

19, Pelplińska Street

83-200 Starogard Gdańsk, Полша

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A.

Production Department in Nowa Dęba

2, Metalowca Street

39-460 Nowa Dęba, Полша



Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под следните имена:

- България: АКАРД 75 mg стомашно-устойчиви таблетки
АКАРД 150 mg стомашно-устойчиви таблетки
- Латвия: HEARTISAN 75 mg zarnās šķīstošās tablets
HEARTISAN 150 mg zarnās šķīstošās tabletēs
- Литва: HEARTISAN 75 mg skrandyje neirios tabletės
HEARTISAN 150 mg skrandyje neirios tabletės

Дата на последно преразглеждане на листовката

