

Листовка: информация за потребителя

Гавискон Мента Ликвид 500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml + 160 mg/10 ml перорална супензия
Натриев алгинат/Натриев хидроген карбонат/Калциев карбонат

Gaviscon Cool Mint Liquid 500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml + 160 mg/10 ml oral suspension
Sodium alginate/Sodium hydrogen carbonate/Calcium carbonate

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар, или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дни не се почувствате добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Гавискон Мента Ликвид и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате Гавискон Мента Ликвид
3. Как да използвате Гавискон Мента Ликвид
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Гавискон Мента Ликвид
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. № 20100245	
БГ/МА/МР - 67623	23-01-2025
Стандартни N.	

1. Какво представлява Гавискон Мента Ликвид и за какво се използва

Гавискон Мента Ликвид спада към група лекарства, наречени „супресори на рефлукса”, които образуват защитен слой по повърхността на stomашното съдържимо до 4 часа, за да възпрепятстват изтичането на stomашна киселина от stomаха към хранопровода, където причинява болка и дискомфорт.

Това лекарство се използва за лечение на симптоми на гастро-езофагеален рефлукс, като киселина регургитация, киселини от stomаха и нарушен храносмилане, свързани с рефлукса, например след хранене или по време на бременност, или при пациенти със симптоми свързани с рефлукс езофагит.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате Гавискон Мента Ликвид


Не приемайте Гавискон Мента Ликвид

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на Гавискон Мента Ликвид, тъй като много рядко е възможно да се появят затруднено дишане и кожни обриви (виж информацията по-долу за пълния списък на нежелани реакции).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Гавискон Мента Ликвид

Този лекарствен продукт съдържа натрий (143 mg на 10 ml) и калций (64 mg на 10 ml).
Максималната препоръчителна дневна доза от този продукт съдържа 1/40 от общия натрий (такъв какъвто се намира в готоварската сол). Това е еквивалентно на 57% от препоръката за възрастни максимална дневна доза за прием на натрий.



- Гавискон Мента Ликвид е предназначен за краткосрочно лечение, освен ако не е препоръчано нещо друго от Вашия медицински специалист. Говорете с Вашия фармацевт или лекар ако трябва да приемате Гавискон Мента Ликвид ежедневно, за продължителен период от време или редовно, особено ако сте посъветвани да спазвате диета с ниско съдържание на сол.
- Моля също говорете с Вашия лекар относно количеството на тези соли ако страдате от сериозно бъбречно или сърдечно заболяване, тъй като такива соли могат да повлият на тези заболявания.

Ако симптомите се запазят след 7 дни, консултирайте се с Вашия лекар.

Други лекарства и Гавискон Мента Ликвид

Не приемайте този лекарствен продукт в рамките на 2 часа от приема на други лекарствени продукти през устата, тъй като може да повлияе действието на другите лекарствени продукти.

Моля уведомете Вашия лекар или фармацевт ако приемате или нас скоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканi без рецептa.

Бременност, кърмене и фертилитет

Този лекарствен продукт може да се прилага по време на бременност или кърмене.

Важна информация относно някои от съставките на Гавискон Мента Ликвид

Този лекарствен продукт съдържа метил (Е 218) парагидроксилензоат и пропил (Е 216) парагидроксилензоат, които могат да причинят алергични реакции (възможно с късна поява).

3. Как да използвате Гавискон Мента Ликвид

За перорална употреба.

Разклатете добре преди употреба.

Възрастни, включително в старческа възраст и деца на и над 12-годишна възраст: 10–20 ml след хранене и преди сън (до четири пъти дневно).

Деца под 12-годишна възраст: Прилага се само по лекарско предписание.

Ако сте приели повече от необходимата доза Гавискон Мента Ликвид

Ако сте приели по-голямо количество от лекарствения продукт, малко е вероятно това да Ви навреди. Въпреки това е възможно да се чувствате подут и да усетите някакъв дискомфорт в корема. Ако оплакването не премине, консултирайте се с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали прием на Гавискон Мента Ликвид


Ако пропуснете приема на една доза, не приемайте двойна доза следващия път, а продължете обичайния прием на лекарствения продукт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Гавискон Мента Ликвид може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако се появят някои от следните нежелани реакции, преустановете приема на лекарството и се посъветвайте с Вашия лекар възможно по-скоро. Много рядко (по-малко от 1 на 10 000) може да се наблюдават алергични реакции към помощните вещества. Симптомите включват кожни обриви, сърбеж, затруднено дишане, замаяност или отоци на лицето, устните, очите или гърлото.

Съобщаване на нежелани реакции



Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417 уебсайт: www.bda.bg

Когато съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Гавискон Мента Ликвид

Да се съхранява на място, недостъпно за деца

Не използвайте Гавискон Мента Ликвид след изтичане срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и етикета.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте го при температура под 30°C.

Да не се замразява или съхранява в хладилник.

Проверете целостта на калачката преди първата употреба на продукта.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които не ползвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Гавискон Мента Ликвид

Активните вещества на всеки 10 ml перорална суспензия са: 500 mg натриев алгинат, 267 mg натриев хидроген карбонат и 160 mg калциев карбонат.

Другите съставки са:

Карбомер, метил паракидроксибензоат (Е 218), пропил паракидроксибензоат (Е 216), захарин натрий, ментово масло, натриев хидроксид, пречистена вода.

Този лекарствен продукт не съдържа захар и глутен.

Как изглежда Гавискон Мента Ликвид и какво съдържа опаковката

Лекарственият продукт Гавискон Мента Ликвид представлява почти бяла перорална суспензия с мириз и вкус на мента.

Гавискон Мента Ликвид се предлагат в бутилки от 100, 150, 200, 250, 300, 500 или 600 ml.

Не всички опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L.

48 Iancu de Hunedoara Boulevard, Building Crystal Tower
11th Floor, District 1, Bucharest, Румъния

Производител

RB NL Brands B.V.
Schiphol Boulevard 207



1118 BH Schiphol,
Нидерландия

Този лекарствен продукт е разрешен в страните членки на ЕЕА под следните имена:

Великобритания	Gaviscon Cool Mint Liquid
България	Гавискон Мента Ликвид
Австрия	Gaviscon Liquid Mint Suspension zum Einnehmen
Дания	Galieve Cool Mint
Финландия	Galieve Mint oraalisuspensio
Германия	Gaviscon Liquid Mint 500 mg / 267 mg / 160 mg Suspension zum Einnehmen
Унгария	Gaviscon menta ízű belsőleges szuszpenzió
Исландия	Galieve Cool Mint, mixtúra, dreifa
Норвегия	Galieve mikstur, suspensjon, med peppermyntesmak
Полша	Gaviscon o smaku mięty
Румъния	GAVISCON MENTOL suspensie orală
Словения	Gaviscon z okusom mentola 50,0 mg/26,7 mg/16,0 mg v 1 ml peroralna suspenzija
Швеция	Galieve Mint oral suspension
Словакия	Gaviscon Cool Mint Perorálna suspenzia

Дата на последно преразглеждана листовката: юни, 2024

