

Листовка: информация за потребителя

Инфлуцид таблетки
Influcid tablets

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. №	20040331
Разрешение №	BG/MA/MP - 67571 / 21-01-2025
Одобрение №	/

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Инфлуцид и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Инфлуцид
3. Как да приемате Инфлуцид
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Инфлуцид
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Инфлуцид и за какво се използва

Инфлуцид е хомеопатично лекарство за лечение на простудни и грипозодобни заболявания, съпроводени с повишена температура.

Инфлуцид е комбинация от шест добре доказани отделни хомеопатични средства, която е особено подходяща за лечение на простудни и грипни заболявания с внезапно начало и бързо развитие. *Aconitum* (Аконитум) е полезен в началните фази на остри инфекции на респираторния тракт, особено когато са придружени с температура. За ефикасното повлияване на общата настинка помага и компонентът *Bryonia* (Бриония), който има ефект при сухите бронхити с болезнена, дразнеща кашлица. *Ipecacuanha* (Ипекакуана) предизвиква втечняването на бронхиалните секрети и по този начин подпомага изхвърлянето им. *Gelsemium* (Гелземиум) е особено ефикасен при настинки, грип, синусити, придружени с отраднаост и умора, главоболие и болки в тялото, както и при възпалено гърло и пресипналост. *Phosphorus* (Фосфорус) има положителен ефект върху състоянието на изтощение, невралгия и главоболие по време на остри и хронични респираторни заболявания. Освен това той засилва имунната система и по този начин ускорява оздравителния процес. Тази комбинация е допълнена с *Eupatorium perfoliatum* (Еупаториум перфолиатум) – често използвано в хомеопатията единствено за лечение на настинка и грип.



Благодарение на широкия си спектър на действие, Инфлуцид има бързо и ефикасно въздействие при настинки с температура, като грип. Инфлуцид е подходящ и за профилактика на вирусни инфекции.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Инфлуцид?

Не приемайте Инфлуцид

- ако сте алергичен към *Еупаториум перфолиатум*, към други растения от семейство Сложноцветни, към някои от активните или помощните вещества на продукта (изброени в точка 6)

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Инфлуцид.

Посъветвайте се с Вашия лекар

- ако не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши
- ако възникнат допълнителни оплаквания
- ако температурата Ви не спада или се повиши над 39°C

Деца

Инфлуцид не трябва да се прилага при деца под една година, поради липсата на достатъчно данни за употребата на продукта в тази възраст.

Други лекарства и Инфлуцид

Не са наблюдавани взаимодействия с други лекарства. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или може да приемате други лекарства.

Инфлуцид с храна, напитки и алкохол

Действието на хомеопатичните лекарствени продукти може да бъде неблагоприятно повлияно от вредни фактори на житейските навици, както и от стимуланти, алкохол и тютюн.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Инфлуцид няма влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Инфлуцид съдържа лактоза (млечна захар) и пшенично нишесте

Ако Ви е казано от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с Вашия лекар преди да приемате този продукт.

Това лекарство е подходящо за хора с цъолиакия. Пациенти с алергия към цъолиакия (различна от цъолиакия) не трябва да приемат този продукт.



3. Как да приемате Инфлуцид?

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възрастни и деца от 12 годишна възраст: при остри състояния приемат по 1 таблетка на всеки 2 часа, докато настъпи подобрение. Максималната дневна доза е 6 таблетки. За по-нататъшно лечение се приемат по 1-3 таблетки дневно.

За профилактика на инфекции се приема по 1 таблетка 3 пъти дневно.

Употреба при деца

Деца на 1 година: приемат по ½ таблетка 2 пъти дневно. Максималната дневна доза е 1 таблетка.

Деца на 2 години: приемат ½ таблетка 3 пъти дневно. Максималната дневна доза е 1,5 таблетки.

Деца на от 3 до 4 години: приемат по ½ таблетка на всеки 4 часа. Максималната дневна доза е 2 таблетки.

Деца на 5 години: приемат по ½ таблетка на всеки 3 часа. Максималната дневна доза е 2,5 таблетки.

Деца от 6 до 11 години: приемат по ½ таблетка на всеки 2 часа. Максималната дневна доза е 3 таблетки.

За профилактика на инфекции деца на възраст от 6 до 11 години: приемат по 1 таблетка 2 пъти дневно. Инфлуцид не трябва да се използва за профилактика на инфекции при деца под 6 години.

Начин на приложение

Таблетките трябва да се оставят да се разтопят бавно в устата. За малки деца е възможно таблетките да се разтварят в малко вода.

Не трябва да приемате това лекарство заедно с храна и напитки. Необходимо е да има интервал от поне половин час.

Ако сте приели повече от необходимата доза Инфлуцид

Не се очакват вредни ефекти в случай на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете Инфлуцид

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте спрели приема на Инфлуцид

Не се очакват вредни ефекти.

Ако имате някакви други въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В много редки случаи е възможна проява на свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта като кожен обрив или стомашно-чревни оплаквания.

Забележка: Съществуващите оплаквания могат временно да се влошат, когато се приемат хомеопатични лекарства (начално хомеопатично влошаване). В тези случаи спрете приема на Инфлуцид и се консултирайте с Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Инфлуцид

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате.

Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Инфлуцид

- Активните вещества са: Аконитум (*Aconitum*) trit. D3 25 mg, Гелземниум (*Gelsemium*) trit. D3 25 mg, Ипекакуана (*Ipecacuanha*) trit. D3 25 mg, Фосфорус (*Phosphorus*) 25 mg, Бриония (*Bryonia*) trit. D2 25 mg, Еупаториум перфолиатум (*Eupatorium perfoliatum*) trit. D1 25 mg в 1 таблетка (250 mg).



- Другите съставки са: Лактоза монохидрат, магнезиев стеарат, пшенично нишесте

Как изглежда Инфлуцид и какво съдържа опаковката

Бяла до почти бяла, плоска таблетка със скосени ръбове и делителна черта, понякога с мозаична структура.

20 таблетки в блистер. Опаковка, съдържаща 2 блистера в картонена кутия.

20 таблетки в блистер. Опаковка, съдържаща 3 блистера в картонена кутия.

20 таблетки в блистер. Опаковка, съдържаща 5 блистера в картонена кутия.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба:

Alpen Pharma GmbH

Steinenfeld 3

77736 Zell am Harmersbach

Германия

Производител:

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostraße 24

76227 Karlsruhe

Германия

или

Dr. Gustav Klein GmbH

Im Steinenfeld 3

77736 Zell am Harmersbach

Германия

За допълнителна информация за това лекарство, моля обърнете се към локалния представител на Притежателя на разрешението за употреба:

Алпен Фарма ООД

България

Дата на последно преразглеждане на листовката

Ноември 2024

