

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Индолен SR 1,5 mg таблетки с удължено освобождаване
Indolen SR 1,5 mg prolonged-release tablets

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Кратка характеристика на продукта Приложение 1	
Към Рег. №	20110357
Разрешение №	67917
BG/MA/MP -	, 19-02-2025
Одобрение №	/

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа 1,5 mg индапамид (*indapamide*).

Помощно вещество с известно действие: всяка таблетка съдържа 144,22 mg лактоза монохидрат.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетка с удължено освобождаване.

Бели до почти бели, кръгли, двойноизпъкнали филмирани таблетки с удължено освобождаване.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Есенциална хипертония.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Една таблетка на 24 часа, за предпочтение сутрин, да се приема цяла, без да се сдъвква. При по-големи дози антихипертензивният ефект на индапамида не се усилва, но се увеличава екскрецията на солта (повишава се салуретичният ефект).

Пациенти с бъбречна недостатъчност (вж. точка 4.3 и 4.4)

При тежка бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс <30 ml/min), лечението с индапамид е противопоказано.

Тиазидните диуретици и техните аналоги са напълно ефективни само когато бъбречните функции са нормални или минимално увредени.

Пациенти в старческа възраст (вж. точка 4.4.)

При пациенти в старческа възраст, нивото на плазмен креатинин трябва да бъде регулирано в съответствие с годините, теглото и пола. Пациенти в старческа възраст могат да бъдат лекувани с индапамид само, ако бъбречните функции са нормални или минимално увредени.

Пациенти с чернодробни проблеми (вж. точка 4.3 и 4.4)

При тежко увредена чернодробна функция, лечението е противопоказано.

Педиатрична популация

Индапамид не се препоръчва при деца и юноши, поради липсата на достатъчно дани за ефикасността и безопасността.



Начин на приложение

Перорално приложение.

Таблетката трябва да се приема цяла, без да се сдъвква и с достатъчно количество течност (например чаша вода).

4.3 Противопоказания

- свръхчувствителност към индаламид, други сулфонамиди или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1;
- тежка бъбречна недостатъчност;
- чернодробна енцефалопатия или тежко увредена чернодробна функция;
- хипокалиемия.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Специални предупреждения

При увредена чернодробна функция, тиазидните диуретици могат да причинят чернодробна енцефалопатия, особено в случай на електролитен дисбаланс. В такива случаи, приемането на диуретика трябва да бъде незабавно прекратено.

Фоточувствителност

Докладвани са случаи на реакции на фоточувствителност при употреба на тиазиди и тиазидни диуретици (вж. точка 4.8). При появата на реакции на фоточувствителност по време на лечението, е препоръчително то да бъде преустановено. Ако е необходимо подновяване на приема на индаламид, се препоръчва откритите части от кожата да се предпазват от слънчева светлина или от изкуствена UVA светлина.

Хороидален излив, остра миопия и вторична закритоъгълна глаукома

Сулфонамидите или лекарствата, производни на сулфонамидите, могат да предизвикат идиосинкратична реакция, водеща до хороидален излив с дефект на зрителното поле, преходна миопия и остра закритоъгълна глаукома. Симптомите включват в началото остро понижение на зрителна острота или очна болка и обикновено се проявяват в рамките на часове до седмици след започване на лечението. Нелекуваната остра закритоъгълна глаукома може да доведе до трайна загуба на зрение. Първичното лечение включва прекратяване приема на лекарството възможно най-скоро. Може да се наложи и да се обмисли навременно лечение или хирургична интервенция, ако въtreочното налягане остане неконтролирано. Рисковите фактори за развитие на остра закритоъгълна глаукома могат да включват анамнеза за алергия към сулфонамиди или пеницилин.

Помощни вещества

Този лекарствен продукт съдържа лактоза монохидрат. Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост, Lapp-лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.

Специални предпазни мерки при употреба

- Водно-електролитен баланс
- Плазмен натрий

Нивото на плазмен натрий трябва да бъде измерено преди започване на лечението, както и на равни интервали след това. Всяко диуретично лечение би могло да доведе до хипонатриемия, понякога с много сериозни последствия. Хипонатриемия с хиповолемия може да доведе до дехидратация и ортостатична хипотония. Едновременната загуба на хлорни иони може да доведе до вторична компенсаторна метаболитна алкалоза: степента и честотата на този ефект са незначителни. Понижението на плазмен натрий първоначално може да е асимптоматично, затова следенето на нивото му е особено важно и трябва да бъде по-често при пациенти и пациенти, страдащи от цирози (вж. точка 4.8 и 4.9).



- **Плазмен калий**

Загубата на калий с хипокалиемия е главният рисък при тиазидните диуретици и техните аналоги. Хипокалиемията може да предизвика мускулни нарушения. Съобщени са случаи на рабдомиолиза, особено в контекста на тежка хипокалиемия. Рискът от настъпване на хипокалиемия ($<3,4 \text{ mmol/l}$) трябва да бъде избегнат при някои високорискови групи пациенти, например хора в старческа възраст, недохранени и/или приемащи много лекарства, пациентите с цироза, които имат едем или асцит, пациенти с коронарна болест и сърдечна недостатъчност. В тези случаи хипокалиемията води до увеличаване на сърдечната токсичност на дигитализовите препарати и риска от аритмии.

Съществува рисък и за хора с удължен QT-интервал, независимо дали той е вроден или ятрогенен. Ето защо, хипокалиемията, както и брадикардията, са предразполагащи фактори за появата на тежки аритмии, в частност потенциално фаталните *torsades de pointes*.

По-често измерване на нивото на плазмен калий е наложително при всеки един от гореописаните случаи. Първото такова измерване трябва да бъде направено една седмица след започване на лечението. Установяването на хипокалиемия изисква корекции. Хипокалиемия, установена заедно с ниска серумна концентрация на магнезий, може да не се повлияе от лечението, освен ако серумният магнезий не бъде коригиран.

- **Плазмен магнезий**

Доказано е, че тиазидите и техните аналоги, включително индапамид, повишават екскрецията на магнезий с урината, което може да доведе до хипомагнезиемия (вж. точки 4.5 и 4.8).

- **Плазмен калций**

Тиазидните диуретици и техните аналоги могат да намалят отделянето на калций с урината и да причинят леко и преходно повишаване на нивото на плазмен калций. Откритата хиперкалциемия може да се дължи на предхождащ недиагностициран хиперпаратироидизъм. Лечението трябва да бъде преустановено преди изследването на паратиреоидната функция.

- **Глюкоза в кръвта**

Следенето на нивото на глюкозата в кръвта е необходимо при пациенти, страдащи от диабет, особено при наличието на хипокалиемия.

- **Пикочна киселина**

При хиперурикемични пациенти, предразположението към пристъпи на подагра може да се увеличи.

- **Бъбречна функция и диуретици**

Тиазидните диуретици и техните аналоги са напълно ефективни само когато бъбречната функция е нормална или минимално нарушена (плазмен креатинин под 25 mg/l , т.е. $220 \mu\text{mol/l}$ при възрастни). При пациентите в старческа възраст, нивото на плазмен креатинин трябва да бъде регулирано в съответствие с годините, теглото и пола им.

Вторичната хиповолемия в резултат от загубата на вода и натрий, причинени от диуретика в началото на лечението, намалява гломерулната филтрация. Това може да доведе до повишаване на кръвната урея и плазмения креатинин. Тази преходна функционална бъбречна недостатъчност е без последствия при пациенти с нормална бъбречна функция, но може да влоши съществуваща бъбречна недостатъчност.

- **Спортсти**

На спортстите следва да се обърне внимание, че лекарството съдържа активна съставка, която може да даде позитивна реакция при тест за допинг.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Непропоръчителни комбинации

Литий



Повищено ниво на плазмен литий с признания на предозиране, както при безсолна диета (намалено отделяне на литий с урината). В случай, че употребата на диуретици е наложителна, е необходимо внимателно следене на нивото на литий и съответна промяна на дозата.

Комбинации, които изискват предпазни мерки при употреба

Лекарства, причиняващи torsades de pointes

- клас Ia антиаритмични лекарства (хинидин, хидрохинидин, дизопирамид);
- клас III антиаритмични лекарства (амиодарон, сotalол, дофетилид, ибутилид, бретилиум);
- някои антипсихотици: фенотиазини (хлорпромазин, циамемазин, левомепромазин, тиоридазин, трифлуоперазин),ベンзамиди (амисулприд, сулпирид, султоприд, тиаприд), бутирофенони (дроперидол, халоперидол);
- други антипсихотици (напр. пимозид);
- други вещества: бепридил, цизаприд, дифеманил, еритромицин IV, халофантрин, мизоластин, пентамидин, спарфлоксацин, моксифлоксацин, винкамин IV, метадон, астемизол, терфенадин.

Повишен рисък от вентрикуларни аритмии, особено *torsades de pointes* (хипокалиемията е рисков фактор). Да се следи за хипокалиемия и при необходимост да се регулира преди започване на лечение с тази комбинация. Може да са необходими клинични изследвания, електрокардиограми и определяне на плазмените електролити.

Да се използват вещества, които нямат недостатъка да предизвикват *torsades de pointes* при наличието на хипокалиемия.

Нестероидни противовъзпалителни средства (системно приложение), включително селективни COX-2 инхибитори, високи дози салицилова киселина (≥ 3 g дневно)

Възможно намаляване на антихипертензивния ефект на индапамида. Риск от тежка бъбречна недостатъчност при дехидратирани пациенти (намалена гломерулна филтрация). Да се хидратира пациентът и да се наблюдава бъбречната функция в началото на лечението.

Инхибитори на ангиотензин-конвертирация ензим (ACE-инхибитори)

Риск от внезапна хипотония и/или тежка бъбречна недостатъчност при започване на лечението с ACE-инхибитори, при наличието на съществуваща загуба на натрий (особено при пациенти със стеноза на бъбречната артерия).

При хипертония, когато предишно лечение с диуретици може да е причинило загуба на натрий, е необходимо:

- да се преустанови приемането на диуретика 3 дни преди започване на лечението с ACE-инхибитора и ако е необходимо, да се започне отново приемането на хипокалиемичен диуретик или
- да се започне с ниски начални дози ACE-инхибитор, които постепенно се увеличават.

При конгестивна сърдечна недостатъчност, лечението трябва да се започне с много ниска доза ACE-инхибитор, по възможност след съответно намаляване на дозата на съпътстващия хипокалиемичен диуретик.

Във всички случаи трябва да се следи бъбречната функция (нивото на плазмен креатинин) през първите няколко седмици от употребата на ACE-инхибитор.

Други съединения, предизвикващи хипокалиемия: амфотерицин B (IV), глюко- и минералкортикоиди (системни), тетракозактид, стимулиращи лаксативи:

Увеличен рисък от хипокалиемия (адитивен ефект). Да се следи нивото на плазмен калций и да се коригира, ако е необходимо. Трябва да се има предвид при съпътстващо лечение с дигиталис. Да се употребяват нестимулиращи лаксативи.

Баклофен



Повишава антихипертензивния ефект. Да се хидратира пациентът и да се следи бъбречната функция при започване на лечението.

Дигиталисови препарати

Хипокалиемията и/или хипомагнезиемията предразполагат към токсичните ефекти на дигиталиса. Да се следи нивото на плазмен калий, магнезий и електрокардиограмите и при необходимост да се промени лечението.

Алопуринол

Едновременното лечение с индапамид може да увеличи случаите на реакции на свръхчувствителност към алопуринол.

Комбинации, които трябва да се вземат под внимание

Калий-съхраняващи диуретици (амилорид, спиронолактон, триамтерен)

Въпреки че такива комбинации биха могли да са от полза при някои пациенти, има рисък от хипокалиемия или хиперкалиемия, особено при пациенти с бъбречна недостатъчност или диабет. Нивото на плазмен калий и електрокардиограмите трябва да се следят и ако е необходимо, лечението да се преразгледа.

Метформин

Увеличен рисък от лактацидоза, причинена от метформина, поради потенциална функционална бъбречна недостатъчност, свързана с приемането на диуретици, особено бримкови диуретици. Да не се използва метформин, когато нивото на плазмен креатинин надвишава 15 mg/l (135 µmol/l) при мъже и 12 mg/l (110 µmol/l) при жени.

Йод-контрастни вещества

В случай на дехидратация, причинена от диуретици, съществува увеличен рисък от тежка бъбречна недостатъчност, особено при прием на високи дози йод-контрастни вещества. Необходима е рехидратация преди приемане на йодирани вещества.

Имипрамин-подобни антидепресанти (трициклични), невролептици

Антихипертензивният ефект и рисъкът от ортостатична хипотензия се увеличават (адитивен ефект).

Калций (калциеви соли)

Рисъкът от хиперкалциемия се увеличава поради намалено отделяне на калций в урината.

*Циклоспорин, таクロлиму*s

Риск от повишен плазмен креатинин без промени в нивото на циркулиращ циклоспорин, дори когато няма спад във водните/натриевите нива.

Кортикостероиди, тетракозактид (системен прием)


Понижаване на антихипертензивния ефект (задържане на вода/натрий поради употребата на кортикостероиди).

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Има ограничени данни (за изхода, при по-малко от 300 случая на бременност) за употребата на индапамид при бременни жени. Продължителната експозиция на тиазиди през третия триместър от бременността може да намали обема на плазмата в майчиния организъм, което може да причини и фетоплацентарна исхемия и забавяне в растежа.

Проучванията при животни не показват преки или непреки вредни ефекти, свързани с репродуктивната токсичност (вж. точка 5.3).



Като предпазна мярка е за предпочитане да се избягва употребата на индапамид по време на бременност.

Кърмене

Има недостатъчна информация за екскрецията на индапамид/метаболитите в кърмата. Индапамид е тясно свързан с тиазидните диуретици, които по време на кърменето се асоциират с намаляване или дори с преустановяване на кърменето. Могат да се появят свръхчувствителност към сулфонамид производните и хипокалиемия.

Не може да се изключи риск за новородените/кърмачетата.

Индапамид не трябва да се използва по време на кърмене.

Фертилитет

Проучванията за репродуктивна токсичност не показват ефект върху фертилитета при мъжки и женски плъхове (вж. точка 5.3). Не се очакват ефекти върху фертилитета при хора.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Индапамид не променя бдителността, но в отделни случаи, по-специално при започване на лечението или когато се прибави друг антихипертензивен лекарствен продукт, може да се очакват реакции, свързани с намаляване на кръвното налягане. В резултат на това, способността за управление на превозни средства или за опериране с машини може да бъде нарушена.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Обобщен профил на безопасност

Най-често съобщаваните нежелани реакции са хипокалиемия, реакции на свръхчувствителност, главно дерматологични, при лица, предразположени към алергични и астматични реакции и макулопапуларни обриви.

Тиазидните диуретици и техните аналоги, включително индапамид, могат да предизвикат следните нежелани лекарствени реакции, определяни според честотата на тяхната појава като: много чести ($\geq 1/10$); чести ($\geq 1/100$ до $< 1/10$); нечести ($\geq 1/1000$ до $< 1/100$); редки ($\geq 1/10\ 000$ до $< 1/1000$); много редки ($< 1/10\ 000$); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Нарушения на кръвта и лимфната система

Много редки: тромбоцитопения, левкопения, агранулоцитоза, апластична анемия, хемолитична анемия

Нарушения на метаболизма и храненето

Чести: хипокалиемия (вж. точка 4.4)

Нечести: хипонатриемия (вж. точка 4.4)

Редки: хипохлориемия; хипомагнезиемия

Много редки: хиперкалциемия

Нарушения на нервната система

Редки: световъртеж, умора, главоболие, парестезия

С неизвестна честота: синкоп

Нарушения на очите

С неизвестна честота: късогледство, замъглено виждане, нарушение на зрението, хистра, закритоъгълна глаукома, хорOIDален излив



Сърдечни нарушения

Много редки: аритмия

С неизвестна честота: Torsade de pointes (потенциално фатални) (вж. точки 4.4 и 4.5)

Съдови нарушения

Много редки: хипотония

Стомашно-чревни нарушения

Нечести: повръщане

Редки: гадене, запек, сухота в устата

Много редки: панкреатит

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Много редки: бъбречна недостатъчност

Хепатобилиарни нарушения

Много редки: нарушения на чернодробната функция

С неизвестна честота: възможна чернодробна енцефалопатия в случай на чернодробна недостатъчност (вж. точка 4.3 и 4.4); хепатит

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Чести: макулопапуларни обриви; реакции на свръхчувствителност, предимно дерматологични, при пациенти, предразположени към алергични и астматични реакции

Нечести: пурпura

Много редки: ангиоедем, уртикария, токсична епидермична некролиза, синдром на Стивънс-Джонсън

С неизвестна честота: възможно влошаване на предварително съществуващ оствър дисеминиран лупус еритематозус; реакции на фоточувствителност (вж. точка 4.4)

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

С неизвестна честота: мускулни спазми, мускулна слабост, миалгия, рабдомиолиза

Нарушения на репродуктивната система и гърдата

Нечести: еректилна дисфункция

Изследвания

С неизвестна честота: ЕКГ удължен QT интервал (вж. точка 4.4 и 4.5); повишени нива на кръвна захар; повишени нива на пикочна киселина в кръвта; повишени нива на чернодробните ензими

Описание на избраните нежелани реакции

По време на проучванията фаза II и III, сравняващи индапамид 1,5mg с 2,5mg, анализите на плазмения калий са показвали дозозависим ефект от индапамид:

- индапамид 1,5mg: плазмен калий <3,4 mmol/l е наблюдаван при 10% от пациентите и <3,2 mmol/l при 4% от пациентите след 4 до 6 седмици лечение. След 12 седмично лечение, средното понижение на плазмения калий е било 0,23 mmol/l.

- индапамид 2,5mg: плазмен калий <3,4 mmol/l е наблюдаван при 25% от пациентите и <3,2 mmol/l при 10% от пациентите след 4 до 6 седмици лечение. След 12 седмично лечение, средното понижение на плазмения калий е било 0,41 mmol/l.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствен продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полз/ риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез Изпълнителна агенция по лекарства, ул. „Дамян Рачински“ № 8, 1303 София, тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg.



4.9 Предозиране

Симптоми

Установено е, че индапамид в дози до 40 mg, тоест 27 пъти повече от терапевтичната доза, не е токсичен. Основният признак на остро отравяне е под формата на смущения във водно-електролитния баланс (хипонатриемия, хипокалиемия). Клинично е възможна поява на гадене, повръщане, хипотензия, крампи, световъртеж, замаяност, сънливост, обърканост, полиурия или олигурия, понякога до степен на анурия (поради хиповолемия).

Лечение

Първоначалните мерки включват бързото елиминиране на приетото вещество(а) чрез стомашни промивки и/или приемането на активен въглен, последвано от възстановяване на водно-електролитния баланс до нормални стойности в специализирано заведение.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Диуретици, сулфонамиди, самостоятелно
ATC код: C03BA11

Механизъм на действие

Индапамид е сулфонамидно производно с индолов пръстен, фармакологично свързан с тиазидните диуретици, който действа чрез потискане на реабсорбцията на натрий в проксималната част на дисталния тубул. Той увеличава отделянето на натрий и хлориди с урината и в по-малка степен на калий и магнезий, като по този начин увеличава количеството отделена урина и осъществява антихипертензивно действие.

Проучвания във фази II и III показват антихипертензивен ефект с продължителност 24 часа при монотерапия. Той се е проявил при дози, имащи слаб диуретичен ефект.

Антихипертензивното действие на индапамид е свързано с подобрене на артериалния комплайънс и намаляване на артериоларната и периферната резистентност.

Индапамид намалява хипертрофията на лявата камера.

Терапевтичният ефект на тиазидните диуретици и техните аналоги се запазва постоянен след определена доза, докато страничните ефекти продължават да нарастват. Ето защо, дозата не бива да бъде увеличавана, ако лечението няма ефект.

Доказано е също, че продължителното, средно-срочното и краткосрочното приложение на индапамид при пациенти с хипертония:

- не повлиява липидния метаболизъм: триглицериди, LDL-холестерол и HDL-холестерол;
- не повлиява въглехидратния метаболизъм, дори при пациенти с диабет и хипертония.

5.2 Фармакокинетични свойства

Индолен SR се предлага в дози за удължено освобождаване, базирано на матрична система, при която активното вещество се намира в носител, позволяващ постепенното освобождаване на индапамида.

Абсорбция

Количеството освободен индапамид се абсорбира бързо и напълно през стомашно-чревния тракт. Консумацията на храна леко увеличава скоростта на абсорбция, но не влияе на количеството на абсорбираното вещество. Пиковото ниво в серума след еднократна доза се



наблюдава около 12 часа след приемане, повторното приемане намалява разликите в нивата на серумната концентрация между двете дози. Съществуват индивидуални разлики.

Разпределение

Свързването на индапамид с плазмените протеини е 79%. Полуживотът в плазмата е между 14 и 24 часа (средно 18 часа). Равновесната концентрация се постига след около 7 дни. Повторното приемане не води до натрупване в организма.

Елиминиране

Елиминирането става главно с урината (70% от дозата) и фекалиите (22%) под формата на неактивни метаболити.

Високорискови пациенти

Фармакокинетичните параметри остават непроменени при пациенти с бъбречна недостатъчност.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Най-високите дози, приети перорално от различни животински видове (от 40 до 8000 пъти терапевтичната доза), показват засилване на диуретичните свойства на индапамида. Основните симптоми на отравяне, наблюдавани при проучвания на острата токсичност на приложен интравенозно или интраперitoneално индапамид, са свързани с фармакологичното действие на веществото, тоест брадипнея и периферна вазодилатация.

Индапамид е показал отрицателни резултати при тестове за мутагенност и карциногенност. Проучвания за репродуктивна токсичност не са показвали ембриотоксичност и тератогенност. Фертилитетът при мъжки и женски плъхове не е бил нарушен.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Ядро:

лактозаmonoхидрат
царевично нишесте,прежелатинизирано
хипромелоза
силициевдиоксид,колоиден,безводен
магнезиевстеарат

Обвивка:

хипромелоза
макрогол6000
титановдиоксид(E171)

6.2 Несъвместимости

Неприложимо.

6.3 Срок на годност

3 години

6.4 Специални условия на съхранение

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

6.5 Вид и съдържание на опаковката



PVC/Al блистери

Опаковка от 30 таблетки (3 блистера по 10 таблетки).

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Няма специални изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

ЕКОФАРМ ГРУП АД
ул. Атанас Дуков №29, ет. 3,
1407 София, България
тел.: (02) 906 90 70
факс: (02) 906 90 71

8. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Рег. № 20110354

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 03 юни 2011 г.

Дата на последно подновяване: 09 март 2016 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

