

Листовка: информация за потребител

ДОПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА

Листовка - Приложение 2

Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор

Към Ред. № 2013.01.77

Машерка, течен екстракт от стръкове (1:2-3)/ Течен екстракт (1:3-4) съставен от: Исландски  
лишай, корени Лечебно сапуниче, корени Голяма бедреница, листа Евкалпий, плодове Редеи  
(1:1:1:1:1) и 1 част плодове на Звездовиден анасон.

Разрешение № 867/14.07.2013-5332

Одобрение № 05-11-2018

Cefabronchin 50g/21g/100g oral drops, solution

Thymi herba extractum fluidum (1:2-3)/ Extractum fluidum compositum (1:3-4):

Cetraria islandica, Saponariae rubrae radix, Pimpinellae radix, Eucalypti folium, Foeniculi amari fructus  
(1:1:1:1:1) et 1 pars Anisi stellati fructus.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор
3. Как да приемате Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

#### 1. Какво представлява Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор и за какво се използва

Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор е растителен лекарствен продукт с отхрачващо и бронхолитично действие.

Традиционно се използва за улесняване втечняването на секрета в дихателните пътища и облекчаване дразненето в гърлото, причинени от простуда.

Забележка: Тази информация се основава единствено на традиция и на дългогодишен опит.

#### 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор

##### Не приемайте Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор

- ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- при възпаления на стомашно-чревния тракт, тежки чернодробни заболявания, алкохолизъм.
- при деца под 4 годишна възраст.



## **Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор.

Поради алкохолното съдържание, Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор, трябва да се приема от хора, страдащи от чернодробни заболявания и алкохолици само след консултация с лекар.

## **Деца**

Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор не трябва да се използва при деца под 4 годишна възраст.

## **Други лекарства и Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор**

Не са известни взаимодействия с други лекарствени продукти.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

## **Бременност, кърмене и фертилитет**

Поради липса на достатъчно данни, Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор, не трябва да се приема по време на бременност и кърмене.

Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

## **Шофиране и работа с машини**

Не са необходими специални предпазни мерки.

## **Цефабронхин разтвор съдържа 28 об.% алкохол.**

Този лекарствен продукт съдържа глюкоза и фруктоза. Ако Вашият лекар Ви е информирал, че имате непоносимост към някои видове захари, свържете с него, преди да приемете това лекарство.

## **3. Как да приемате Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор**

Винаги приемайте Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор точно, както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

- за възрастни: на всеки 2 часа по 20 капки, до 6 пъти дневно
- За деца над 4 годишна възраст: на всеки 2 часа по 10 капки, до 6 пъти дневно.

## **Начин на прилагане:**

Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор, може да се приема неразреден или разреден с малко течност (напр. с вода).

## **Продължителност на употреба:**

Продължителността на лечението се определя от протичането на заболяването.

Моля да информирате Вашият лекар или фармацевт, ако след 7 дни симптомите продължават или състоянието Ви се влоши.

**Ако сте приели повече от необходимата доза Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор**

Няма данни за интоксиация при прием на големи количества Цефабронхин. Затова в такъв случай не се налага предприемането на специални мерки. Възможно е да се усилят някои от нежеланите реакции.

**Ако сте пропуснали да приемете Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза, но продължете приема, както е описано в тази листовка или както е предписано от Вашия лекар.

**Ако сте спрели приема на Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор**



Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте вашия лекар или фармацевт.

#### 4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В много редки случаи могат да се появят алергични реакции, гадене, стомашно-чревни нарушения, повръщане и диария. В редки случаи калиевият хидрогенсулфит може да причини остри реакции на свръхчувствителност и бронхоспазъм. До момента не са наблюдавани тези нежелани лекарствени реакции при приложение на Цефабронхин.

Ако забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

#### Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

Уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### 5. Как да съхранявате Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката и картонената опаковка след „Годен до:“.

Срокът на годност след първото отваряне на бутилката е 3 месеца при температура под 25°C.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

#### 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

##### Какво съдържа Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор

- Активните вещества са:

100 g перорални капки, разтвор, съдържат:

Машерка, течен екстракт от стръкове (1:2-3) – 50 g

Екстрагент: Амоняк 10%, Глицерол 85%, Етанол 90% и пречистена вода (1:20:70:109)

Течен екстракт (1:3-4) – 21 g съставен от: Исландски лишай, корени Лечебно сапуниче, корени Голяма бедреница, листа Евкалипт, плодове Резене (1:1:1:1:1) и 1 част плодове на Звездовиден анасон.

Другите съставки са: етанол: 30 % v/v, винен ликьор (съставен от глюкоза, фруктоза, калиев хидрогенсулфит).

1 g съответства на 36 капки.

Как изглежда Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор и опаковката

Цефабронхин 50g/21g/100g перорални капки, разтвор е в тъмни стъклени бутилки

50 ml и 100 ml с бяла капачка на винт от HDPE и прозрачен апликатор-капкометър от HDPE.

Опаковки с надпис „Мостри не за продажба“ със съдържание 20 ml и 50 ml.



**Притежател на разрешението за употреба и производител**  
Cefak KG  
Ostbahnhofstr.15  
D-87437 Kempten, Германия

**Дата на последно преразглеждане на листовката**  
10/2018

