

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Кум Рег. №	20100580
Разрешение №	-68132 12-03-2025
BG/MA/MP	
Одобряване №	

Листовка: информация за потребителя

**Септофорт 2 mg пресовани таблетки за смучене
Septofort 2 mg compressed lozenges**

Хлорхексидинов диглюконат
(Chlorhexidine digluconate)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашият лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Септофорт 2 mg пресовани таблетки за смучене и за какво се използва
2. Преди да приемете Септофорт 2 mg пресовани таблетки за смучене
3. Как да приемате Септофорт 2 mg пресовани таблетки за смучене
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Септофорт 2 mg пресовани таблетки за смучене
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Септофорт 2 mg пресовани таблетки за смучене и за какво се използва

Септофорт 2 mg пресовани таблетки за смучене се използва за локално лечение при възпалени венци, инфекции на устната кухина: афти, гъбични инфекции, възпаление на устната кухина вследствие на стоматологични манипулации, възпаление на езика, назофаринкса и сливиците, за поддържане на хигиена на устната кухина след тонзилоектомия (изваждане на сливиците) и вадене на зъб. Използва се и като допълнително лечение при болезнени разязвявания на лигавицата на устната кухина, които могат да са резултат от множество фактори. Неговото антибактериално действие продължава 8-12 часа.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Септофорт 2 mg пресовани таблетки за смучене

Не приемайте Септофорт 2 mg пресовани таблетки за смучене:

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към хлорхексидин или към някоя от останалите съставки на продукта (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Поради съдържание на сорбитол, продуктът не трябва да се използва от хора, които имат свръхчувствителност към фруктоза и хора, които страдат от фруктозо-1-дифосфатна недостатъчност. Поради съдържанието на аспартам, продуктът не трябва да се употребява от хора с фенилкетонурия.

Други лекарства и Септофорт 2 mg пресовани таблетки за смучене

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.



Трябва да има поне 30 минути между приема на Септофорт 2 mg пресовани таблетки за смучене и почистването на зъбите, тъй като това оказва влияние.

Септофорт 2 mg пресовани таблетки за смучене с храна и напитки

Не се хранете и не пийте течности в рамките на 1-2 часа след приема.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Този продукт не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Септофорт 2 mg пресовани таблетки за смучене

Винаги приемайте Септофорт 2 mg пресовани таблетки за смучене, точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възрастни: 1 таблетка 3 пъти дневно след хранене, докато се разтвори в устата, с интервал между отделните приеми от 2 часа.

Употреба при деца и юноши

Деца от 5-12 години: ½ до 1 таблетка два пъти дневно.

Деца над 12 години и юноши: 1 таблетка 3 пъти дневно.

Този продукт не се препоръчва за деца под 5 годишна възраст.

Таблетките могат да се прилагат при диабетици, тъй като съдържат сорбитол вместо захар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Септофорт 2 mg пресовани таблетки за смучене

Предозиране може да се появи след като погълнете по-голямо количество от активното вещество. В този случай се препоръчва прием на мляко, белтък и незабавно да се свържете с Вашия лекар, или да посетите спешното отделение на най-близката болница.

Ако сте пропуснали да приемете Септофорт 2 mg пресовани таблетки за смучене

Продължете да приемате обичайната доза в обичайното време; няма значение, ако сте пропуснали една доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Трябва да информирате Вашия лекар, ако Вашите симптоми се влошат или не се подобряват след 3 дни.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции са изброени по-долу.



Зачервяване на кожата, алергични реакции, възпаление на лигавицата на устната кухина и жълтокафяво оцветяване на зъбите и езика (което може да се предотврати чрез редовно и активно почистване на зъбите, или прекратяване на лечението) могат да се появят рядко.

Временно нарушение на вкусовото усещане и парене по езика могат да се появят в началото на лечението. При пациенти, чувствителни към сорбитол може да се появи диария.

Прекратете приема на продукта незабавно или се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт, ако се появи някаква кожна алергична реакция (зачервяване или сърбеж, друга алергична реакция).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Септофорт 2 mg пресовани таблетки за смучене

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°C на сухо място.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Не използвайте това лекарство след изтичане на срока на годност, отбелязан върху кутията и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Септофорт 2 mg пресовани таблетки за смучене

- Активното вещество е хлорхексидинов диглюконат. Една таблетка за смучене съдържа 2 mg хлорхексидинов диглюконат.
- Другите съставки са: MF Mint Green P-WS (медни комплекси на хлорофил Е-141), магнезиев стеарат, аромат мента, аспартам, царевично нишесте, сорбитол.

Как изглежда Септофорт 2 mg пресовани таблетки за смучене и какво съдържа опаковката
Таблетките са бледозелени, плоски, кръгли, с ментов аромат и мек ментов вкус. Една картонена кутия съдържа 12 или 24 таблетки за смучене в PVC/PVDC//Al блистери заедно с листовка за пациента.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:

WALMARK, a.s.

Oldřichovice 44,

739 61 Třinec,

Чешка Република



Производител:
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката
01/2025

