

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Кат. Вещ. №	20020548
Разрешение №	67948
BG/MA/MP	21-02-2025

Листовка: информация за пациента

СОЛПАДЕИН 500 mg/8 mg/30 mg разтворими таблетки
 парацетамол/кодеин/кофеин
SOLPADEINE 500 mg/8 mg/30 mg soluble tablets
 paracetamol/codeine/caffeine

Прочетете внимателно цялата тази листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Солпадеин разтворими таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Солпадеин разтворими таблетки
3. Как да приемате Солпадеин разтворими таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Солпадеин разтворими таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Солпадеин капсули и за какво се използва

Солпадеин съдържа три активни съставки: парацетамол – аналгетик (успокоява болката) и антипиретик (понижава температурата), кодеин фосфат – аналгетик и кофеин, който засилва обезболяващото действие.

Кодеин може да се използва при деца над 12 години за краткосрочно облекчение на умерено изразена болка, която не се повлиява от други болкоуспокояващи средства като самостоятелно приеман парацетамол или ибупрофен.

Солпадеин се препоръчва за бързо облекчаване на умерено силна болка (ревматична болка, главоболие, мигрена, невралгия, зъбобол, възпалено гърло, болка при синусит и стоматологични интервенции, например екстракция на зъб, менструални и мускулни болки), за повлияване на високата температура и другите симптоми при простуда и грип.

Този продукт съдържа кодеин. Кодеин принадлежи към група лекарствени продукти, наричани опиоидни аналгетици, чистото действие е да облекчат болката. Може да се използва самостоятелно или в комбинация с други болкоуспокояващи средства, като парацетамол.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Солпадеин капсули

Съдържа парацетамол.

Не приемайте други лекарства, съдържащи парацетамол.



Не приемайте Солпадеин разтворими таблетки:

- Ако имате затруднения с дишането.
- Ако имате хронична констипация (запек).
- Ако сте алергични към парацетамол, кодеин и кофеин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (избросни в точка 6).
- За облекчаване на болка при деца и юноши (0-18-годишна възраст) след хирургична интервенция за отстраняване на сливици или аденоид, поради синдром на обструктивна сънна апнея.
- Ако знаете, че метаболизирате свръхбързо кодеин до морфин.
- Ако сте бременна или кърмите.


Предупреждения и предпазни мерки

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да вземете Солпадеин разтворими таблетки, ако:

- имате бъбречно или чернодробно заболяване;
- страдате от хипертрофия (уголемяване) на простатата;
- имате тежко възпаление или запушване на червата;
- сте бременна или кърмите;
- имате заболявания на дихателната система, протичащи със задух;
- имате ниско кръвно налягане (хипотония);
- имате намалена функция на щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм);
- имате нараняване на главата;
- имате повишено вътречерепно налягане;
- жлъчният Ви мехур е бил отстранен оперативно (холецистектомия);
- взимате лекарства, предписани Ви за депресия, или други лекарства, влияещи на централната нервна система, напр. седативни и сънотворни;
- взимате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повръщане), пробенецид (използван за лечение на подагра), хлорамфеникол (антибиотик, използван за лечение на инфекции) или холестирамин, прилаган за понижаване нивото на холестерола;
- взимате антикоагуланти – лекарства, използвани за разреждане на кръвта;
- взимате деконгестанти – лекарства, използвани за намаляване на отока на лигавицата на носа и синусите;
- сте на ниско солева диета, защото всяка таблетка съдържа 398 mg натрий (796 mg натрий за доза от две таблетки);
- страдате от вродена непоносимост към фруктоза, имате глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захарно/изомалтозен дефицит поради съдържанието на 50 mg сорбитол (E420) във всяка таблетка;
- ако сте зависими или някога сте имали зависимост към опиоиди, алкохол, лекарства, отпускани с рецепта, или забранени вещества.

Приемането на кодеин (активно вещество в това лекарство) редовно за дълъг период от време може да доведе до зависимост и неправилна употреба, което може да причини предозиране и/или смърт. Не приемайте това лекарство по-дълго, отколкото е необходимо. Не давайте това лекарство на други хора.

Кодеин се трансформира до морфин в черния дроб с помощта на ензим. Морфин е вещество, което води до облекчаване на болката. Някои хора притежават разновидност на този ензим, което може да повлияе по различен начин на различни хора. При някои не се произвежда морфин, или се произвежда в много малки количества, което не би осигурило достатъчно облекчаване на болката. При други е възможно да настъпят тежки нежелани лекарствени реакции, поради произвеждане на прекомерно голямо количество морфин. Ако знаете, че сте от някоя от следните нежелани лекарствени реакции, трябва да прекратите употребата на това



лекарство и да потърсите незабавно медицинска консултация: забавено или повърхностно дишане, объркване, сънливост, смаляване на зениците, чувство за гадене или гадене, запек, липса на апетит.

По време на лечение със Солпадеин разтворими таблетки уведомете незабавно Вашия лекар, ако:

Имате тежки заболявания, включително тежко бъбречно увреждане или сепсис (когато бактериите и токсините им циркулират в кръвта, което води до увреждане на органите), или ако страдате от недोхранване, хроничен алкохолизъм или ако приемате флуклоксацилин (антибиотик). Съобщава се за сериозно състояние, наречено метаболитна ацидоза (нарушение на кръвта и телесните течности), при пациенти в случаите, когато парацетамол се приема с постоянни дози за продължителен период от време или когато парацетамол се приема заедно с флуклоксацилин. Симптомите на метаболитна ацидоза могат да включват: сериозни затруднения при дишане с дълбоко учестено дишане, сънливост, гадене и повръщане.

Употреба при деца и юноши

Употреба при деца и юноши след операция:

Кодсин не трябва да се използва за облекчаване на болката при деца и юноши след отстраняване на техните сливици или аденоиди за лечение на обструктивна сънна апнея.

Употреба при деца с дихателни проблеми:

Кодсин не се препоръчва при деца с дихателни проблеми, тъй като симптомите на морфинова токсичност могат да се влошат при тези деца.

Бременност, кърмене и фертилитет

Комбинацията парацетамол/кодсин/кофсин не се препоръчва по време на бременност.

Наличните данни не показват, че парацетамол е противопоказан по време на кърмене.

Кофсин се излъчва в майчиното мляко и може да има стимулиращ ефект върху кърмачето, но токсични концентрации не са наблюдавани.

Кърмещите жени трябва да наблюдават бебето си по време на лечението за възможна поява на повишена сънливост, отпуснатост, затруднено сучене или дишане, намален тонус. При поява на подобни симптоми е необходимо веднага да се потърси лекарска помощ.

Не присмайте кодсин, докато кърмите. Кодсин и морфин преминават в майчиното мляко.

Шофиране и работа с машини

Солпадеин може да причини висене на свят. Ако почувствате замайване, не карайте кола и не работете с машини.

Други лекарства и парацетамол

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате:

- флуклоксацилин (антибиотик) поради сериозен риск от аномалии в кръвта и течностите (наречени метаболитна ацидоза), които трябва да бъдат подложени на спешно лечение (вж. точка 2).

Солпадеин разтворими таблетки с храна, напитки и алкохол

Това лекарство съдържа кофсин. Избягвайте приемането на големи количества чай, кафе или кофсин съдържащи напитки докато приемате Солпадеин разтворими таблетки. Повишеният прием на кофсин може да Ви направи раздразнителни и напрегнати, да имате трепане, сън или да изпитвате неприятно чувство на стягане и тежест в гърдите.

3. Как да приемате Солпадеин разтворими таблетки



Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

За перорално приложение.

Възрастни, включително и тези над 60 години, и деца на и над 12 години:

Една до две таблетки, разтворени в не по-малко от половин чаша с вода, до четири пъти на ден при необходимост.

Дозата да не се приема на интервали, по-кратки от 4 часа.

Възрастни: Да не се взимат повече от 8 таблетки за 24 часа.

Деца на и над 12 г.: Деца на и над 12 години следва да приемат Солпадеин разтворими таблетки на всеки 6 часа, според необходимостта. Да не се приемат повече от 6 таблетки за 24 часа.

Деца под 12 години: Солпадеин разтворими таблетки не се препоръчва при деца под 12 години, поради риск от тежки дихателни проблеми.

Това лекарство не трябва да се приема за период по-дълъг от три дни. Ако болката не намалее след три дни, консултирайте се с Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Солпадеин разтворими таблетки

Ако вземете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре. Предозирането с парацетамол може да причини увреждане на черния дроб. Симптомите на предозиране могат да бъдат по-тежки, ако вземате други лекарства, които засилват действието на чернодробните ензими (като например лекарства, използвани при спилептични гърчове, или успокоителни като жълт кантарион), ако редовно консумирате алкохол или ако имунната ви система е потисната (например, поради инфекция или гладуване). Съдържа кодеин: редовната употреба за дълъг период от време може да доведе до симптоми като безпокойство и раздразнителност когато се спре приема на това лекарство. Ако се налага да приемате това лекарство за по-дълъг период от време се консултирайте с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете необходимата доза Солпадеин разтворими таблетки

Приемете дозата когато си спомните. Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.


4. Възможни нежелани реакции

При парацетамол, нежеланите реакции са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Съобщени са много редки сериозни случаи на кожни реакции. Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако:

- наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, зачервяване, проблеми с дишането, поява на оток по устните, езика, гърлото или лицето;
- наблюдавате поява на язви в устата;
- наблюдавате поява на обширни области с обриви и мехури по кожата;
- сте имали проблеми с дишането при употреба на ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарства;
- имате неочаквано кървене или склонност към насиняване;
- имате мътна урина.

Честотата на следните нежелани реакции е неизвестна (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

- Сериозно състояние, при което може да има натрупване на киселина в кръвта (наричано метаболитна ацидоза) при пациенти с тежко заболяване, които използват парацетамол (вижте точка 2).



Кодеин може да причини запек, гадене, висене на свят или сънливост, но тези нежелани реакции се наблюдават много рядко при приемане на препоръчаните дози. Най-често наблюдаваните при кофеин нежелани реакции са: гадене, поради стомашно-чревно дразнене, безсъние и безпокойство в резултат на стимулиране на централната нервна система. Възможно е да появят трудности при уриниране.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако наблюдавате някакви неочаквани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +35928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Солпадеин разтворими таблетки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Солпадеин разтворими таблетки

Всяка таблетка съдържа:

парацетамол 500 mg
кодеин фосфат 8 mg
кофеин 30 mg

Разтворимата таблетка съдържа също така натриев бикарбонат, сорбитол (E420), натриев захарин, натриев лаурил сулфат, лимонена киселина, натриев карбонат, поливидон, течен силикон и пречистена вода.

Как изглежда Солпадеин разтворими таблетки и какво съдържа опаковката

Солпадеин разтворими таблетки са бели, кръгли таблетки с делителна черта от едната страна, опаковани в ламинирана двуслойна лента.

Картонената опаковка може да съдържа 12, 24, 48 или 96 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

Adriatic BST d.o.o.,

Verovškova ulica 55,

1000 Ljubljana, Словения

Производители:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.,



Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Ирландия

Swiss Caps GmbH
Grassingerstrabe 9
83043 Bad Aibling
Германия

Срок на годност: 4 години.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Януари 2025 г.

