

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СТРОНАКС КРЕМ
STRONAX CREAM

Мукополизахарид полисулфат / Надбъбречен екстракт / Салицилова киселина
Mucopolysaccharide polysulfate/Suprarenal extract/Salicylic acid

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Стронакс крем и за какво се използва
2. Преди да използвате Стронакс крем
3. Как да използвате Стронакс крем
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Стронакс крем
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТРОНАКС КРЕМ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Стронакс крем съдържа комбинация от три активни вещества, които след приложение върху кожата облекчават възпалението, подуването и болката.

Стронакс се използва:

- При ревматични оплаквания като например мускулен ревматизъм, мускулно напрежение, скованост на рамената, тендовагинит, възпалително нарушение на ставите.
- Също така като съпътстващо лечение на тежък ставен ревматизъм и артроза
- При разтягане и контузии

Моля уведомете Вашия лекар ако симптомите продължават повече от три дни.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СТРОНАКС КРЕМ

Не използвайте Стронакс крем

- ако сте алергични (свърхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на Стронакс крем.
- върху отворени рани, възпалена или наранена кожа, екзема или мукозни мембрани.



- в областта на гърдите по време на кърмене (вижте също раздел „Фертилитет, бременност и кърмене“)

Обърнете специално внимание при употребата на Стронакс крем

- ако имате доказано бъбречно увреждане
- ако имате варицела, с реакции след ваксинация, гъбични или бактериални инфекции на кожата или със специфични кожни заболявания (например туберкулоза, сифилис) на мястото на приложение. Употребата на Стронакс крем е разрешена само ако Вашия лекар изрично Ви е дал указание.
- при деца и юноши, тъй като няма достатъчно опит при тази възрастова група. Трябва да сте сигурни, че децата нямат допир с ръце до областите, където продуктът е приложен.

Употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Салициловата киселина от Стронакс крем може да увеличи пропускливостта на кожата за локални лекарства, прилагани на същото място. Когато Стронакс крем се прилага на големи кожни площи или за дълго време, може да нарастне честотата на нежеланите лекарствени реакции на метотрексат или да се засили ефектът на медикаментите от сулфанилурейната група, които се използват за намаляване на нивото на кръвната захар.

Фертилитет, бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

По време на бременност, Стронакс крем трябва да се използва само на малки области (< 5 cm²). По време на кърмене Стронакс крем не трябва да се прилага в областта на гърдите. Трябва да се избягва случайна абсорбция от кърмачето на салицилова киселина в резултат на допир с третираните области на тялото. Ако Вашият лекар сметне за необходимо да ви дава Стронакс крем за лечение на големи кожни области, трябва да спрете кърменето в подходящо време. В противен случай, може да има риск за детето, защото способността му да отхвърля токсините все още не е напълно развита при новородените.

Шофиране и работа с машини

Лекарственият продукт не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.


Помощни вещества

Стронакс крем съдържа цетостеарилов алкохол.

Може да причини локални кожни реакции (например контактен дерматит).

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СТРОНАКС КРЕМ

Винаги прилагайте Стронакс крем точно както е описано в тази листовка. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Придържайте се към инструкциите за употреба. В противен случай, Стронакс крем няма да прояви своя ефект.



Обичайната доза е:

Стронакс крем се прилага 2-3 пъти дневно.

Обикновено се прилага 5-15 cm от крема върху засегнатата област.

Начин на приложение:

Само за външно приложение

Нанасяйте тънък слой Стронакс крем върху засегнатата област от тялото и внимателно го втрийте. Преди да се облечете, Стронакс крем трябва да бъде оставен да изсъхне върху кожата за няколко минути. Не се препоръчва употребата на оклузивни превръзки.

Стронакс крем не трябва да се приема през устата!

Стронакс крем трябва да се използва само върху ненаранена кожа. Избягвайте приложение върху наранена кожа, отворени рани, очите или мукозни мембрани.

Подходящо е прилагането на Стронакс крем под форма на компреси и в комбинация с физиотерапия.

Продължителност на приложението

Продължителността на лечението се определя от лекуващия ви лекар. Лечение с продължителност над 11 дни обикновено е достатъчно. Не е доказано дали Стронакс крем има някаква терапевтична полза при по-дълго приложение.

Моля консултирайте се с Вашия лекар ако имате усещане, че ефектът на Стронакс крем е прекалено силен или прекалено слаб. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приложили повече Стронакс крем, отколкото трябва

Продължете с лечението, както е описано в тази листовка (например не нанасяйте крема по-плътнo или по-често от това, което нормално бихте нанасяли).

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Стронакс крем може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните честоти се използват за оценяване на нежеланите реакции:

Много чести ($\geq 1/10$)

Чести ($\geq 1/100$ до $< 1/10$)

Нечести ($\geq 1/1\,000$ до $< 1/100$)

Редки ($\geq 1/10\,000$ до $< 1/1\,000$)

Много редки ($< 1/10\,000$)

с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Нарушение на кожата и подкожната тъкан

Нечести: локално кожно дразнене

Много редки: контактни алергии



Ако възникнат нежелани лекарствени реакции, трябва да спрете приложението на Стронакс крем. Обикновено след това оплакванията отзвучават, без да са необходими други мерки.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ СТРОНАКС КРЕМ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25° С. Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Не използвайте Стронакс крем след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Отваряне на тубата: Перфорирайте защитното фолио, покриващо отворът на тубата с острието на капачката като едновременно натискате и завъртвате. Уверете се, че фолиото е напълно отстранено.

Всяка туба Стронакс крем е проверена за точното ѝ тегло. За да се подsigури правилното затваряне на тубата при процеса на пълненето ѝ, се изисква да има въздушен слой. Въпреки него, теглото на пълната туба не се променя.

Срок на годност след първо отваряне на тубата: 6 месеца

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Стронакс крем

- Активните вещества са:

100г крем съдържат:

Мукополизахарид полисулфат	0,20 g
Надбъбречен екстракт	1,08 g
Салицилова киселина	2,0 g

- Другите съставки са: Динатриев едетат, тимол, изопропилов алкохол, етаноламин, миристилов алкохол, емулгиращ цетилстеарилов алкохол, восъчно-спиртна маз, стеаринова киселина, глицерол, пречистена вода.

Как изглежда Стронакс крем и какво съдържа опаковката

Стронакс крем се предлага в туби, съдържащи 50 g крем и 100 g крем. Стронакс крем представлява комбинация от три лекарствени вещества, които след приложение върху кожата, облекчават възпалението, отока и болката.



Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Германия

Производители:

Mobilat Produktions GmbH
Luitpoldstrasse 1
85276 Pfaffenhofen
Германия

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.

Дата на последно одобрение на листовката

Ноември 2022

Допълнителна информация за пациента:

Защитното фолио върху отвора на тубата се пробива със заострения връх на обратната страна на капачката.

Всяка туба Стронакс се проверява за точно тегло. По време на процеса на пълнене на тубата, за да се осигури точното и правилното ѝ затваряне, във вътрешността ѝ се оставя малко празно място. Тази празнина не оказва влияние върху действителното тегло.

