

Листовка: информация за потребителя

Хаврикс 1440 инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка (Доза за възрастни)

Havrix 1440 suspension for injection in pre-filled syringe (Adult dose)

адсорбирана ваксина срещу хепатит А (инактивирана)
Hepatitis A (inactivated) vaccine (adsorbed)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	9800135
Разрешение №	08-04-2025
БГ	88730

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започне приложението на тази ваксина на Вас или Вашето дете, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
- Тази ваксина е предписана лично на Вас или на детето Ви. Не я преотстъпвайте на други хора.
- Ако Вие или детето Ви получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Тази листовка е написана, като се предполага, че я чете човекът, на когото се прилага ваксината, но ваксината може да се прилага на юноши от 16-годишна възраст, така че може да я четете за детето си.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да Ви приложат Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)
3. Как се прилага Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) и за какво се използва

За какво се използва Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)

Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) е ваксина, която се използва при юноши на възраст 16 и повече години и при възрастни за предпазване от инфекция, причинена от вируса на хепатит А.

Какво е хепатит А

- Хепатит А е болест на черния дроб, която се причинява от вируса на хепатит А.
- Вирусът на хепатит А може да се предава от човек на човек или чрез контакт със замърсена вода, храна и напитки.
- Симптомите на хепатит А може да бъдат от леки до тежки и може да включват повишена температура, неразположение, загуба на апетит, диария, гадене, дискомфорт в корема, тъмна урина и жълтеница (пожълтяване на очите и кожата). Повечето хора оздравяват напълно, но понякога болестта може да е тежка и да налага болнично лечение, а рядко може да доведе до остра чернодробна недостатъчност.

Как действа Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)

- Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) помага на организма Ви да създаде собствена защита (антитела) срещу вируса. Тези антитела помагат да се предпазите от заболяването.



- Както всички ваксини, Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) може да не предпази напълно всички ваксинирани.

2. Какво трябва да знаете, преди да Ви приложат Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)

Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) не трябва да се прилага, ако:

- сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на тази ваксина (изброени в точка 6) или към неомидин или формалдехид;
- сте имали алергична реакция към ваксина срещу хепатит А.

Признаците на алергична реакция може да включват сърбящ кожен обрив, задух и подуване на лицето или езика.

Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) не трябва да се прилага в горепосочените случаи. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди прилагането на Хаврикс 1440 (Доза за възрастни).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да Ви приложат Хаврикс 1440 (Доза за възрастни), ако:

- имате тежка инфекция с висока температура. Ваксината може да бъде приложена след като оздравеете. Лека инфекция, като например простуда, не би трябвало да е проблем, но все пак първо говорете с лекаря си.
- имунната Ви система е отслабена поради болести и/или лечения. Вашият лекар ще прецени дали ще са Ви необходими по-голям брой инжекции.
- имате проблеми с кръвене или лесно Ви се появяват синини.

Преди или след каквото и да е инжектиране с игла може да настъпи припадък. Затова трябва да кажете на лекаря, фармацевта или медицинската сестра, ако сте припадали при предишно инжектиране.

Други лекарства и Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)

Трябва да кажете на Вашия лекар, фармацевт или медицинската сестра, ако приемате, наскоро сте получили или е възможно да получите други ваксини или лекарства.

Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) може да се прилага едновременно с някои други ваксини и имуноглобулини. За всяка инжекция трябва да се използва отделно място за инжектиране.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да Ви бъде приложена Хаврикс 1440 (Доза за възрастни).

Шофиране и работа с машини

Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) съдържа фенилаланин, полисорбат 20, натрий и калий

Тази ваксина съдържа 0,166 mg фенилаланин във всяка доза.

Фенилаланинът може да Ви навреди, ако имате фенилкетонурия, рядко генетично заболяване, при което се натрупва фенилаланин, тъй като организмът не може да го отдели правилно.



Тази ваксина съдържа 0,050 mg полисорбат 20 във всяка доза. Полисорбатите могат да причинят алергични реакции. Трябва да кажете на Вашия лекар, ако имате установени алергии.

Тази ваксина съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

Тази ваксина съдържа калий, по-малко от 1 mmol (39 mg) на доза, т.е. практически не съдържа калий.

3. Как се прилага Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)

Как се прилага ваксината

- Лекарят или медицинската сестра ще приложи Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) като инжекция в мускул, обикновено в горната част на ръката.
- По изключение Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) може да се инжектира подкожно, ако страдате от тромбоцитопения или имате сериозни нарушения на кръвосъсирването.

Какво количество се прилага

- Ще ви бъде приложена 1 доза Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) (1 ml суспензия) на дата, съгласувана с Вашия лекар или медицинска сестра.
- За осигуряване на дългосрочна защита се препоръчва между 6 и 12 месеца след първата доза да се приложи втора доза (бустер); тя може да се приложи до пет години след първата доза.

Ако са Ви приложили повече от необходимата доза Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)

Предозиране е твърде малко вероятно, тъй като ваксината е в еднородов флакон или спринцовка и се прилага от лекар или сестра. Съобщени са малък брой случаи на случайно прилагане на по-голямо количество и съобщените нежелани реакции са подобни на съобщаваните при обичайното приложение на ваксината (изброени в точка 4).

Ако мислите, че сте пропуснали доза Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)

Свържете се с лекаря си и той ще прецени дали е необходима доза и кога да бъде приложена.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, тази ваксина може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Сериозни нежелани реакции

Трябва веднага да кажете на лекаря си, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани реакции – възможно е да се нуждаете от спешна медицинска помощ:

- алергични реакции – признаците може да включват обрив на ограничено място или на голям участък, който може да е сърбящ или с мехури, подуване на очите и лицето, затруднения в дишането или преглъщането, внезапен спад на кръвното налягане и загуба на съзнание.

Тези реакции може да настъпят преди да напуснете лекарския кабинет.

Трябва веднага да кажете на лекаря си, ако забележите някоя от сериозните нежелани реакции, изброени по-горе.



Нежеланите реакции, проявили се по време на клиничните изпитвания на Хаврикс 1440 (Доза за възрастни), са както следва:

Много чести (може да се появят при повече от 1 на 10 дози от ваксината):

- главоболие
- болка и зачервяване на мястото на инжектиране
- умора

Чести (може да се появят при до 1 на 10 дози от ваксината):

- загуба на апетит
- гадене
- повръщане
- диария
- общо неразположение
- температура 37,5 °C или по-висока
- подуване или твърда бучка на мястото на инжектиране

Нечести (може да се появят при до 1 на 100 дози от ваксината):

- инфекция на горните дихателни пътища
- запушен нос или хрема
- замаяност
- болка в мускулите, скованост на мускулите, непричинена от физическо натоварване
- грипоподобни симптоми като например висока температура, болка в гърлото, хрема, кашлица и втрисане

Редки (може да се появят при до 1 на 1 000 дози от ваксината):

- намаление или загуба на чувствителността на кожата към болка или допир
- иглички
- сърбеж
- втрисане

Нежелани реакции, проявили се след пускането на пазара на Хаврикс 1440 (Доза за възрастни), са както следва:

- припадъци или гърчове
- възпаление на кръвоносните съдове, водещо до стесняване или запушване (васкулит)
- сериозна алергична реакция, причиняваща оток на лицето, езика или гърлото, който може да причини затруднения в преглъщането или дишането
- копривна треска, червени, често сърбящи петна, появяващи се първо по крайниците и понякога по лицето и останалата част от тялото
- ставна болка

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg



Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте тази ваксина след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).

Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)

Активното вещество е хепатит А вирус (инактивиран) [Hepatitis A virus (inactivated)], адсорбиран върху алуминиев хидроксид. Всяка доза (1 ml) от ваксината съдържа 1440 ELISA Units хепатит А вирус.

Другите съставки са аминокиселини за инжекции (съдържащи фенилаланин), динатриев фосфат, монокалиев фосфат, полисорбат 20 (E432), калиев хлорид, натриев хлорид, вода за инжекции (вижте точка 2).

Как изглежда Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) и какво съдържа опаковката

Инжекционна суспензия.

Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) е мътна инжекционна течност.

Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) се предлага в 1-дозова предварително напълнена спринцовка със или без игли, в опаковки по 1, по 5, по 10 и по 25.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

GlaxoSmithKline Biologicals SA
Rue de l'Institut 89
B-1330 Rixensart
Белгия

Това лекарство е разрешено за употреба в държавите – членки на Европейското икономическо пространство под следните имена:

Австрия	Havrix (Hepatitis A-Impfstoff) 1440 EI.U/1 ml
---------	--



Белгия, Германия, Люксембург, Нидерландия, Унгария	Havrix 1440
България	Хаврикс 1440 инжекционна суспензия (Доза за възрастни)
Гърция, Италия	HAVRIX
Дания, Исландия, Норвегия, Финландия, Чехия	Havrix
Естония	Havrix, 1440 ELISA ühikut/ml süstesuspensioon
Ирландия	Havrix Monodose
Испания	Havrix 1440 Adulto suspensión inyectable en jeringa precargada
Кипър	Havrix Adults 1440
Латвия	Havrix 1440 ELISA vienības/ml suspensija injekcijām
Литва	Havrix 1440 ELISA vieneto/ml injekcinė suspensija
Малта	Havrix Monodose Vaccine
Полша	HAVRIX ADULT
Португалия	Havrix 1440 Adulto
Румъния	HAVRIX ADULT 1440 VACCIN HEPATITIC A
Словакия	HAVRIX 1440 Dosis adulta
Словения	HAVRIX 1440
Франция	HAVRIX 1440 U/1ml ADULTES
Швеция	Havrix 1440 ELISA U/1 ml

Дата на последно преразглеждане на листовката

03/2025

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Изпълнителна агенция по лекарствата


Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) е мътна течна суспензия. По време на съхранение може да се образува фина бяла утайка с безцветна надутаечна течност.

Преди приложение ваксината трябва да бъде прегледана визуално за чужди частици и/или отклонения във външния вид. Преди употребата на Хаврикс 1440 (Доза за възрастни), предварително напълнената спринцовка трябва да се разклати добре до получаване на полупрозрачна бяла суспензия. Изхвърлете ваксината, ако съдържанието изглежда по друг начин.




Указания за предварително напълнената спринцовка



Хванете спринцовката за тялото, а не за буталото.

Отвинтете капачката на спринцовката, като я завъртите в посока, обратна на часовниковата стрелка.



За да прикрепите иглата към спринцовката, съединете конектора на иглата с луер-лок адаптора и завъртете четвърт оборот по посока на часовниковата стрелка, докато усетите, че е затегната.

Не издърпвайте буталото на спринцовката извън тялото ѝ. Ако това се случи, не прилагайте ваксината.

Изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	9800109
Към Рег. №	68930 08-04-2025

Листовка: информация за потребителя

Хаврикс 1440 инжекционна суспензия (Доза за възрастни)
Havrix 1440 suspension for injection (Adult dose)

адсорбирана ваксина срещу хепатит А (инактивирана)
Hepatitis A (inactivated) vaccine (adsorbed)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започне приложението на тази ваксина на Вас или Вашето дете, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
- Тази ваксина е предписана лично на Вас или на детето Ви. Не я преотстъпвайте на други хора.
- Ако Вие или детето Ви получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Тази листовка е написана, като се предполага, че я чете човекът, на когото се прилага ваксината, но ваксината може да се прилага на юноши от 16-годишна възраст, така че може да я четете за детето си.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да Ви приложат Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)
3. Как се прилага Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) и за какво се използва

За какво се използва Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)

Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) е ваксина, която се използва при юноши на възраст 16 и повече години и при възрастни за предпазване от инфекция, причинена от вируса на хепатит А.

Какво е хепатит А

- Хепатит А е болест на черния дроб, която се причинява от вируса на хепатит А.
- Вирусът на хепатит А може да се предава от човек на човек или чрез контакт със замърсена вода, храна и напитки.
- Симптомите на хепатит А може да бъдат от леки до тежки и може да включват повишена температура, неразположение, загуба на апетит, диария, гадене, дискомфорт в корема, тъмна урина и жълтеница (пожълтяване на очите и кожата). Повечето хора оздравяват напълно, но понякога болестта може да е тежка и да налага болнично лечение, а рядко може да доведе до остра чернодробна недостатъчност.

Как действа Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)

- Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) помага на организма Ви да създаде собствена защита (антитела) срещу вируса. Тези антитела помагат да се предпазите от заболяването.



- Както всички ваксини, Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) може да не предпази напълно всички ваксинирани.

2. Какво трябва да знаете, преди да Ви приложат Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)

Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) не трябва да се прилага, ако:

- сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на тази ваксина (изброени в точка 6) или към неомидин или формалдехид;
- сте имали алергична реакция към ваксина срещу хепатит А.

Признаците на алергична реакция може да включват сърбящ кожен обрив, задух и подуване на лицето или езика.

Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) не трябва да се прилага в горепосочените случаи. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди прилагането на Хаврикс 1440 (Доза за възрастни).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да Ви приложат Хаврикс 1440 (Доза за възрастни), ако:

- имате тежка инфекция с висока температура. Ваксината може да бъде приложена след като оздравеете. Лека инфекция, като например простуда, не би трябвало да е проблем, но все пак първо говорете с лекаря си.
- имунната Ви система е отслабена поради болести и/или лечения. Вашият лекар ще прецени дали ще са Ви необходими по-голям брой инжекции.
- имате проблеми с кръвене или лесно Ви се появяват синини.

Преди или след каквото и да е инжектиране с игла може да настъпи припадък. Затова трябва да кажете на лекаря, фармацевта или медицинската сестра, ако сте припадали при предишно инжектиране.

Други лекарства и Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)

Трябва да кажете на Вашия лекар, фармацевт или медицинската сестра, ако приемате, наскоро сте получили или е възможно да получите други ваксини или лекарства.

Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) може да се прилага едновременно с някои други ваксини и имуноглобулини. За всяка инжекция трябва да се използва отделно място за инжектиране.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да Ви бъде приложена Хаврикс 1440 (Доза за възрастни).

Шофиране и работа с машини

Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) съдържа фенилаланин, полисорбат 20, натрий и калий

Тази ваксина съдържа 0,166 mg фенилаланин във всяка доза.

Фенилаланинът може да Ви навреди, ако имате фенилкетонурия, рядко генетично заболяване, при което се натрупва фенилаланин, тъй като организмът не може да го отделя правилно.



Тази ваксина съдържа 0,050 mg полисорбат 20 във всяка доза. Полисорбатите могат да причинят алергични реакции. Трябва да кажете на Вашия лекар, ако имате установени алергии.

Тази ваксина съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

Тази ваксина съдържа калий, по-малко от 1 mmol (39 mg) на доза, т.е. практически не съдържа калий.

3. Как се прилага Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)

Как се прилага ваксината

- Лекарят или медицинската сестра ще приложи Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) като инжекция в мускул, обикновено в горната част на ръката.
- По изключение Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) може да се инжектира подкожно, ако страдате от тромбоцитопения или имате сериозни нарушения на кръвосъсирването.

Какво количество се прилага

- Ще ви бъде приложена 1 доза Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) (1 ml суспензия) на дата, съгласувана с Вашия лекар или медицинска сестра.
- За осигуряване на дългосрочна защита се препоръчва между 6 и 12 месеца след първата доза да се приложи втора доза (бустер); тя може да се приложи до пет години след първата доза.

Ако са Ви приложили повече от необходимата доза Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)

Предозиране е твърде малко вероятно, тъй като ваксината е в еднородов флакон или спринцовка и се прилага от лекар или сестра. Съобщени са малък брой случаи на случайно прилагане на по-голямо количество и съобщените нежелани реакции са подобни на съобщаваните при обичайното приложение на ваксината (изброени в точка 4).

Ако мислите, че сте пропуснали доза Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)

Свържете се с лекаря си и той ще прецени дали е необходима доза и кога да бъде приложена.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, тази ваксина може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Сериозни нежелани реакции

Трябва веднага да кажете на лекаря си, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани реакции – възможно е да се нуждаете от спешна медицинска помощ:

- алергични реакции – признаците може да включват обрив на ограничено място или на голям участък, който може да е сърбящ или с мехури, подуване на очите и лицето, затруднения в дишането или преглъщането, внезапен спад на кръвното налягане и загуба на съзнание.

Тези реакции може да настъпят преди да напуснете лекарския кабинет.

Трябва веднага да кажете на лекаря си, ако забележите някоя от сериозните нежелани реакции, изброени по-горе.



Нежеланите реакции, проявили се по време на клиничните изпитвания на Хаврикс 1440 (Доза за възрастни), са както следва:

Много чести (може да се появят при повече от 1 на 10 дози от ваксината):

- главоболие
- болка и зачервяване на мястото на инжектиране
- умора

Чести (може да се появят при до 1 на 10 дози от ваксината):

- загуба на апетит
- гадене
- повръщане
- диария
- общо неразположение
- температура 37,5 °C или по-висока
- подуване или твърда бучка на мястото на инжектиране

Нечести (може да се появят при до 1 на 100 дози от ваксината):

- инфекция на горните дихателни пътища
- запушен нос или хрема
- замаяност
- болка в мускулите, скованост на мускулите, непричинена от физическо натоварване
- грипоподобни симптоми като например висока температура, болка в гърлото, хрема, кашлица и втрисане

Редки (може да се появят при до 1 на 1 000 дози от ваксината):

- намаление или загуба на чувствителността на кожата към болка или допир
- иглички
- сърбеж
- втрисане

Нежелани реакции, проявили се след пускането на пазара на Хаврикс 1440 (Доза за възрастни), са както следва:

- припадъци или гърчове
- възпаление на кръвоносните съдове, водещо до стесняване или запушване (васкулит)
- сериозна алергична реакция, причиняваща оток на лицето, езика или гърлото, който може да причини затруднения в преглъщането или дишането
- копривна треска, червени, често сърбящи петна, появяващи се първо по крайниците и понякога по лицето и останалата част от тялото
- ставна болка

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg



Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте тази ваксина след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).

Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Хаврикс 1440 (Доза за възрастни)

Активното вещество е хепатит А вирус (инактивиран) [Hepatitis A virus (inactivated)], адсорбиран върху алуминиев хидроксид. Всяка доза (1 ml) от ваксината съдържа 1440 ELISA Units хепатит А вирус.

Другите съставки са аминокиселини за инжекции (съдържащи фенилаланин), динатриев фосфат, монокалиев фосфат, полисорбат 20 (E432), калиев хлорид, натриев хлорид, вода за инжекции (вижте точка 2).

Как изглежда Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) и какво съдържа опаковката

Инжекционна суспензия.

Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) е мътна инжекционна течност.

Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) се предлага в 1-дозов флакон, в опаковки по 1, по 5, по 10 и по 25.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

GlaxoSmithKline Biologicals SA
Rue de l'Institut 89
B-1330 Rixensart
Белгия

Това лекарство е разрешено за употреба в държавите – членки на Европейското икономическо пространство под следните имена:



Австрия	Havrix (Hepatitis A-Impfstoff) 1440 EI.U/1 ml
Белгия, Германия Люксембург, Нидерландия, Унгария	Havrix 1440
България	Хаврикс 1440 инжекционна суспензия (Доза за възрастни)
Гърция, Италия	HAVRIX
Дания, Исландия, Норвегия, Финландия, Чехия	Havrix
Естония	Havrix, 1440 ELISA ühikut/ml süstesuspensioon
Ирландия	Havrix Monodose
Испания	Havrix 1440 Adulto suspensión inyectable en jeringa precargada
Кипър	Havrix Adults 1440
Латвия	Havrix 1440 ELISA vienības/ml suspensija injekcijām
Литва	Havrix 1440 ELISA vienetu/ml injekcinė suspensija
Малта	Havrix Monodose Vaccine
Полша	HAVRIX ADULT
Португалия	Havrix 1440 Adulto
Румъния	HAVRIX ADULT 1440 VACCIN HEPATITIC A
Словакия	HAVRIX 1440 Dosis adulta
Словения	HAVRIX 1440
Франция	HAVRIX 1440 U/1ml ADULTES
Швеция	Havrix 1440 ELISA U/1 ml

Дата на последно преразглеждане на листовката

03/2025

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Изпълнителна агенция по лекарствата

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Хаврикс 1440 (Доза за възрастни) е мътна течна суспензия. По време на съхранение може да се образува фина бяла утайка с безцветна надутаечна течност.

Преди приложение ваксината трябва да бъде прегледана визуално за чужди частици и/или отклонения във външния вид. Преди употребата на Хаврикс 1440 (Доза за възрастни), флаконът трябва да се разклати добре до получаване на полупрозрачна бяла суспензия. Изхвърлете ваксината, ако съдържанието изглежда по друг начин.

Изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

