

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. №	20100196
Разрешение № BG/МА/MP	68725 / 08 -04- 2025

Листовка: информация за потребителя

**Жанги 0,03 mg/3 mg филмиранi таблетки
(етинилестрадиол/дроспиренон)
Jangee 0,03 mg/3 mg film-coated tablets
(ethinylestradiol/drospirenone)**

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че призначите на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Важни неща, които трябва да се знаят за комбинираните хормонални контрацептиви (КХК):

- Те са един от най-надеждните обратими методи на контрацепция, ако се използват правилно
- Те леко повишават риска от получаване на кръвен съсирак във вените и артериите, особено през първата година или когато се започва отново прием на комбиниран хормонален контрацептив след прекъсване от 4 или повече седмици
- Моля, бъдете внимателни и посетете лекаря си, ако смятате, че можете да имате симптоми за наличие на кръвен съсирак (вж. точка 2 „Кръвни съсиреци“)

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Жанги и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Жанги
3. Как да приемате Жанги
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Жанги
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Жанги и за какво се използва

- Жанги е контрацептив и се използва за предпазване от бременност.
- Всяка таблетка съдържа малко количество от два различни женски полови хормона, наречени дроспиренон и етинилестрадиол.
- Контрацептивните таблетки, които съдържат два хормона се наричат „комбинирани“ таблетки.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Жанги

Общи бележки

Преди да започнете да използвате Жанги, трябва да прочетете информацията за кръвни съсиреци в точка 2. Особено важно е да прочетете симптомите за кръвен съсирак – вж. точка 2 „Кръвни съсиреци“).



Преди да започнете приема на Жанги, Вашият лекар ще Ви зададе различни въпроси по отношение на личната Ви анамнеза, както и тази на роднините Ви. Лекарят също ще измери кръвното Ви налягане и в зависимост от здравословното Ви състояние, може да предприеме и други изследвания.

В тази листовка са описани различни ситуации, в които трябва да спрете приема на Жанги, или в които ефекта на Жанги може да бъде намален.

В подобни ситуации или не трябва да имате полов контакт или трябва да вземете допълнителни не-хормонални контрацептивни мерки, например употреба на презерватив или друг бариерен метод.

Не използвайте календарния или температурния метод. Тези методи могат да не са особено надеждни, защото Жанги влияе на месечните промени на телесната температура и на цервикалната секреция.

Жанги, подобно на останалите хормонални контрацептиви, не предпазва от HIV (СПИН) или други сексуално предавани инфекции.

Не приемайте Жанги:

Не трябва да използвате Жанги, ако имате някое от заболяванията, изброени по-долу. Ако имате някое от тях, трябва да съобщите на Вашия лекар. Той ще обсъди с Вас каква друга форма на контрацепция би била по-подходяща.

- ако имате (или някога сте имали) кръвен съсирак в кръвоносен съд в краката (дълбока венозна тромбоза (ДВТ)), белите дробове (белодробна емболия (БЕ)) или други органи;
- ако знаете, че имате заболяване, засягащо кръвосъсирането – например недостиг на протеин C, недостиг на протеин S, недостиг на антитромбин III, Фактор V на Leiden или антифосфолипидни антитела;
- ако се нуждаете от операция или ако сте обездвижени за дълъг период от време (вижте точка „Кръвни съсираки“);
- ако имате или някога сте имали сърден инфаркт или инсулт;
- ако имате (или някога сте имали) стенокардия (заболяване, което причинява силна болка в областта на гръденя кош и може да бъде първия признак на сърден инфаркт) или преходна исхемична атака (ПИА – преходни симптоми на инсулт);
- ако имате някое от следните заболявания, които могат да увеличат риска от образуване на съсирак в артериите:
 - тежък диабет с увреждане на кръвоносните съдове
 - много високо кръвно налягане
 - много високо ниво на мазнини в кръвта (холестерол или триглицериди)
 - заболяване, известно като хиперхомоцистинемия
- ако имате (или някога сте имали) вид мигрена, наречена „мигрена с аура“
- ако имате (или сте имали) възпаление на панкреаса (панкреатит)
- ако имате или сте имали в миналото чернодробно заболяване и чернодробната Ви функция все още не е възстановена
- ако бъбреците Ви не работят добре (бъбречна недостатъчност)
- ако имате (или сте имали) чернодробен тумор



- ако имате (или сте имали) или подозирате, че имате рак на гърдата или рак на половите органи
- ако имате влагалищно кървене и причината не е изяснена
- ако сте алергична към етинилестрадиол или дроспиронен, или към някоя от останалите съставки на Жанги (изброени в точка б). Това може да причини сърбеж, облив или оток.

Не използвайте Жанги, ако имате хепатит С и приемате лекарствени продукти, съдържащи омбитаасвир/паритапревир/ронтонавир, дазабувир, глекапревир/либрентасвир или софосбувир/велпатаасвир/воксилапревир (вижте също точка „Други лекарства и Жанги“).

Допълнителна информация за специални популации

Деца и юноши

Жанги не е показан за употреба при момичета, при които менструалния цикъл не е започнал.

Възрастни жени

Жанги не е показан за приложение след менопауза.

Жени с чернодробно увреждане

Не приемайте Жанги, ако страдате от чернодробно заболяване. Вижте също точки „Не използвайте Жанги“ и „Предупреждения и предпазни мерки“.

Жени с бъбречно увреждане

Не приемайте Жанги, ако страдате от слабо функциониращи бъбреци или остра бъбречна недостатъчност. Вижте също точки „Не използвайте Жанги“ и „Предупреждения и предпазни мерки“.

Предупреждения и предпазни мерки

Кога трябва да се свържете с Вашия лекар?

Потърсете спешна медицинска помощ

- ако забележите възможни признания за образуване на кръвен съсирак в крака (т.е. дълбока венозна тромбоза), на кръвен съсирак в белия дроб (т.е. белодробна емболия), за сърден инфаркт или инсулт (вижте „Кръвен съсирак“ по-долу).

За описание на симптомите на тези сериозни нежелани реакции, моля вижте „Как да разпознаете кръвен съсирак“.

Информирайте Вашия лекар, ако някое от следните състояния се отнася за Вас:

Ако състоянието се развие или влоши, докато използвате Жанги, трябва също да информирате Вашия лекар. В някои ситуации може да се наложи да вземете специални мерки, докато приемате Жанги или друг комбиниран перорален продукт, и може да трябва Вашият лекар да Ви преглежда редовно.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Жанги

- ако някой от близките Ви роднини има или е имал рак на гърдата



- ако имате заболяване на черния дроб (като например запушване на жълчните пътища, което може да предизвика жълтеница и симптоми като сърбеж) или на жълчния мехур (като камъни в жълчката)
- ако имате други проблеми с бъбреците и приемате лекарства, които увеличават нивата на калий в кръвта
- ако имате диабет
- ако имате депресия: Някои жени, които използват хормонални контрацептиви, включително Жанги, съобщават за депресия или депресивно настроение. Депресията може да бъде сериозна и понякога да доведе до мисли за самоубийство. Ако получите промени в настроението и симптоми на депресия, при първа възможност се свържете с лекаря си за допълнителна медицинска консултация.
- ако имате болест на Крон или улцерозен колит (хронична възпалителна болест на червата);
- ако имате системен лупус еритематодес (СЛЕ – заболяване, засягащо Вашата естествена защитна система);
- ако имате хемолитично-уремичен синдром (ХУС - нарушение на кръвосъсирването, причиняващо бъбречна недостатъчност);
- ако имате сърповидно-клетъчна анемия (наследствено заболяване на червените кръвни клетки);
- ако имате повишени нива на мазнини в кръвта (хипертриглицеридемия) или фамилна анамнеза за това заболяване. Хипертриглицеридемията е свързана с повишен риск от развитие на панкреатит (възпаление на панкреаса);
- ако се нуждаете от операция или сте обездвижени за дълъг период от време (вижте в точка 2 „Кръвни съсиреци“);
- ако току-що сте родили, сте изложени на повишен риск от образуване на кръвни съсиреци: Трябва да попитате Вашия лекар колко време след раждане можете да започнете да приемате Жанги;
- ако имате възпаление във вените под кожата (повърхностен тромбофлебит);
- ако имате разширени вени;
- ако имате епилепсия (виж „Други лекарства и Жанги“)
- ако имате заболяване, което се е появило за първи път по време на бременност или при предишна употреба на полови хормони; например загуба на слуха, заболяване на кръвта наречено порфирия, кожен обрив с везикули по време на бременност (гестационен херпес), заболяване на нервите, причиняващо неволеви движения на тялото (хорея на Sydenham))
- ако имате високо кръвно налягане по време на терапията, което не се контролира чрез лечение с лекарство
- ако имате или някога сте имали хлоазма (жълто кафяви пигментни петна, още наречени „летна на бременността“, особено по лицето или врата). В този случай избягвайте директното излагане на слънчева светлина или ултравиолетово лъчение докато приемате това лекарство.
- ако почувствате симптоми на ангиоедем като подуване на лицето, езика и/или гърлото и/или имате затруднено прегълъщане или уртикария, потенциално със затруднено дишане, незабавно се свържете с Вашия лекар. Продуктите, съдържащи естрогени, може да причинят или влошат симптомите на наследствен или придобит ангиоедем.

КРЪВНИ СЪСИРЕЦИ

Ако се използва комбиниран хормонален контрацептив, като Жанги, рисъкът от образуване на кръвни съсиреци е по-висок, отколкото ако не се използва такъв контрацептив. В резултат



случай кръвен съсирак може да блокира кръвоносни съдове и да причини сериозни проблеми.

Кръвни съсиреци може да се образуват

- във вените (наричани „венозна тромбоза“, „венозна тромбоемболия“ или ВТЕ)
- в артериите (наричани „артериална тромбоза“, „артериална тромбоемболия“ или АТЕ).

Възстановяването от кръвни съсиреци не винаги е пълно. Рядко може да има сериозни, продължителни ефекти или, много рядко, те могат да са фатални.

Важно е да помните, че общият риск от увреждащ кръвен съсирак вследствие на Жанги е малък.

КАК ДА РАЗПОЗНАЕТЕ КРЪВЕН СЪСИРЕК

Потърсете спешна медицинска помощ, ако забележите някой от следните признания или симптоми.

Имате ли някой от тези признания?	От какво е възможно да страдате?
<ul style="list-style-type: none">• подуване на единия крак или по продължение на вена в крака или ходилото, особено когато това е съпроводено от:<ul style="list-style-type: none">○ болка или болезненост в крака, която може да се усеща само при ставане или ходене○ затопляне на засегнатия крак○ промяна в цвета на кожата на крака, напр. става блед, червен или син	Дълбока венозна тромбоза
<ul style="list-style-type: none">• внезапен необясним задух или ускорено дишане;• внезапна кашлица без видима причина, при която може да се откашля кръв;• остра болка в гръденния кош, която може да се усили при дълбоко вдишване;• силно пристъпяване или замайване;• ускорен или неправилен сърдечен ритъм;• силна болка в stomахa;	Белодробна емболия
<p><u>Ако не сте сигурни</u>, говорете с лекар, тъй като някои от тези симптоми, като кашлица или задух могат да се объркат с по-леко заболяване, като инфекция на дихателните пътища (напр. простуда).</p>	
<p>Симптоми, които най-често се получават в едното око:</p> <ul style="list-style-type: none">• внезапна загуба на зрение или• неболезнено замъгливане на зорнинето, което може да прогресира до загуба на зрение	Ретинална венозна тромбоза (кръвен съсирак в окото)
<ul style="list-style-type: none">• болка, дискомфорт, напрежение, тежест в гръденния кош• усещане за стягане или тежест в гърдите, ръката или под гръдената кост;• усещане за сътост, лошо храносмилане или задавяне;	Инфаркт



<ul style="list-style-type: none"> дискомфорт в горната част на тялото, разпространяващ се към гърба, челюстта, гърлото, ръката и стомаха; изпотяване, гадене, повръщане или замаяност; прекомерна слабост, беспокойство или задух; ускорен или неправилен сърден ритъм 	
<ul style="list-style-type: none"> внезапна слабост или изтръпване на лицето, ръката или крака, особено от едната страна на тялото; внезапно объркане, затруднен говор или затруднено разбиране; внезапно затруднено виждане с едното или и с двете очи; внезапно затруднение при ходене, замаяност, загуба на равновесие или координация; внезапно, тежко или продължително главоболие без известна причина; загуба на съзнание или припадък със или без гърч. <p>Понякога симптомите на инсулт могат да бъдат краткотрайни с почти незабавно и пълно възстановяване, но Вие все пак трябва да потърсите спешна медицинска помощ, тъй като може да имате рисък от друг инсулт.</p>	Инсулт
<ul style="list-style-type: none"> оток и леко посиняване на крайник; силна болка в стомаха („остър корем“) 	Кръвни съсиреци, блокиращи други кръвоносни съдове

КРЪВНИ СЪСИРЕЦИ ВЪВ ВЕНА

Какво може да се случи, ако кръвен съсиrek се образува във вена?

- Употребата на комбинирани хормонални контрацептиви е свързана с увеличение на риска от образуване на кръвни съсиреци във вените (венозна тромбоза). Тези нежелани реакции обаче са редки. Най-често те се получават през първата година на употреба на комбиниран хормонален контрацептив.
- Ако кръвен съсиrek се образува във вена в крака или ходилото, той може да причини дълбока венозна тромбоза (ДВТ).
- Ако кръвен съсиrek премине през крака и попадне в белия дроб, той може да причини белодробна емболия.
- Много рядко съсиrek може да се образува във вена в друг орган, например в окото (ретинална венозна тромбоза).

Кога рисъкът от образуване на кръвен съсиrek във вена е най-висок?

Рисъкът от образуване на кръвен съсиrek във вена е най-висок в първата година от приема на комбиниран хормонален контрацептив за първи път. Рисъкът може също да бъде по-висок, ако подновите приема на комбиниран хормонален контрацептив (същия или различен продукт) след прекъсване от 4 седмици или повече.

След първата година, рисъкът намалява, но е винаги малко по-висок, отколкото ако не използвате комбиниран хормонален контрацептив.



Когато прекратите приема на Жанги, рисъкът от образуване на кръвен съсирак при Вас се връща към нормалното в рамките на няколко седмици.

Какъв е рисъкът от образуване на кръвен съсирак?

Рисъкът зависи от Вашия естествен рисък от ВТЕ и от вида комбиниран хормонален контрацептив, който използвате.

Общият рисък от образуване на кръвен съсирак в крака или белия дроб (ДВТ или БЕ) при употреба на Жанги е малък.

- От 10 000 жени, които не използват никакъв комбиниран хормонален контрацептив и не са бременни, около 2 ще развият кръвен съсирак в рамките на една година.
- От 10 000 жени, които използват комбиниран хормонален контрацептив, съдържащ левоноргестрел, норетистерон, или норгестимат, около 5-7 ще развият кръвен съсирак в рамките на една година.
- От 10 000 жени, които използват комбиниран хормонален контрацептив, съдържащ дроспиронон, като Жанги, между 9 и 12 жени ще развият кръвен съсирак в рамките на една година.
- Рисъкът от образуване на кръвен съсирак варира според Вашата лична история на заболяванията (виж „Фактори, които увеличават риска от образуване на кръвен съсирак при Вас“ по-долу).

Рисък от образуване на кръвен съсирак в рамките на една година	
Жени, които не използват комбиниран хормонален контрацептив под формата на хапче/пластир/пръстен и не са бременни	Около 2 от 10 000 жени
Жени, които използват комбиниран хормонален контрацептив под формата на хапче, съдържащ левоноргестрел, норетистерон или норгестимат	Около 5-7 от 10 000 жени
Жени, които използват Жанги	Около 9-12 от 10 000 жени

Фактори, които увеличават риска от образуване на кръвен съсирак във вена при Вас

Рисъкът от образуване на кръвен съсирак при Жанги е малък, но някои условия го повишават. Рисъкът за Вас е по-висок:

- ако имате наднормено тегло (индекс на телесна маса (ИТМ) над 30 kg/m^2);
- ако някой от Вашите най-близки роднини е имал кръвен съсирак в крака, белите дробове или друг орган, когато е бил млад (напр. под 50 години). В този случай може да имате наследствено заболяване на кръвосъсирването;
- ако трябва да Ви се направи операция, или ако сте обездвижени за дълъг период от време поради травма или заболяване, или ако кракът Ви е в гипсова превръзка. Може да се наложи употребата на Жанги да се прекрати няколко седмици преди операция или докато сте по-малко подвижни. Ако трябва да прекратите приема на Жанги, попитайте Вашия лекар кога можете да започнете да го използвате отново.
- с напредване на възрастта (особено над 35 години);
- ако сте родили преди по-малко от няколко седмици



Колкото повече предразполагащи фактори се отнасят до Вас, толкова повече се повишава рисъкът от образуване на кръвен съсирак.

Пътуване със самолет (>4 часа) може временно да повиши риска от образуване на кръвен съсирак при Вас, особено ако имате някои от другите изброени фактори.

Важно е да кажете на Вашия лекар, ако някое от тези състояния се отнася за Вас, дори ако не сте сигурна. Вашият лекар може да реши, че употребата на Жанги трябва да се прекрати.

Кажете на Вашия лекар, ако някое от горните условия се промени, докато използвате Жанги, например близък Ваш роднин получи тромбоза по неизвестна причина; или ако теглото Ви много се увеличи.

КРЪВНИ СЪСИРЕЦИ В АРТЕРИЯ

Какво може да се случи, ако кръвен съсирак се образува в артерия?

Подобно на кръвния съсирак във вена, един съсирак в артерия може да причини сериозни проблеми. Така например, той може да причини сърден инфаркт или инсулт.

Фактори, които увеличават риска от образуване на кръвен съсирак в артерия при Вас

Важно е да се отбележи, че рисъкът от сърден инфаркт или инсулт поради употребата на Жанги е много малък, но може да се повиши:

- с напредване на възрастта (след около 35 години);
- ако пушите. Когато използвате комбиниран хормонален контрацептив като Жанги, препоръчително е да спрете да пушите. Ако не Ви е възможно да спрете да пушите и сте на възраст над 35 години, Вашият лекар може да Ви посъветва да използвате различен вид контрацептив;
- ако имате наднормено тегло;
- ако имате високо кръвно налягане;
- ако някой от Вашите най-близки роднини е имал сърден инфаркт или инсулт в млада възраст (под 50 години). В този случай рисъкът от получаване на сърден инфаркт или инсулт може да е по-висок и при Вас.
- ако Вие или някой от най-близките Ви роднини имате високо ниво на мазнини в кръвта (холестерол или триглицериди);
- ако получите мигрена, особено мигрена с aura;
- ако имате проблем със сърцето (клапно заболяване, ритъмно състояние, наречено предсърдно мъждане)
- ако имате диабет.

Ако имате повече от едно от тези заболявания или ако някои от тях са особено тежки, рисъкът от развиване на кръвен съсирак може да се увеличи дори още.

Кажете на Вашия лекар, ако някое от горните състояния се промени, докато използвате Жанги, например започнете да пушите, близък Ваш роднин получи тромбоза по неизвестна причина, или ако теглото Ви много се увеличи.

Жанги и рак

Рак на гърдата се наблюдава малко по-често при жени, употребяващи комбинирани контрацептиви, но не е известно дали е причинен от медикамента. Например, един медик съветва



поради това, че повечето тумори са открити при жени, употребяващи контрацептиви, тъй като те се преглеждат при лекар по-често. Появата на рак на гърдата става постепенно по-рядка след спиране на приема на комбинирани хормонални контрацептиви.

Важно е редовно да преглеждате гърдите си и ако усещате някаква бучка да се свържете с лекаря си.

В редки случаи са открити доброкачествени тумори в черния дроб при жени, употребяващи комбинирани контрацептиви, а в още по-редки случаи – злокачествени тумори. Свържете се с лекаря си, ако получите внезапна силна коремна болка или подуване на корема (което може да е резултат от увеличаване на размера на черния дроб) или кървене от стомаха.

Кървене между менструалните периоди

По време на първите месеци на прием на Жанги, може да имате неочаквано кървене (кървене извън интервала, в който не приемате лекарството). Ако това кървене продължи повече от няколко месеца, или ако започне след няколко месеца, лекарят Ви трябва да проучи причината.

Какво трябва да правите ако нямаете цикъл в интервала, в който не приемате лекарството

Ако сте приели всички таблетки правилно, не сте имали повръщане или тежка диария и не сте приемали други лекарства, малко вероятно е да сте бременна.

Ако два поредни пъти нямаете цикъл, може да сте бременна. Незабавно се свържете с лекаря си. Не започвайте следващата лента, докато не сте сигурна, че не сте бременна.

Други лекарства и Жанги

Винаги информирайте Вашия лекар за лекарствата или растителните продукти, които вече използвате. Също така уведомявайте всеки друг лекар или зъболекар, който Ви предписва друго лекарство (или фармацевт), че употребявате Жанги. Те може да Ви кажат дали е необходимо да използвате допълнителни контрацептивни мерки (напр. презервативи) и ако това е така – за какъв период от време, или, дали трябва да бъде променено друго използвано лекарство, от което се нуждаете.

Някои лекарства

- могат повлияят кръвните нива на Жанги
- могат да намалят **ефективността му по отношение предотвратяването на бременност**
- могат да причинят неочаквано кървене/зацепване.

Това включва:

- лекарства, използвани за лечение на:
 - епилепсия (напр. примидон, фенитоин, барбитурати, окскарбазепин, фелбамат, топирамат)
 - туберкулоза (напр. рифампицин)



- HIV и хепатит С вирусни инфекции (лекарства, наречени протеазни инхибитори и ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза, като ритонавир, невирапин, ефавиренц)
- гъбични инфекции (напр. гризофулвии или кетоконазол)
- артрит, артроза (еторикоксиб)
- високо кръвно налягане в кръвоносните съдове в дробовете (бозентан)
- растителния продукт билката жълт кантарион

Ако използвате някое от горепосочените лекарства заедно с Жанги, тряба да вземете допълнителни предпазни мерки за контрацепция (например, да използвате презерватив) по време и в продължение на 28 дни след терапията.

Жанги може да повлияе на ефекта на други лекарства, напр.:

- лекарства, съдържащи циклоспорин
- противогърчовия продукт ламотригин (това може да увеличи честотата на гърчовете)
- теофилин (използван за лечение на проблеми с дишането)
- тизанидин (използван за лечение на болки в мускулите и/или мускулни крампи)

Не използвайте Жанги, ако имате хепатит С и приемате лекарствени продукти, съдържащи омбитаасвир/паритапревир/ритонавир, дазабувир, глекапревир/пибрентасвир или софосбувир/велпатаасвир/воксилапревир, тъй като тези продукти може да доведат до повишаване на резултатите при изследвания на функцията на черния дроб (повишаване на чернодробните ензими АЛТ).

Вашият лекар ще Ви предпише друг вид контрацепция, преди да започнете лечение с тези лекарствени продукти.

Може да се започне отново прием на Жанги приблизително 2 седмици след прекратяване на това лечение. Вижте точка „Не използвайте Жанги“.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Жанги с храна и напитки

Жанги може да се приема с или без храна, ако е необходимо с малко количество вода.

Лабораторни тестове

Ако се нуждаете от кръвни тестове, уведомете лекаря или лабораторния персонал, че приемате контрацептив. тъй като оралните контрацептиви могат да повлият резултатите от някои тестове.

Бременност и кърмене

Бременност

Ако сте бременна не трябва да приемате Жанги. Ако забременеете докато приемате Жанги, трябва незабавно да спрете приема и да се свържете с лекаря си. Ако желате да забременеете. Вие можете да спрете приема на Жанги по всяко време (вижте също „Ако некате да спрете приема на Жанги“).

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на лекарство.



Кърмене

Като цяло употребата на Жанги не е препоръчителна по време на кърмене. Ако искате да приемате контрацептиви докато кърмите, трябва да се посъветвате с лекар.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Няма информация, че употребата на Жанги влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

Жанги съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него си преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Жанги

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Вземайте по една таблетка Жанги всеки ден, с малко вода ако е необходимо. Може да приемате таблетките с или без храна, но в приблизително едно и също време на деня.

Една лента съдържа 21 таблетки. Денят от седмицата, в който трябва да вземете таблетката е отпечатан върху всяка таблетка. Ако например започнете в сряда, трябва да вземете таблетката с надпис „Ср“. Следвайте стрелката върху лентата докато вземете всички 21 таблетки.


След това не приемайте таблетки през следващите 7 дни. През тези 7 дни, когато не приемате таблетки (т.нар. свободен от таблетки интервал или седмица без таблетки), трябва да получите менструация. Менструацията, която още може да бъде наречена „отпадно кървене“ обикновено започва на 2-рия или 3-тия ден от седмицата без таблетки.

На 8-ия ден след приема на последната таблетка Жанги (това е след 7-дневния свободен от таблетки интервал), започнете със следващата лента, дори ако менструацията не е спряла. Това означава, че Вие трябва да започвате всяка лента в един и същи ден от седмицата и менструацията започва на същата дата всеки месец.

Ако приемате Жанги по този начин, Вие също сте предпазени от забременяване и през седемте дни, когато не приемате таблетки.

Кога можете да започнете първата лента?

- *Ако през минатия месец не сте приемали хормонален контрацептив.*
Започнете приема на Жанги в първия ден на обичайния Ви цикъл (това е първия ден на менструацията Ви). Ако започнете приема на Жанги на първия ден от менструацията Ви, ще бъдете незабавно предпазена от бременност. Можете също да започнете приема на



ден 2-5 от цикъла Ви, но тогава тряба да използвате допълнителни контрацептиви (например презерватив) през първите 7 дни.

- *Ако заменяте друг комбиниран хормонален контрацептив, или комбиниран контрацептивен вагинален пръстен или лепенка.*
Вие можете да започнете приема на Жанги за предпочтение в деня след приемането на последната активна таблетка (последната таблетка, съдържаща активни вещества) от Вашите предишни контрацептивни таблетки, но не по-късно от деня след свободния от таблетки интервал (или след последната неактивна таблетка от предходно използваните таблетки). При преминаване от комбиниран контрацептивен вагинален пръстен или лепенка, следвайте указанията на Вашия лекар.
- *Ако заменяте метод, базиран само на прогестоген (прогестогенова таблетка, инжекция, имплант или прогестоген-освобождаващо IUD).*
Можете да преминете от прогестогенова таблетка когато пожелаете (ако сте имали имплант или IUD, трябва да смените като приемете новата таблетка в деня на отстраняването му; ако сте използвали инжекции – приемете новата таблетка в деня, в който трябва да се постави следващата инжекция), но е препоръчително във всички тези случаи да използвате допълнителна протекция (напр. презерватив) през първите 7 дни на прием на таблетки.
- *След аборт или прекъсване на бременност*
Следвайте препоръките на Вашия лекар.
- *След раждане.*
Можете да започнете да приемате Жанги между 21 и 28 дни след раждането. Ако започнете по-късно от 28-мия ден, трябва да използвате бариерен метод за контрацепция (напр. презерватив) през първите 7 дни от приема на Жанги.
Ако, след раждане, сте имала полов контакт преди да започнете Жанги, трябва да сте сигурна, че не сте бременна или да изчакате до следващата Ви менструация.
- *Ако кърмите и искате да започнете приема на Жанги (отново) след раждането.*
Прочетете точка "Кърмене".

Потърсете Вашия лекар за съвет ако не сте сигурна кога да започнете.

Ако сте приели повече от необходимата доза Жанги

Няма съобщения за серозни увреждания, поради приемане на прекалено много таблетки Жанги.

Ако приемете няколко таблетки едновременно, може да почувствате гадене или позив за повръщане, или да получите вагинално кървене.

Дори при момичета, при които все още не е започната менструация, но случайно са приели това лекарство, може да се появи подобно кървене.

Ако сте приели твърде много таблетки Жанги, или откриете, че дете е приело от таблетките, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт за съвет.



Ако сте пропуснали да приемете Жанги

- Ако сте **по-малко от 12 часа** закъснели с приема на таблетката, предпазването от бременност не е намалена. Вземете таблетката веднага щом се сетите, а следващите таблетки в обичайното време.
- Ако сте **повече от 12 часа** закъснели с приема на таблетката, предпазването от бременност може да е намалена. Колкото повече таблетки сте пропуснали да вземете, толкова по-голям е рисъкът от намаляване на контрацептивния ефект.

Рисъкът от намалено предпазване от забременяване е най-висок, ако пропуснете да приемете таблетката в началото или края на лентата. Следователно, трябва да спазвате правилата дадени по-долу (вижте също и диаграмата по-долу):

- **Ако забравите да приемете повече от една таблетка от лентата**
Свържете се с Вашия лекар.
- **Ако забравите да приемете една таблетка в първата седмица**
Вземете пропусната таблетка веднага, след като си спомните, дори ако това означава да вземете две таблетки наведнъж. Продължете да вземате следващите таблетки в обичайното време и използвайте **допълнителни мерки**, напр. презерватив, в следващите 7 дни. Ако сте имали полов контакт в седмицата преди да забравите да вземете таблетката. Вие може да сте бременна. В такъв случай, свържете се с Вашия лекар.
- **Ако забравите да приемете една таблетка във втората седмица**
Вземете пропусната таблетка веднага, след като си спомните, дори ако това означава да вземете две таблетки наведнъж. Продължете да вземате следващите таблетки в обичайното време. Защитата от забременяване не е намалена и не е необходимо да използвате допълнителни мерки.
- **Ако забравите да приемете една таблетка в третата седмица**
Може да изберете една от следните възможности:
 1. Вземете пропусната таблетка веднага, след като си спомните, дори ако това означава да вземете две таблетки наведнъж. Продължете да вземате следващите таблетки в обичайното време. Вместо да имате седмица без таблетки, започнете следващата лента.


Възможно е да получите менструация (отпадно кървене) в края на втората лента, но също може да имате някакво зацепване или кървене докато приемате втората лента.
 2. Може също да прекратите приема на таблетки и да започнете свободния от таблетки интервал от 7 дни (като включите дните на пропуснати таблетки, **отбележете дения, в който сте пропуснали таблетката**). Ако искате да започнете нова лента в същия ден от седмицата както обикновено, направете свободния от таблетки интервал **по-малко от 7 дни**.

Ако следвате някоя от тези две препоръки, ще се предпазите от забременяване.



- Ако сте забравили да приемете някоя от таблетките от лентата и нямате менструация по време на свободния от таблетки интервал, Вие може да сте бременна. В този случай трябва да се консултирате с Вашия лекар, преди да започнете следващата лента.

Следната диаграма описва как да действате, ако сте забравили да приемете таблетка (таблетки):



Какво трябва да направите в случай на повръщане или тежка диария?

Ако повръщате в рамките на 3-4 часа след приема на таблетката или имате тежка диария, съществува рисък активните вещества на таблетката да не са се абсорбирали напълно от тялото. Това е подобно на това, което се случва когато забравите да приемете таблетка. След повръщане или диария, трябва да вземете таблетка от резервна лента колкото е възможно по-скоро. Ако е възможно, я вземете *в рамките на 12 часа* от обичайното за прием време. Ако това не е възможно, или са минали повече от 12 часа, следвайте инструкциите от „Ако сте пропуснали да използвате Жанги“.

Забавяне на менструалния цикъл: какво трябва да знаете

Въпреки, че не е препоръчително, можете да отложите менструацията си, като вместо свободния от таблетки интервал, преминете направо към втора лента Жанги и я довършите. Може да се появи зацепване (капки кръв или петна) или кървене по време на приема на втората лента. След като приключите втората лента, преминете през обичайнния свободен от таблетки 7-дневен интервал, и започнете със следващата лента.

Преди да решите да забавите менструалния си цикъл, можете да се консултирате с Вашия лекар.

Промяна на първия ден от менструалния цикъл: какво трябва да знаете?

Ако приемате таблетките според инструкциите, тогава менструацията (отпадно кървене) ще започне през *седмицата без таблетки*. Ако трябва да смените този ден, можете да го направите като намалите дните свободни от таблетки *(по никога не ги увеличавате - 7 е максимумът!)*. Например, ако Вашите дни свободни от таблетки започват в петък, а Вие искате да започват във вторник (3 дни по-рано), трябва да започнете нова лента 3 дни по-рано отколкото обикновено бихте започнали. Ако скъсите много свободния от таблетки интервал (например 3 дни или по-малко), може да не получите отпадно кървене (менструация) през този интервал. Може да получите тогава зацепване (капки кръв или петна) или кървене, подобно на менструалното.

Ако не сте сигурни какво да правите, посъветвайте се с Вашия лекар.

Ако спрете приема на Жанги

Можете да спрете приема на Жанги винаги, когато пожелаете. Ако не искате да забременявате, посъветвайте се с Вашия лекар за други ефикасни контрацептивни методи. Ако желаете да забременеете, спрете приема на Жанги и изчакайте един менструален цикъл преди да започнете опити за забременяване. Вие ще можете по-лесно да изчислите очакваната дата на раждане.

Ако имате някакви допълнителни въпроси по отношение на употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Ако получите никакви нежелани реакции, особено ако са тежки и упорити, или имате никаква промяна в здравословното състояние, за което смятате, че може да се дължи на Жанги, моля, говорете с Вашия лекар.

При всички жени, приемащи комбинирани хормонални контрацептиви, съществува по-висок риск от кръвни съсиреци във вените (венозна тромбоемболия (ВТЕ)) или кръвни съсиреци в артериите (артериална тромбоемболия (АТЕ)). За по-подробна информация относно различните рискове от употребата на комбинирани хормонални контрацептиви, моля, вижте точка 2 „Какво трябва да знаете, преди да приемете Жанги“.

Незабавно се свържете с лекар, ако почувствате някой от следните симптоми на ангиоедем: подуване на лицето, езика и/или гърлото и/или затруднено прегълъщане или уртикария, потенциално със затруднено дишане (вижте също раздел „Предупреждения и предпазни мерки“).

По-долу е поместен списък с нежеланите реакции, които са били свързани с употребата на Жанги:

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):

- депресивно настроение
- главоболие
- мигрена
- гадене
- менструални смущения, кървене между менструалните цикли, болка в гърдите, чувствителност на гърдите
- гъсто, белезникаво вагинално течение и вагинална гъбична инфекция

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души)

- уголемяване на гърдите, променен интерес към секса
- високо кръвно налягане, ниско кръвно налягане
- повръщане, диария
- акне, кожен обрив, силен сърбеж, косопад (алопеция)
- инфекция на влагалището
- задръжка на течности и промяна на телесното тегло

Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души)

- алергични реакции (свръхчувствителност), астма
- увреден слух
- кожно състояние еритема нодозум (характеризиращо се с болезнени червеникави възли по кожата) или еритема мултиформе (обрив със зачерявания под формата на мишена или възпаления)
- секретиране от гърдите
- увреждащи кръвни съсиреци във вена или артерия, например:
 - в крак или ходило (т.е. ДВТ)
 - в бял дроб (т.е. БЕ)
 - инфаркт



- инсулт
- мини-инсулт или преходни симптоми, наподобяващи инсулт, известни като преходна ишемична атака (ПИА)
- кръвни съсиреци в черния дроб, стомаха/червата, бъбреца или окото.

Вероятността за образуване на кръвен съсиrek може да бъде по-голяма, ако имате някакви други заболявания, които повишават този риск (вижте точка 2 за повече информация относно състоянията, които увеличават риска от кръвни съсиреци, както и симптомите при кръвен съсиrek).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Жанги

Съхранявайте Жанги на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 30°C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера/ картонената опаковка след фразата "Годен до:" или "EXP:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Жанги:

Активните вещества са етинилестрадиол 0,03 mg и дроспиренон 3 mg.

Другите съставки са:

Таблетно ядро: лактозаmonoхидрат, царевично нишесте, прежелатинизирано нишесте (царевично), кросповидон, повидон, полисорбат 80, магнезиев стеарат.

Обвивка: Поливинилов алкохол частично хидролизиран, титанов диоксид (E171), макрогол 3350, талк, жъlt железен оксид (E172).

Как изглежда Жанги и съдържание на опаковката



Таблетките са жълти, кръгли, филмирани таблетки с диаметър около 5,7 mm.

- Жанги е наличен в кутии от 1, 2, 3, 6 и 13 блистера, всеки от които съдържа по 21 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, D24PPT3

Ирландия

Производител

Laboratorios Leon Farma, S.A.

C/ La Vallina, s/n,

Polígono Industrial Navatejera,

Villaquilambre

24193 (León), Испания

Това лекарство е разрешено за употреба в държавите - членки на Европейското икономическо пространство под следните имена:

България	Жанги 0,03 mg/3 mg филмирани таблетки
Гърция	Estrofix 0.03 mg/3 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
Испания	Drosure 0,03 mg/3 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Ирландия	Ethinylestradiol/Drospirenone Leon Farma 0.03 mg/3 mg film coated tablets
Португалия	Drospirenona + Etinilestradiol Generis 3 mg + 0.03 mg Comprimidos revestidos por película

Дата на последно преразглеждане на листовката: 01/2025

