

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка: Приложение 2	20120243
Разрешение №	68525
ВССМА/МР	14-04-2025
Датум на издаване №	

Листовка: информация за потребителя №

Парацетамол Екофарм 500 mg таблетки
Paracetamol Ecopharm 500 mg tablets

парацетамол (*paracetamol*)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Парацетамол Екофарм и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Парацетамол Екофарм
3. Как да приемате Парацетамол Екофарм
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Парацетамол Екофарм
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Парацетамол Екофарм и за какво се използва

Парацетамол Екофарм съдържа парацетамол, който принадлежи към група лекарства, наречени аналгетици, които действат като намаляват болката и повишената температура.

Парацетамол Екофарм се използва за симптоматично лечение на слаба до умерена болка от различен произход: главоболие (включително тензионно главоболие и мигрена), невралгия, зъбобол, менструални болки, болки в гърба, ревматични и мускулни болки.

Парацетамол Екофарм се използва също за облекчаване на болката при възпалено гърло, при повишена телесна температура и болки вследствие на грип и простудни заболявания. Може да бъде използван също за облекчаване на лека до умерена артритна болка.

Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Парацетамол Екофарм

Не приемайте Парацетамол Екофарм

- ако сте алергични към парацетамол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако приемате други лекарства, съдържащи парацетамол.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Парацетамол Екофарм:

- ако страдате от чернодробно или бъбречно заболяване, включително чернодробно заболяване, дължащо се на злоупотреба с алкохол;



- ако страдате от лека до умерена форма на артрит и е необходимо да приемате ежедневно обезболяващи;
- ако имате поднормено тегло или страдате от недोхранване;
- ако употребявате редовно големи количества алкохол;
- ако имате тежка инфекция, тъй като това може да повиши риска от метаболитна ацидоза. Признаците на метаболитна ацидоза включват: дълбоко, учестено, затруднено дишане, гадене, повръщане, загуба на апетит.

Ако имате комбинация от тези симптоми, незабавно уведомете Вашия лекар. Може да се наложи напълно да избегнете употребата на парацетамол или да намалите количеството парацетамол, което да приемате.

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако:

- имате тежки заболявания, включително тежко бъбречно увреждане или сепсис (когато бактериите и токсините им циркулират в кръвта, което води до увреждане на органите), или ако страдате от недохранване, хроничен алкохолизъм или ако приемате флуоксацилин (антибиотик); Съобщава се за сериозно състояние, наречено метаболитна ацидоза (нарушение на кръвта и телесните течности), при пациенти в случаите, когато парацетамол се приема с постоянни дози за продължителен период от време или когато парацетамол се приема заедно с флуоксацилин. Симптомите на метаболитна ацидоза могат да включват: сериозни затруднения при дишане с дълбоко учестено дишане, сънливост, гадене и повръщане.

Други лекарства и Парацетамол Екофарм

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате:

- метоклопрамид, домперидон (за повлияване на гадене и повръщане);
- холестирамин (за лечение на висок холестерол);
- флуоксацилин (антибиотик) поради сериозен риск от аномалии в кръвта и течностите (наречени метаболитна ацидоза), които трябва да бъдат подложени на спешно лечение (вж. точка 2).

Ако приемате лекарства за разреждане на кръвта (антикоагуланти, напр. варфарин) и се нуждаете ежедневно от обезболяващи, уведомете Вашия лекар поради риск от възникване на кръвоизлив. Въпреки това, по време на прием на антикоагуланти е възможен ограничен прием на Парацетамол Екофарм.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Ако е необходимо, Парацетамол Екофарм може да се приема по време на бременност. Трябва да използвате най-ниската възможна доза, която намалява болката и/или сваля температурата и за възможно най-кратко време. Свържете се с Вашия лекар, ако болката и/или температурата не са намалели или ако трябва да приемате лекарството по-често.

Можете да приемате Парацетамол Екофарм докато кърмите.

3. Как да приемате Парацетамол Екофарм

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

За възрастни и деца над 12 години:



2 таблетки на всеки 4 часа при необходимост.
Да не се приемат повече от 8 таблетки за 24 часа.

Употреба при деца и юноши

Деца от 6-12 години:

½ (половин) до 1 таблетка на всеки 4 часа при необходимост.

Да не се приемат повече от 4 таблетки за 24 часа.

Да не се приема повече от 3 дни без консултация с лекар.

Да не се приема през интервали по-кратки от 4 часа.

Да не се превишава препоръчаната дневна доза.

Да не се дава на деца под 6-годишна възраст.

Ако сте приели повече от необходимата доза Парацетамол Екофарм

Ако сте приели повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре. Приемът на голямо количество парацетамол може да причини отложено във времето, но в същото време сериозно чернодробно увреждане.

Ако симптомите продължат или главоболието Ви стане постоянно, обърнете се към Вашия лекар.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите лекарствени реакции при употребата на парацетамол са редки. Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако:

- получите сериозна алергична реакция, включваща обрив и сърбеж, понякога съпроводена от подуване на устата или лицето или затруднено дишане;
- получите кожен обрив или лющене на кожата, както и при поява на язви в устата;
- сте имали проблеми с дишането при употреба на обезболяващи като ибупрофен или ацетилсалицилова киселина;
- имате неочаквано кървене или склонност към насиняване;
- изпитате гадене, внезапна загуба на тегло, загуба на апетит, пожълтяване на склерата (бялото на очите) и кожата.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

- сериозно състояние, при което може да има натрупване на киселина в кръвта (наречено метаболитна ацидоза) при пациенти с тежко заболяване, които използват парацетамол (вижте точка 2).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +35928903417, уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Парацетамол Екофарм

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.



Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Парацетамол Екофарм

- Активно вещество : парацетамол
- Една таблетка Парацетамол Екофарм съдържа 500 mg парацетамол.
- Други съставки: прежелатинизирано царевично нишесте и магнезиев стеарат

Как изглежда Парацетамол Екофарм и какво съдържа опаковката

Парацетамол Екофарм са бели, продълговати таблетки с делителна черта от едната страна. Предлагат се в опаковки от 20 таблетки в PVC/Al блистери.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

ЕКОФАРМ ГРУП АД
ул. Атанас Дуков №29, ет. 3,
1407 София, България
тел.: (02) 906 90 70
факс: (02) 906 90 71

Производител

ЕКОФАРМ ЕООД
ул. Атанас Дуков №29, ет. 3,
1407 София, България

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба ЕКОФАРМ ГРУП АД.

Дата на последно преразглеждане на листовката

