

## **ЛИСТОВКА**



Листовка: информация за потребителя

Към Рег. №

2001156

УРОСТИМ® за деца 25 mg таблетки

UROSTIM® Children 25 mg tablets

Разрешение №

МА-МР

68290

27-03-2025

Съставен №

Убити бактериални култури от (killed bacterial cultures of):  
*Escherichia coli* 29, *Escherichia coli* J5, *Proteus mirabilis*, *Enterococcus faecalis*,  
*Klebsiella pneumoniae*

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре до 10 дни или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

**Какво съдържа тази листовка:**

1. Какво представлява Уростим® за деца и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Уростим® за деца
3. Как да приемате Уростим® за деца
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Уростим® за деца
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

## 1. Какво представлява Уростим® за деца и за какво се използва

Уростим® за деца представлява полибактериален имуностимулатор, който повишава естествената резистентност на организма и специфичния имунитет към различни инфекции на урогениталния тракт чрез стимулиране на хуморалните и клетъчни фактори на имунната система. Активира системния и локален имунитет.

Препаратът Уростим® за деца е предназначен за перорална имунотерапия и имунопрофилактика на остри, рецидивиращи или хронични неспецифични заболявания на урогениталния тракт при деца, независимо от вида на причинителя. Особено препоръчително е приложението му при цистити, приелонефрити, уретрити, простатити, безсимптомна бактериурия и др. При необходимост се прилага с антибиотична терапия. Особено показно е приложението на Уростим® за деца при лица с потисната имунологична реактивност в резултат от продължителна антибиотична терапия.

## 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Уростим® за деца

**Не приемайте Уростим® за деца**

- ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

**Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Уростим® за деца.

**Други лекарства и Уростим® за деца**

Не е наблюдавана несъвместимост с други лекарствени средства.





Уростим® за деца може да бъде комбиниран с всяко друго лечение, включително и антибиотична терапия. Позволява многократно приложение без опасност от привикване. Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително и такива, отпускани без лекарско предписание.

**Уростим® за деца с храна, напитки и алкохол**  
Не е наблюдавана несъвместимост.

#### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Уростим® за деца не се препоръчва да се прилага през първите 3 месеца на бременността.

#### **Шофиране и работа с машини**

Уростим® за деца не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Уростим® за деца съдържа пшенично нишесте, което може да представлява опасност за хора с цьолиакия (непоносимост към глутен). Може да причини стомашно разстройство и диария.

### **3. Как да приемате Уростим® за деца**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Уростим® за деца се прилага под формата на таблетки от 25 mg за деца на възраст от 8 месеца до 14 години.

Уростим® за деца се прилага по следния начин:

В остър стадий на урогенитални инфекции едновременно с антибиотичната терапия се приема по една таблетка сутрин преди ядене до изчезване на симптомите, но не по-малко от 10 последователни дни.

При хронични или рецидивиращи урогенитални инфекции се прилага по една таблетка сутрин преди ядене в течение на 2 - 3 поредни месеца. След прекъсване най-малко три месеца е възможно повторение на лечебния курс.

За профилактика на постоперативни усложнения - един месец преди операцията и един месец след операцията да се приема по 1 таблетка дневно.

**Ако сте приели повече от необходимата доза Уростим® за деца**

До сега не са наблюдавани нежелани реакции при предозиране на Уростим® за деца.

**Ако сте пропуснали да приемете Уростим® за деца**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Продължете приема на Уростим® за деца по установената схема.

**Ако сте спрели приема Уростим® за деца**

Говорете с Вашия лекар, преди да прекъснете или прекратите преждевременно лечението.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

### **4. Възможни нежелани реакции**

До сега не са наблюдавани нежелани реакции при приложение на Уростим® за деца. Клиничните резултати показват много добра поносимост.





### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София,

тел.: + 359 28903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

### **5. Как да съхранявате Уростим® за деца**

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Уростим® за деца след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка след „Годен до:/ EXP:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

### **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

#### **Какво съдържа Уростим® за деца**

- **Активно вещество:** Всяка таблетка Уростим® за деца съдържа 25 mg лиофилизирани убити бактериални култури от: *Escherichia coli* 29, *Escherichia coli* J5 в количества съответстващи на  $1,5 \times 10^9$  клетки, и *Proteus mirabilis*, *Enterococcus faecalis*, *Klebsiella pneumoniae* в количества съответстващи на  $0,2 \times 10^9$  клетки от всеки вид.

**Помощни вещества са:** микрокристална целулоза, пшенично нишесте, колоиден безводен силициев диоксид, повидон, магнезиев стеарат, декстран 40 включен в състава на активното вещество.

#### **Как изглежда Уростим® за деца и какво съдържа опаковката**

Таблетките са с бял до бледо-кафяв цвят с мозаечна структура. Картонената кутия съдържа три блистера по десет таблетки.

Не използвайте Уростим® за деца ако забележите, че таблетките са с променен външен вид, напукани или натрошени.

#### **Притежател на разрешението за употреба и производител**

„БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕАД,  
бул. „Янко Сакъзов“ № 26,  
София 1504,  
България  
Тел.: +359 2 944 61 91  
Факс.: + 359 2 943 34 55

Дата на последно преразглеждане на листовката: март 2025 г.

