

Листовка: информация за пациента

Приложение 2

Винпоцетин Дансон 10 mg таблетки

Vinpocetine Danhson 10 mg tablets

винпоцетин /vinpocetine

Към Рег. №

20240228

Въздействие №

-66720

07-10-2024

BG/MA/MP

Съдържание №

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Винпоцетин Дансон за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Винпоцетин Дансон
3. Как да използвате Винпоцетин Дансон
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Винпоцетин Дансон
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Винпоцетин Дансон и за какво се използва

Активното вещество в това лекарство е винпоцетин, което се прилага за лечение на различни заболявания, които са свързани с нарушения на циркулацията на кръвта в мозъка.

Винпоцетин Дансон се прилага за подобряване на психичните и неврологични нарушения след мозъчен инсулт, при артериосклероза, травматични и други увреждания на мозъка, както и за лечение на заболявания свързани с хронични съдови нарушения на ретината и вътрешното ухо (шум в ушите, болест на Мениер, възрастово свързано намаление на слуха).

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Винпоцетин Дансон**Не приемайте Винпоцетин Дансон ако:**

- сте алергични към винпоцетин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- сте бременна или кърмите;
- сте жена в детеродна възраст и не използвате надежден метод за предпазване от забременяване;
- деца и юноши.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Винпоцетин Дансон.

Ако страдате от сърдечно заболяване, съпътствано от удължен QT интервал (наблюдавано отклонение в ЕКГ) или приемате лекарства, които предизвикват такива отклонения, Вашият лекар ще провежда редовен контрол чрез извършване на ЕКГ запис.

Това лекарство не трябва да се прилага при деца и юноши, тъй като липсват данни относно неговите ефекти при тях.



Други лекарства и Винпоцетин Дансон

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

Тези лекарства са:

- алфа метилдопа (използва се за понижаване на кръвното налягане);
- действащи върху централната нервна система;
- антикоагуланти (предотвратяват образуването на кръвни съсиреци);
- антиаритмици (лекарства за лечение на нарушения на сърдечния ритъм).

Винпоцетин Дансон с храна, напитки и алкохол

Няма ограничения.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Това лекарство не трябва да се приема по време на бременност и кърмене.

Ако сте жена в детородна възраст трябва да използвате надежден метод за предпазване от забременяване. В противен случай, приемът на винпоцетин е противопоказан за вас.

Шофиране и работа с машини

Винпоцетин Дансон не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Винпоцетин Дансон съдържа лактоза

Това лекарство съдържа като помощно вещество лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да използвате Винпоцетин Дансон

Винаги прилагайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчваните дози са както следва:

Възрастни

Препоръчителната доза е 3 пъти по 1 таблетка дневно.

Лица в старческа възраст

Няма специфични препоръки по отношение дозирането.

Пациенти с чернодробни и бъбречни заболявания

Не се налага промяна в дозата.

Начин и продължителност на приложение

Този лекарствен продукт е предназначен за прием през устата.

Таблетките се приемат с достатъчно количество вода след нахранване.

Ако сте приложили повече от необходимата доза Винпоцетин Дансон

Ако сте приели по-висока от препоръчаната доза е необходимо да се обърнете към Вашия лекар или да посетите най-близкото медицинско заведение.



Ако сте пропуснали да приемете необходимата доза Винпоцетин Дансон

Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Приложете дозата, веднага щом се сетите. Ако е време за следващата доза, продължете по обичайната схема.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Посочената по-долу честота е тази, с която са съобщавани нежеланите реакции по време на лечение с винпоцетин.

Нечести (срещат се при по-малко от 1 на всеки 100 души)

- промени в кръвното налягане (обичайно понижаване);
- главоболие;
- замаяност;
- сънливост;
- нарушения на съня, безсъние;
- слабост;
- гадене;
- киселини;
- сухота в устата.

Редки (срещат се при по-малко от 1 на всеки 1000 души)

- аритмия (бърз или неравномерен сърдечен ритъм или усещане за ускорен сърдечен ритъм);
- промяна в ЕКГ, описвана като депресия на ST-сегмента или удължаване на QT интервала;
- горещи вълни;
- алергични кожни реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ №8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като, съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Винпоцетин Дансон

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка [Годен до]. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Винпоцетин Дансон



- Активното вещество в една таблетка е винпоцетин (vinpocetine) 10 mg.
- Другите съставки (помощни вещества) са: StarLac® (смес от лактоза монохидрат и царевично нишесте в съотношение 85:15), талк, колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат.

Как изглежда Винпоцетин Дансон и какво съдържа опаковката

Винпоцетин Дансон са бели кръгли таблетки с хоризонтална делителна черта от едната страна и гладки от другата.

Делителната черта не е предназначена за счупване на таблетката.

Al/PVC блистери (15 таблетки в блистер).

Два блистера (30 таблетки), заедно с листовка за пациента в картонена кутия.

Шест блистера (90 таблетки), заедно с листовка за пациента в картонена кутия.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

ДАНСОН-БГ ООД

ул. „Отец Паисий“ № 26

2400 Радомир

България

тел.: +35924519300

e-mail: office@danhson.com

Производител

ВЕТПРОМ АД

ул. „Отец Паисий“ № 26

2400 Радомир

България

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

ДАНСОН-БГ ООД

ул. „Отец Паисий“ № 26

2400 Радомир

България

тел.: +35924519300

e-mail: office@danhson.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

08/2024

