

Листовка: Информация за пациента

МЕМОЦИТ 1000 mg/10 ml перорален разтвор
MEMOCIT 1000 mg/10 ml oral solution

ситиколин/citicoline

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	20250029
Разрешение №	19-05-2025
BG/MVMP	-68905
Съставител	

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано единствено на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Мемоцит и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Мемоцит
3. Как да приемате Мемоцит
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Мемоцит
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Мемоцит и за какво се използва

Мемоцит съдържа активното вещество - ситиколин, което принадлежи към група лекарства, наречени психостимуланти и ноотропи (т.нар. "подобрители на паметта"). Тези лекарства действат, като подобряват мозъчната функция.

Мемоцит се използва за лечение на неврологични и когнитивни нарушения, причинени от:

- прекъсване на кръвоснабдяването на мозъка поради съсирек или увреждане на кръвоносните съдове в мозъка (напр. инсулт);
- травма на главата (напр. в резултат на удар).

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Мемоцит

Не приемайте Мемоцит:

- Ако сте алергични към ситиколин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- Ако имате повишен тонус на парасимпатиковата нервна система, което е сериозно състояние със симптоми като ниско кръвно налягане, прекомерно изпотяване, ускорен пулс и припадък.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Мемоцит:

- ако сте алергични към ацетилсалицилова киселина, тъй като това лекарство може да предизвика пристъпи на астма.



Деца

Няма достатъчно данни за употребата на Мемоцит при деца, затова трябва да се прилага само ако Вашият лекар прецени, че е необходимо.

Други лекарства и Мемоцит

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Ситиколин засилва ефекта на лекарства, които съдържат L-допа (наричани още леводопа, използват се за лечение на Паркинсон), само лекар може да прецени съвместната им употреба.

Не се препоръчва съвместната употреба на ситиколин с меклофеноксат (лекарство, което стимулира мозъчната функция).

Мемоцит с храна и напитки

Мемоцит може да се приема със и без храна.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Мемоцит не повлиява Вашата способност за шофиране или работа с машини.

Мемоцит съдържа некрystalизиращ течен сорбитол (E420).

Сорбитол е източник на фруктоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че Вие или Вашето дете имате непоносимост към някои захари или Ви е поставена диагноза наследствена непоносимост към фруктоза, рядко генетично заболяване, при което хората не могат да разграждат фруктозата, говорете с Вашия лекар преди Вие или Вашето дете да приемете това лекарство. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, говорете с Вашия лекар преди да приемете това лекарство.

Мемоцит съдържа пропилпарахидроксибензоат (E216), метилпарахидроксибензоат (E218) и кохинил червено (E124).

Това лекарство може да причини алергични реакции (вероятно от забавен тип).

Мемоцит съдържа 77 mg натрий (основна съставка на готварската/трапезната сол) във всяко саше.

Това количество е еквивалентно на 3,85 % от препоръчителния максимален дневен хранителен прием на натрий за възрастен.


3. Как да приемате Мемоцит

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е 1 до 2 сашета дневно в зависимост от състоянието на пациента.

Това лекарство може да се приема директно от сашето или разтворен в половин чаша вода (приблизително 120 ml), по време или между храненията.





1. Задръжете Мемоцит 1000 mg саше и разклатете добре.



2. С другата си ръка разкъсайте сашето по линията, маркирана със стрелките.



3. Може да приемете лекарството директно от сашето или



4. след като го разтворите в половин чаша вода (120 ml).

Ако сте приели повече от необходимата доза Мемоцит

Ако сте приели по-висока доза от предписаната, незабавно се консултирайте с лекар. Вземете с Вас опаковката на лекарството или тази листовка, за да знае лекарят какво лекарство сте приели.

Ако сте пропуснали да приемете Мемоцит

Вземете дозата си възможно най-скоро.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Мемоцит

Вашият лекар ще Ви каже колко дълго трябва да приемате Мемоцит. Не спирайте приема на лекарството без да се посъветвате с лекаря си.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много редки (засягат по-малко от 1 от 10 000 души):

- халюцинации
- главоболие, световъртеж
- промени в кръвното налягане (високо или ниско кръвно налягане)
- задух



- гадене, повръщане, диария
- зачервяване, сърбеж, обрив
- оток
- втрисане.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303, София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Мемоцит

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и сашето след Годен до:/EXP. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Мемоцит

- Активното вещество е ситиколин.
Всеки ml разтвор съдържа 100 mg ситиколин (като натриева сол).
Всяко саше (10 ml разтвор) съдържа 1000 mg ситиколин (като натриева сол).
- Другите съставки са некрystalизиращ течен сорбитол (E420), глицерол, метилпарахидроксибензоат (E218), пропилпарахидроксибензоат (E216), калиев сорбат, захарин натрий, глицерол-формал, кохинил червено (E124), лимонена киселина, натриев цитрат, ягодав вкус (съдържа пропиленгликол (E1520), овкусители) и пречистена вода.

Как изглежда Мемоцит и какво съдържа опаковката

Мемоцит е бистър, розов перорален разтвор с мирис и вкус на ягода.

Това лекарство се предлага в PET/бял екструдирани PE/Alu/екструдирани съполимер EAA сашета, съдържащи 10 ml разтвор, в картонена кутия.

Опаковката съдържа 10 сашета с 10 ml разтвор.



Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
Полша

Производител

SAG Manufacturing S.L.U.
C/ta N-I, Km 36
San Agustin de Guadalix
28750 Madrid
Испания

Galenicum Health, S.L.U.
Sant Gabriel, 50
Esplugues de Llobregat
08950 Barcelona
Испания

Този лекарствен продукт е разрешен в държавите членки на ЕИП под следните наименования:

Полша	Memocit, 1000 mg/10 ml, roztwór doustny
България	Мемоцит 1000 mg/10 ml перорален разтвор

Дата на последно преразглеждане на листовката

