

Листовка: информация за потребител

Форма - Приложение 2

Роз. №

9500006

Стрепсилс Мед и Лимон 1,2 mg /0,6 mg таблетки за смучене
2,4-Дихлорбензилов алкохол/ Амилметакрезол.....

08-02-2022

Strepsils® Honey and Lemon 1,2 mg /0,6 mg lozenges
2,4-Dichlorobenzyl alcohol/ Amylmetacresol

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Стрепсилс Мед и Лимон и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Стрепсилс Мед и Лимон
3. Как да приемете Стрепсилс Мед и Лимон
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Стрепсилс Мед и Лимон
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Стрепсилс Мед и Лимон и за какво се използва

Стрепсилс Мед и Лимон принадлежи към група лекарствени продукти наричани антисептици.

Стрепсилс Мед и Лимон се препоръчва за лечение и облекчаване на симптомите при инфекциозно-възпалителни заболявания на устната кухина (стоматити, фарингити, ларингити).

Притежава антибактериални, противогъбични и антивирусни свойства.

Ефектът се проявява в първите 5 минути и продължава до 2 часа след приложението на лекарствения продукт.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Стрепсилс Мед и Лимон

Не приемайте Стрепсилс Мед и Лимон

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към 2,4-Дихлорбензилов алкохол, Амилметакрезол или към някоя от останалите съставки на Стрепсилс Мед и Лимон, посочени в т.6;
- от деца под 6 годишна възраст.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Стрепсилс Мед и Лимон.

Обърнете специално внимание при употреба на Стрепсилс Мед и Лимон

- ако имате захарен диабет – виж раздел **Важна информация за някои от съставките на Стрепсилс Мед и Лимон**



Деца

Този лекарствен продукт е противопоказан при деца под 6 годишна възраст.

Други лекарства и Стрепсилс Мед и Лимон

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, насъкоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не са известни взаимодействия с други лекарствени продукти.

Приложение на Стрепсилс Мед и Лимон с храни и напитки

Стрепсилс Мед и Лимон не трябва да се прилага с храни и напитки. Да се прилага между храненията.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Макар че безопасността на продукта по време на бременност не е била установена, лекарственият продукт може да се приема с внимание от бременни жени. При необходимост да се потърси консултация от лекар.

Кърмене

Не е известно дали 2,4-Дихлорбензилов алкохол, Амилметакрезол или техните метаболити се екскретират в майчиното мляко. Безопасността на това лекарство по време на кърмене не е установена. Не може да се изключи риска за новородените/бебетата. Този лекарствен продукт трябва да се прилага с внимание при кърмещи жени.

Фертилитет

Няма налични данни за ефекта върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини

Стрепсилс Мед и Лимон не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация за някои от съставките на Стрепсилс Мед и Лимон

Това лекарство съдържа съвсем малки количества глутен (от пшенично нишесте). Счита се, че е „без глутен“ и е малко вероятно да предизвика проблеми ако имате цъолиакия.

Една таблетка за смучене съдържа не повече от 19,52 микрограма глутен.

Ако имате алергия към пшеница (което е различно от цъолиакия), Вие не трябва да приемате това лекарство.

Стрепсилс Мед и Лимон съдържа 0,98 g глюкоза и 1,44 g захароза на една таблетка за смучене. Трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет .

Това лекарство съдържа в една таблетка за смучене 100,90 mg инвертна захар (мед).

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете този лекарствен продукт.

Това лекарство съдържа аромати с Цитрал, d-Лимонен, Гераниол и Линалоол, които могат да причинят алергични реакции.



Това лекарство съдържа бутилхидроксианизол (Е 320): може да причини локални кожни реакции (например контактен дерматит) или дразнене на очите и лигавиците.

Съдържа сулфити (силициев диоксид (Е 220)): В редки случаи може да причини тежки реакции на свръхчувствителност и бронхоспазъм.

3. Как да приемете Стрепсилс Мед и Лимон

Винаги приемайте Стрепсилс Мед и Лимон точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Да се използва най-ниската ефективна доза за най-кратък период от време необходим за облекчаване на симптомите.

Възрастни и деца над 6 години

Една таблетка се смуче бавно през 2 – 3 часа; таблетките за смучене се оставят в устата до пълното им разтваряне; да не се дъвчат или погълват цели; приемат се между храненията. Както при други подобни лекарствени продукти, Вие трябва да сменяте позицията на таблетките за смучене във вътрешността на устата до тяхното разтваряне, за да се избегне риска от локално дразнене. Да не се превишава препоръчваната доза (максимум 8 таблетки за смучене за 24 часа).

Употреба при деца

Деца под 6 годишна възраст не трябва да използват този продукт.

За да се избегне риска от задавяне, Стрепсилс Мед и Лимон се прилага само при деца, които могат без надзор да задържат таблетката за смучене в устата докато тя се разтваря бавно.

Пациенти в старческа възраст

При пациенти в старческа възраст не е необходимо да се намалява дозата.

Лечението не трябва да продължава повече от 5 дни, тъй като може да доведе до дисбаланс на устната микробна флора и риск от бактериална или гъбична инфекция.

Ако сте приемали повече от необходимата доза Стрепсилс Мед и Лимон

Може да се появи стомашно-чревен дискомфорт; употребата трябва да се прекрати и да се започне симптоматично лечение – за тази цел трябва да се консултирате с Вашия лекар или център за спешна помощ.

Ако сте пропуснали да приемете Стрепсилс Мед и Лимон

Не вземайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата таблетка за смучене.

Ако спрете да приемете Стрепсилс Мед и Лимон

Ако спрете приема твърде скоро, това няма да се отрази на Вашето състояние.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Стрепсилс Мед и Лимон може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.



Възможните нежелани лекарствени реакции, които могат да бъдат свързани с Амилметакрезол и 2,4-Дихлорбензилов алкохол са представени по-долу, групирани по система-орган клас класификацията и честота.

Честотата се определя както следва:

Много чести ($\geq 1/10$);

Чести ($\geq 1/100$ до $< 1/10$);

Нечести ($\geq 1/1,000$ до $< 1/100$);

Редки ($\geq 1/10,000$ до $< 1/1,000$);

Много редки ($< 1/10,000$);

С неизвестна честота (не може да бъде определена от наличните данни).

В отделните групи по честота нежеланите реакции са представени в низходящ ред според степента на сериозност.

С неизвестна честота

Реакциите на свърхчувствителност могат да се проявят под формата на:

Обрив, ангиоедем, уртикария, бронхоспазъм и хипогония със синкоп;

Болки в корема, гадене, дискомфорт в устната кухина.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Стрепсилс Мед и Лимон

Не използвайте Стрепсилс Мед и Лимон след срока на годност отбелаян на картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхраняват под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнери за домашни отпадъци. Политайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Стрепсилс Мед и Лимон

Активните вещества са: 2,4-Дихлорбензилов алкохол 1,2 mg и Амилметакрезол 0,6 mg.

Другите съставки са: мед, винена киселина, ментово масло, лимоново масло, течна захароза, течна глюкоза, оцветител Е 104.

Как изглежда Стрепсилс Мед и Лимон и какво съдържа опаковката



Жълто оцветена ovalна таблетка за смучене с характерен вкус на мед и лимон и отпечатано лого S от двете страни.

Опаковките Стрепсилс Мед и Лимон съдържат 12, 24 и 36 таблетки за смучене в блистери от твърдо алюминево фолио PVC/PVDC и картонена кутия.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба:

Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L.

48 Iancu de Hunedoara Boulevard, Building Crystal Tower
11th Floor, District 1, Bucharest, Румъния

Производител:

RB NL Brands B.V.

Schiphol Boulevard 207

1118 BH Schiphol,

Нидерландия

Моля свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за употреба за да получите допълнителна информация за лекарствения продукт.

Дата на последно преразглеждане на листовката: ноември, 2021

