

ЛИСТОВКА



Листовка: информация за пациента

20060153

Лориста® HD 100 mg/25 mg филмирани таблетки
лосартан калий/хидрохлоротиазид

Разрешение №

68458

17-07-2025

Списание №

Lorista® HD 100 mg/25 mg film-coated tablets
losartan potassium/hydrochlorothiazide

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежеланите лекарствени реакции уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

В тази листовка:

1. Какво представлява Лориста HD и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Лориста HD
3. Как да приемате Лориста HD
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Лориста HD
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Лориста HD и за какво се използва

Лориста HD е комбинация от ангиотензин II рецепторен антагонист (лосартан) и диуретик (хидрохлоротиазид). Ангиотензин II е вещество, произвеждано в организма, което се свързва с рецепторите в кръвоносните съдове, причинявайки свиването им. В резултат се повишава налягането на кръвоносните съдове. Лосартан предотвратява свързването на ангиотензин II към тези рецептори, като отпуска кръвоносните съдове и това съответно води до понижаването на кръвното налягане. Хидрохлоротиазид действа като стимулира бъбреците да отделят повече вода и соли. Това също подпомага понижаване на кръвното налягане.

Лориста HD е показан за лечение на есенциална хипертония (високо кръвно налягане).

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Лориста HD**Не приемайте Лориста HD:**

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към лосартан и/или хидрохлоротиазид, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6),
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към група лекарства, наречени „сулфонамидни производни“ (напр. други тиазиди, някои антибактериални лекарства като ко-тримоксазол. Попитайте Вашия лекар, ако не сте сигурни),
- ако имате тежко увредена чернодробна функция,
- ако сте с ниско ниво на калий, ниско ниво на натрий или високи нива на калий, които не могат да бъдат коригирани с лечение,
- ако боледувате от подагра,



- ако сте бременна след 3-тия месец (Добре е да се избягва приема на Лориста HD и в ранна бременност – вижте точка „Бременност и кърмене”),
- ако имате тежко увредена бъбречна функция или бъбреците Ви не отделят никаква урина,
- ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.


Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Лориста HD 100 mg/25 mg.

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте (или може би сте) бременна. Лориста HD не се препоръчва през ранната бременност и не трябва да се приема при бременност след третия месец, тъй като може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе, ако се използва в този етап (вижте точка „Бременност”).

Важно е да кажете на Вашия лекар, преди да приемете Лориста HD:

- ако преди сте имали подуване на лицето, устните, гърлото и/или езика
- ако приемате диуретици (таблетки за отделяне на повече урина)
- ако сте на диета с ограничен прием на сол
- ако имате или сте имали тежко повръщане и/или диария
- ако имате сърдечна недостатъчност
- ако имате увредена чернодробна функция (вж. точка 2 „Не приемайте Лориста HD”)
- ако имате стеснение на артериите към Вашите бъбреци (стеноза на бъбречната артерия) или сте само с един функциониращ бъбрек, или неотдавна Ви е бил присаден бъбрек
- ако имате стеснение на артериите (атеросклероза), стенокардия (болка в гърдите поради слаба сърдечна функция)
- ако сте с „аортна или митрална стеноза” (стеснение на клапите на сърцето) или „хипертрофична кардиомиопатия” (заболяване, причиняващо задебеляване на сърдечния мускул)
- ако сте с диабет
- ако сте имали подагра
- ако имате или сте имали алергично състояние, астма или състояние, което причинява ставна болка, кожни обриви и треска (системен лупус еритематодес)
- ако сте с високи нива на калций и ниски на калий или сте на диета с ограничен прием на калий
- ако ще Ви бъде прилагана анестезия (дори при зъболекар) или Ви предстои операция, или ще Ви бъдат правени изследвания за определяне на функцията на паращитовидна жлеза; трябва да уведомите своя лекар или медицински персонал, че вземате таблетки лосартан калий и хидрохлоротиазид
- ако боледувате от първичен хипералдостеронизъм (синдром, свързан с повишена секреция на хормона алдостерон от надбъбречните жлези, причинен от аномалии в жлезите)
- ако приемате други лекарства, които могат да повишат нивото на серумен калий (вижте точка 2 „Други лекарства и Лориста HD”)
- ако сте имали рак на кожата или ако развиете неочаквана кожна лезия по време на лечението. Лечението с хидрохлоротиазид, особено продължителната употреба на високи дози, може да повиши риска от някои видове рак на кожата и устните (немеланомен рак на кожата). Защитете кожата си от излагане на слънце и ултравиолетовите лъчи, докато приемате Лориста HD.
- ако сте имали проблеми с дишането или белите дробове (включително възпаление или течност в белите дробове) след прием на хидрохлоротиазид в миналото. Ако получите тежък задух или затруднено дишане след прием на Лориста HD, незабавно потърсете медицинска помощ.
- ако почувствате, че зрението Ви намалява, или болка в окото. Това могат да бъдат симптоми на натрупване на течност в съдовия слой на окото (хороидален излив), или увеличаване на налягането във Вашето око и могат да се появят в рамките на часове до



седмица от приема на Лориста HD. Ако не се лекува, това може да доведе до трайна загуба на зрението. Ако преди сте имали алергия към пеницилини или сулфонамиди, можете да бъдете изложени на по-висок риск от развитие на това събитие.

- ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:
 - ACE инхибитор (например еналаприл, лизиноприл, рамиприл), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета,
 - алискирен.

Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви.

Говорете с Вашия лекар, ако получите коремна болка, гадене, повръщане или диария след прием на Лориста HD. Вашият лекар ще вземе решение за по-нататъшно лечение. Не спирайте да приемате лекарството Лориста HD самостоятелно.

Вижте също информацията, озаглавена “Не приемайте Лориста HD”.

Деца и юноши

Няма опит с използване на Лориста HD при деца. Поради това Лориста HD не трябва да се прилага в детска възраст.

Други лекарства и Лориста HD

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате калиеви добавки, калий-съдържащи заместители на солта, калий-съхраняващи лекарства или други лекарства, които могат да повишат нивото на серумен калий (напр. лекарства, съдържащи триметоприм), тъй като комбинацията им с Лориста HD не се препоръчва.

Диуретичните лекарства, като хидрохлоротиазид, съдържащ се в Лориста HD могат да взаимодействат с други лекарства.

Лекарства, съдържащи литий не следва да се приемат с Лориста HD без непрекъснат контрол от Вашия лекар.

Могат да бъдат уместни и специални предпазни мерки (напр. кръвни изследвания), ако приемате други диуретици (лекарства за отделяне на повече урина), някои слабителни, лекарства за лечение на подагра, лекарства за контролиране на сърдечния ритъм или за диабет (перорални лекарства за лечение на диабет или инсулин).

Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки:

- ако приемате ACE инхибитор или алискирен (вижте също информацията, озаглавена “Не приемайте Лориста HD” и “Предупреждения и предпазни мерки”)

Важно е също Вашият лекар да е информиран, ако приемате:

- други лекарства, които понижават кръвното налягане,
- стероиди,
- лекарства за лечение на рак,
- болкоуспокояващи,
- лекарства за лечение на гъбични инфекции,
- артрит,
- смоли, използвани при висок холестерол, като холестирамин,
- лекарства за отпускане на мускулите,



- таблетки за сън,
- опиати като морфин,
- „пресорни амини“ като адреналин или други лекарства от същата група,
- перорални лекарства за лечение на диабет или инсулини.

Моля, информирайте Вашия лекар, че провеждате лечение с Лориста HD, ако Ви предстои радиографска процедура и се планира приложение на йод-съдържащи контрастни материи.

Лориста HD с храна, напитки и алкохол

Съветваме Ви да не пиете алкохол докато приемате тези таблетки: алкохолът и Лориста HD таблетки могат взаимно да засилят ефектите си.

Прекомерното приемане на сол с храната може да противодейства на ефекта на таблетките Лориста HD. Таблетките Лориста HD могат да се вземат по време или независимо от храненето. Сокът от грейпфрут трябва да се избягва, докато се приемат таблетки Лориста HD.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте (или може би сте) бременна. Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете приема на Лориста HD преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна и ще Ви посъветва да започнете да вземате друго лекарство вместо Лориста HD. Лориста HD не се препоръчва по време на бременност и не трябва да се приема след третия месец от бременността, тъй като може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе.

Кърмене

Кажете на Вашия лекар, ако кърмите или предстои да започнете да кърмите. Лориста HD не се препоръчва за майки, които кърмят и Вашият лекар ще избере друго лечение за Вас, ако желаете да кърмите.

Употреба при пациенти в старческа възраст

Лориста HD действа еднакво добре и се понася еднакво добре от повечето възрастни и по-млади пациенти. Повечето по-възрастни пациенти се нуждаят от същата доза, която се прилага и при по-млади пациенти.

Шофиране и работа с машини


Когато започнете лечение с това лекарство, не трябва да извършвате дейности, изискващи специално внимание (например да карате кола или да работите с опасни машини), докато не разберете как понасяте лекарството.

Лориста HD съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Лориста HD

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Вашият лекар ще реши коя е подходящата доза Лориста HD в зависимост от Вашето състояние и това, дали приемате други лекарства. Важно е да продължите да приемате Лориста HD толкова дълго, колкото е предписал Вашият лекар, това ще осигури постоянен контрол на Вашето кръвно налягане.



Високо кръвно налягане

Обичайната начална и поддържаща доза за повечето пациенти е 1 таблетка Лориста Н (50 mg/12,5 mg) дневно. При необходимост Вашият лекар ще повиши дозата до 2 таблетки Лориста Н един път дневно или до 1 таблетка Лориста HD (лосартан 100 mg/хидрохлоротиазид 25 mg) дневно.

Максималната дневна доза е 1 таблетка дневно Лориста HD (100 mg/25 mg).

Ако имате впечатление, че ефектът на лекарството е твърде силен или твърде слаб, уведомете за това Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Лориста HD

Ако сте приели повече от необходимата доза Лориста HD, незабавно уведомете Вашия лекар, за да получите нужната медицинска помощ своевременно.

Предозирането може да причини спад на кръвното налягане, палпитации, забавен пулс, промяна в кръвните електролити и дехидратация.

Ако сте пропуснали да приемете Лориста HD

Опитайте се да приемате Лориста HD така, както Ви е предписана.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Приемете следващата доза в обичайното време.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако получите подобна реакция, спрете приема на Лориста HD таблетки и незабавно уведомете Вашия лекар или отидете в спешното отделение на най-близката болница:

Тежка алергична реакция (обрив, сърбеж, оток на лицето, устните, устата или гърлото, което може да причини затруднено преглъщане или дишане).

Това е тежка, но рядка нежелана реакция, която засяга повече от 1 на 10 000 пациенти, но по-малко от 1 на 1 000 пациенти. Може да Ви е нужна спешна медицинска помощ или хоспитализация.

Наблюдавани са следните нежелани реакции:

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

- кашлица, инфекция на горните дихателни пътища, запушване на носа, синусит, нарушения в синусите,
- диария, коремна болка, гадене, диспепсия (нарушено храносмилане),
- мускулна болка или спазъм, болка в крака, болка в гърба,
- безсъние, главоболие, замаяване,
- слабост, умора, болка в гърдите,
- повишени нива на калий (което може да причини нарушение на сърдечния ритъм), понижени нива на хемоглобин,
- промяна в бъбречната функция, включително бъбречна недостатъчност,
- твърде ниски нива на кръвна захар (хипогликемия).

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

- анемия, червени или кафеникави петна по кожата (понякога особено по ходилата, краката, ръцете и хълбоците, със ставна болка, подуване на ръцете и ходилата и



- стомашна болка), понижение на белите кръвни клетки, проблеми със съсирването на кръвта и намален брой тромбоцити,
- загуба на апетит, повишени нива на пикочна киселина или подагра, повишени нива на кръвна захар, абнормни кръвни нива на електролити,
 - тревожност, нервност, паническо разстройство (повтарящи се пристъпи на паника), объркване, депресия, абнормни сънища, нарушен сън, сънливост, увреждане на паметта,
 - изтръпване и мравучкане или подобно усещане, болка в крайниците, тремор, мигрена, загуба на съзнание,
 - замъглено зрение, парене или смъдене в очите, конюнктивит, влошено зрително поле, виждане на предметите в жълто,
 - различни шумове в ушите – звънене, жужене, грохот или щракане, вертиго,
 - ниско кръвно налягане, което може да е свързано с промяна на положението (замайване или слабост при ставане, гръдна жаба (болка в гърдите), неритмична сърдечна дейност, мозъчносъдов инцидент (преходен исхемичен пристъп, „мини инсулт“), сърдечен пристъп, сърцебиене,
 - възпаление на кръвоносните съдове, често свързано с кожен обрив или синини,
 - възпалено гърло, задух, бронхит, пневмония, вода в белите дробове (причиняваща затруднено дишане), кръвене от носа, отделяне на секрция от носа, запушване на носа,
 - запек, хроничен запек, отделяне на газове, нервен стомах със стомашни спазми, повръщане, сухота в устата, възпаление на слюнчените жлези, зъбобол,
 - жълтеница (пожълтяване на очите и кожата), възпаление на панкреаса,
 - уртикария, сърбеж, възпаление на кожата, обрив, зачервяване на кожата, чувствителност към светлина, суха кожа, изчервяване, изпотяване, косопад,
 - болка в ръцете, раменете, бедрата, колената или други стави, подуване на ставите, схващане, мускулна слабост,
 - често уриниране, включително нощем, абнормна бъбречна функция, включително възпаление на бъбреците, инфекция на пикочните пътища, захар в урината,
 - понижено сексуално желание, импотентност,
 - оток на лицето, локализиран оток (едем), треска.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

- хепатит (възпаление на черния дроб), нарушени показатели на чернодробната функция,
- интестинален ангиоедем: подуване на червата, проявяващо се със симптоми като коремна болка, гадене, повръщане и диария.

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

- остър респираторен дистрес (признаците включват тежък задух, повишена температура, слабост и обърканост).

С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни):

- рак на кожата и устните (немеланомен рак на кожата),
- намаляване на зрението или болка в окото поради високо налягане (възможни признаци за натрупване на течност в съдовия слой на окото (хороидален излив) или остра закритоъгълна глаукома),
- грипоподобни симптоми,
- необясними болки в мускулите с тъмна урина (с цвят на чай) (рабдомиолиза),
- ниски нива на натрий в кръвта (хипонатриемия),
- общо неразположение,
- нарушено усещане за вкус (дисгеузия).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата



ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Лориста HD

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:“.

Да се съхранява под 30°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Лориста HD

- Активните вещества са лосартан калий (*losartan potassium*), хидрохлоротиазид (*hydrochlorothiazide*).
Всяка филмирана таблетка Лориста HD съдържа 100 mg лосартан калий и 25 mg хидрохлоротиазид.
- Другите вещества са: микрокристална целулоза, лактоза монохидрат, прежелатинирано нишесте, магнезиев стеарат, хипромелоза, макрогол 4 000, оцветител хинолиново жълто (E104), талк, титанов диоксид (E171). Вижте точка 2 „Лориста HD съдържа лактоза“.

Как изглежда Лориста HD и какво съдържа опаковката

Лориста HD филмирани таблетки: жълти, овални, леко двойнизпъкнали таблетки.
Налични са кутии с 28, 30 и 90 филмирани таблетки в блистерна опаковка.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

Дата на последно одобрение на листовката

27 Юни 2025

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Изпълнителна Агенция по Лекарствата (ИАЛ) <http://www.bda.bg>.

