

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗЕНИЕТО  
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА  
Листовка - Приложение № 1  
Именен лист № 20050229  
38077 / 07-06-2017  
Диспансизация №

**Листовка: информация за пациента**

**ЦИКЛО 3 ФОРТ 150 mg/150 mg/100 mg твърди капсули**  
Бодлив залист, сух екстракт/Хесперидин метил халкон/Аскорбинова киселина

**CYCLO 3 FORT 150 mg/150 mg/100 mg capsules, hard**  
Rusci aculeati extractum siccum/Hesperidin methyl chalcon/Ascorbic acid

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след няколко дни в случай на хемороидална криза или след 14 дни в случай на нарушена венозна циркулация не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

**Какво съдържа тази листовка**

1. Какво представлява Цикло 3 Форт и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемате Цикло 3 Форт
3. Как да използвате Цикло 3 Форт
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Цикло 3 Форт
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява Цикло 3 Форт и за какво се използва**

Цикло 3 Форт е комбинация от три активни съставки: екстракт от бодлив залист, хесперидин метил халкон и аскорбинова киселина (Витамин С).

Цикло 3 Форт принадлежи към група лекарства, наречени капилярно-стабилизиращи агенти (сърдечно-съдова система).

Това лекарство е венотоник и вазопротектор (увеличава венозната тоничност и резистентността на капилярните кръвоносни съдове и намалява съдовия пермеабилитет).

Цикло 3 Форт се използва при възрастни за:

- лечение на венозни циркулаторни нарушения (тежест в долните крайници, болка, постфлебитен синдром);
- лечение на симптоми, съпътстващи хемороидалните кризи (оток, болка, парене, сърбеж).



## **2. Какво трябва да знаете, преди да приемате Цикло 3 Форт**

### **Не приемайте Цикло 3 Форт**

- ако сте алергични към активните вещества (бодлив залист, хесперидин метил халкон и/или аскорбинова киселина (Витамин С) или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако имате нарушения в натрупването на желязо (таласемия, хемохроматоза, сидеробластна анемия), което е свързано с присъствието на аскорбинова киселина (Витамин С) в състава на лекарството.

### **Предупреждения и предпазни мерки**

- в случай на поява на диария прекъснете лечението и съобщете на Вашия лекар (вж. точка Възможни нежелани реакции).
- нарушения във венозната циркулация: ако дискомфортът и/или крехкостта на съдовете не се облекчат в рамките на две седмици лечение, консултирайте се с Вашия лекар.
- хемороидални кризи: приемът на това лекарство не е заместител на специфично лечение на други състояния в аналната област. Ако хемороидалните нарушения не се повлияят след няколкодневно лечение, обезателно се консултирайте с Вашия лекар.

Аскорбиновата киселина (Витамин С) може да повлияе резултатите от лабораторни тестове като определяне на кръвната захар, билирубин, нива на трансаминази, лактат и други.

### **Деца и юноши**

Неприложимо

### **Други лекарства и Цикло 3 Форт**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

### **Цикло 3 Форт с храна, напитки и алкохол**

Неприложимо

### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Като предпазна мярка е препоръчително да се избягва употребата на Цикло 3 Форт по време на бременност и не трябва да се използва по време на кърмене.

Цикло 3 Форт съдържа оцветителен агент Сънсет жълто (E110), който може да причини алергични реакции.

### **Шофиране и работа с машини**

Неприложимо

## **3. Как да приемате Цикло 3 Форт**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е 2 до 3 твърди капсули Цикло 3 Форт на ден при лечение на симптоми, свързани с лимфна и венозна недостатъчност (тежест в краката, болка, постфлебитен синдром).



Цикло 3 Форт се използва в доза 4 до 5 капсули дневно при лечение на функционални симптоми на хемороидални кризи.

Капсулите трябва да бъдат поглъщани цели с чаша вода.

Обичайната продължителност на лечението:

- при венозни циркулаторни нарушения: ако дискомфорта и/или чупливостта на съдовете не са се подобрили след две седмици лечение, консултирайте се с Вашия лекар.
- при хемороидални кризи: лечението трябва да е кратко. Ако хемороидалните нарушения продължават след няколко дни лечение (не повече от една седмица), от значение е да се консултирате с Вашия лекар.

**Употреба при деца и юноши**  
Неприложимо

**Ако сте приели повече от необходимата доза Цикло 3 Форт**  
Високи дози на аскорбинова киселина (Витамин С-в състава на Цикло 3 Форт) може да предизвикат хемолитична анемия при пациенти с G6PD (ензима глюкозо-6- фосфат дехидрогеназа). Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

**Ако сте пропуснали да приемете Цикло 3 Форт**  
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

**Ако сте спрели приема на Цикло 3 Форт**  
Неприложимо

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции, които могат да се появят са:

•Чести (могат да засегнат до 1 на 10 човека):

- диария, понякога силно изявена, което налага бързото прекратяване на лечението (вж. точка 2 Предупреждения и предпазни мерки)
- абдоминална болка.

•Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 човека):

- инсомния (трудно заспиване), диспепсия (функционално хранително разстройство), гадене, еритема (кожно зачервяване), пруритус (сърбеж), мускулни спазми, силна болка (в ръцете и/или краката)

•Редки ( могат да засегнат до 1 на 1,000 човека):

- нервност, вертиго, периферно чувство за студ (студенина в ръцете и/или краката), болка във вените (чувствителни вени), стомашно- чревни нарушения, афтозен стоматит (възпаление на устната кухина с наличие на везикули), повишение на аланин аминотрансферазата (увеличение на чернодробен параметър)



- С неизвестна честота (не може да се определи честотата от наличните данни):
- стомашна болка.

Макулопапулозен обрив (зачервяване на кожата) и уртикария (подути зачервени плаки, свързани със сърбеж).

Колит (възпаление на дебелото черво), който е обратим след прекратяване на лечението.

#### **Допълнителни нежелани реакции при деца и юноши**

Неприложимо

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно (вижте детайлите по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### **Изпълнителна Агенция по Лекарствата**

София 1303,  
ул. Дамян Груев 8  
Тел.: +359-28903417  
уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

### **5. Как да съхранявате Цикло 3 Форт**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не съхранявайте при температура над 25 С.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

### **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

#### **Какво съдържа Цикло 3 Форт**

- Активните вещества са:

Бодлив залист, сух екстракт ..... 150,00 mg

Хесперидин метил халкон ..... 150,00 mg

Аскорбинова киселина (Витамин С) ..... 100,00 mg

За една капсула

- Другите съставки са:

талк,

магнезиев стеарат,

хидрофобен колоидален силициев диоксид,

макрогол 6000.

Състав на капсулната обвивка:

хинолиново жълто (Е 104),



Сънсет жълто FCF (E 110),  
титаниев диоксид (E 171),  
желатин.

**Как изглежда Цикло 3 Форт и какво съдържа опаковката**  
Кутия с 30 твърди капсули. Това лекарство се предлага под формата на твърди капсули с непрозрачно жълто тяло и непрозрачно оранжево капаче.

**Режим на отпускане**  
Без лекарско предписание

**Притежател на разрешението за употреба и производител**

**Притежател на разрешението за употреба**  
Pierre Fabre Medicament  
45, Place Abel Gance  
92100 Boulogne  
Франция

**Производител**  
Pierre Fabre Medicament Production,  
Progipharma,  
Rue du Lycee,  
45500 Gien,  
Франция

**Дата на последно преразглеждане на листовката 08/2016**

