

Листовка: информация за потребителя

Имупрет обвити таблетки

Imupret coated tablets

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20240292
Разрешение №	
BG/MA/MP -	66857 / 22-10-2024
Одобрение №	

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Имупрет обвити таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемате Имупрет обвити таблетки
3. Как да приемате Имупрет обвити таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Имупрет обвити таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Имупрет обвити таблетки и за какво се използва

Имупрет е традиционен растителен лекарствен продукт, който се използва при първите признаци на и по време на настинка, напр. дразнене в гърлото, възпалено гърло, затруднено преглъщане или суха кашлица.

Продуктът е традиционен растителен лекарствен продукт за употреба при специфични показания, основани изключително на дългогодишна употреба.

Потребителят трябва да се консултира с лекар или квалифициран медицински специалист, ако симптомите продължават по време на употребата на лекарствения продукт или се появят нежелани реакции, които не са описани в листовката.


Имупрет се използва за лечение на деца от 6-годишна възраст, както и на юноши и възрастни.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемате Имупрет обвити таблетки

Не приемайте Имупрет обвити таблетки:

- ако сте свръхчувствителни (алергични) към корен от бяла ружа, цвят от лайка, стрък от полски хвощ, листа от орех, бял равнец, кора от дъб, стрък от глухарче или към други растения от семейство Сложноцветни, напр. пелин, бял равнец, хризантема, маргаритка или някоя от другите съставки на това лекарство, изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки



Трябва да се консултирате с лекар, ако симптомите продължават повече от една седмица или ако се появят задух, треска, гнойни или кървави храчки.

Деца

Употребата при деца под 6-годишна възраст не се препоръчва поради липса на достатъчно данни и като обща предпазна мярка, тъй като лекарствената форма „обвити таблетки“ не е подходяща за деца под 6-годишна възраст (риск от неволно поглъщане).

Други лекарства и Имупрет обвити таблетки

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Не са провеждани проучвания за взаимодействия. Няма съобщения за клинични взаимодействия на Имупрет с други лекарствени продукти.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете това лекарство.

Безопасността на употреба по време на бременност не е установена. Употребата на Имупрет по време на бременност не се препоръчва.

Не е известно дали активните вещества/метаболитите се екскретират в човешкото майчино мляко. Не може да се изключи риск за кърменото новородено/кърмаче. Ето защо Имупрет обвити таблетки не трябва да се използва по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефекта върху способността за шофиране и работа с машини.

Имупрет обвити таблетки съдържа глюкоза, лактоза и захароза.

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Имупрет обвити таблетки

Винаги приемайте този лекарствен продукт точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възраст	Дозировка в случай на остри симптоми	Дозировка след отшумяване на острите симптоми
Деца на възраст 6-11 години	1 обвита таблетка 5 - 6 пъти дневно	1 обвита таблетка 3 пъти дневно
Юноши от 12 години и възрастни	2 обвити таблетки 5 - 6 пъти дневно	2 обвити таблетки 3 пъти дневно

Пациенти с бъбречно и/или чернодробно увреждане

Няма достатъчно налични данни за конкретни препоръки за дозиране при хора с увредена бъбречна/чернодробна функция.



Употреба при деца

Употребата при деца под 6-годишна възраст не се препоръчва поради липса на достатъчно данни и като обща предпазна мярка, тъй като лекарствената форма „обвити таблетки“ не е подходяща за деца под 6-годишна възраст (риск от неволно поглъщане).

Начин на приложение

Перорално приложение.

Приемайте обвитите таблетки несдъвкани, за предпочитане с малко течност (напр. чаша вода).

Продължителност на лечението

Да не се използва повече от 2 седмици наведнъж.

Ако симптомите продължават повече от 7 дни по време на употребата на лекарствения продукт, трябва да се потърси консултация с лекар или фармацевт.

Важно е да прочетете информацията под „Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба“, както и информацията под „Нежелани реакции“.

Ако сте приели повече от необходимата доза Имупрет

Не са докладвани случаи на предозиране.

Ако сте приели по-голямо количество Имупрет от необходимото, моля, консултирайте се с лекар. Той или тя ще вземе решение за всички необходими мерки.

Ако сте пропуснали да приемете Имупрет

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием.

Ако сте спрели приема на Имупрет

Прекратяването на употребата на лекарството обикновено е безвредно.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


Рядко могат да се появят алергични реакции (напр. кожен обрив, копривна треска) и стомашно-чревни нарушения (може да засегне до 1 на 1000 лекувани души).

Ако забележите тези или други нежелани реакции, незабавно спрете приема на лекарствения продукт и се консултирайте с лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Имупрет обвити таблетки



Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте този лекарствен продукт след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка или блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Условия на съхранение:

Да се съхранява под 30°C.

Съхранявайте опаковката (блистера) във външната картонена опаковка, за да предпазите съдържанието от светлина и влага.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Имупрет обвити таблетки

Активните съставки са:

1 обвита таблетка съдържа:

Лечебна ружа, корен, на прах	8 mg
Дъб, кора, на прах	4 mg
Лайка, цвят, на прах	6 mg
Глухарче, стрък, на прах	4 mg
Полски хвощ, стрък, на прах	10 mg
Бял равнец, стрък, на прах	4 mg
Орех, лист, на прах	12 mg

Другите съставки са:

Ядро на таблетката: Глюкоза монохидрат; лактоза монохидрат; царевично нишесте; картофено нишесте; силициев диоксид, колоиден безводен; стеаринова киселина.

Обвивка на таблетката: Калциев карбонат; рициново масло, студено пресовано; декстрин; глюкоза, течна; царевично нишесте; монган гликолов восък; повидон K25; повидон K30; захароза; шеллак (обезвосъчен); силициев диоксид, колоиден безводен; талк.

Как изглежда Имупрет обвити таблетки и какво съдържа опаковката

Обвитите таблетки са бели до почти бели, кръгли, двойноизпъкнали с гладка повърхност. Обвитата таблетка е с диаметър 8,0-8,3 mm.

Опаковка от 50 обвити таблетки

Опаковка от 100 обвити таблетки

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

92318 Neumarkt, Германия

Тел.: +49 (0)9181 / 231-90

Факс: +49 (0)9181 / 231-265



Уебсайт: www.bionorica.de

Електронна поща: info@bionorica.de

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) под следните названия:

Австрия	Imupret Dragees
България	Имупрет обвити таблетки
Германия	Imupret N Dragees
Гърция	Imupret
Италия	Imupret

Дата на последно преразглеждане на листовката:

