

Листовка: информация за потребителя

ВениХем Форте 1000 mg перорална суспензия в саше
микроенизирана пречистена флавоноидна фракция
(съответстваща на диосмин 90%; флавоноиди, изразени като хесперидин 10%)
VenyHem Forte 1000 mg oral suspension in sachet
micronized purified flavonoid fraction
(corresponding to diosmin 90%; flavonoids, expressed as hesperidin 10%)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар, или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява ВениХем Форте и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ВениХем Форте
3. Как да използвате ВениХем Форте
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ВениХем Форте
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Където: Рег. №	20250278
Разрешение №	70060
ВГ/МА/МР -	03-10-2025
Одобрение №	

1. Какво представлява ВениХем Форте и за какво се използва

ВениХем Форте съдържа фракция биофлавоноиди (диосмин и хесперидин) с венотонично (повишава тонуса на венозните стени) и васкулопротективно (укрепва стените на малките кръвоносни съдове) действие. ВениХем Форте подпомага здравината на вените и малките кръвоносни съдове – капилярите, като подобрява кръвообращението, намалява усещането за тежест, болка и умора в краката, **ефективно** облекчава дискомфорта при хемороиди.

Благодарение на тези действия, ВениХем Форте се използва за:

Лечение на симптоми, свързани с венозно-лимфна недостатъчност (разширени вени):

- усещане за тежест и умора в краката,
- болка,
- подуване (отоци),
- нощни крампи,
- дискомфорт, включително в легнало положение.

Лечение на симптоми при хемороиди (остра хемороидална криза):

- болка,
- кръвене,
- подуване и дискомфорт в аналната област.

Подпомагане здравината на капилярите чрез:

- укрепване на стените на малките кръвоносни съдове,
- намаляване на капилярната чупливост и склонността към спукване.



2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ВениХем Форте

Не използвайте ВениХем Форте

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към микронизирана пречистена флавоноидна фракция или към някое от помощните вещества на ВениХем Форте (изброени в точка 6).

Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате да имате дете, попитайте Вашия лекар или фармацевт за съвет преди да приемете това лекарство.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате ВениХем Форте.

- Хемороиди:

Ако хемороидите не изчезнат до 15 дни, би трябвало да потърсите Вашия лекар за съвет.

- Венозно-съдови нарушения:

Лечението води до максимално добър резултат, ако се съчетава със здравословен начин на живот. Избягвайте излагане на слънце, топлина, продължително стоене на крака, наднормено тегло. Ходенето и носенето на специални (компресиращи) чорапи подобрява циркулацията.

Други лекарства и ВениХем Форте

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

ВениХем Форте с храна, напитки и алкохол

Препоръчва се ВениХем Форте да се приема по време на храна (вижте точка 3 Как да използвате ВениХем Форте)

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употреба на това лекарство.

Бременност

Като предпазна мярка е за предпочитане да се избягва употребата на ВениХем Форте по време на бременност.

Кърмене

Поради липсата на данни относно излъчването в майчиното мляко, лечението с ВениХем Форте по време на кърменето трябва да се избягва.

Шофиране и работа с машини

ВениХем Форте не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация за някои от съставките на ВениХем Форте

Това лекарство съдържа 15 mg натриев бензоат във всяка дозова единица, които са еквивалентни на 15 mg/10 ml. Натриевият бензоат може да засили симптомите на жълтеница (пожълтяване на кожата и очите) при новородените (на възраст до 4 седмици).

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на дозова единица, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

Това лекарство съдържа малтитол. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

Това лекарство съдържа 0,78 mg алкохол (етанол) в едно саше. Количеството в едно саше от това лекарство е еквивалентно на по-малко от 0,002 ml бира или 0,0008 ml вино. Малкото количество алкохол в това лекарство няма да има никакви забележими ефекти.



3. Как да използвате ВениХем Форте

Перорално приложение.

Винаги използвайте ВениХем Форте точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

- Венозно-лимфна недостатъчност: 1 саше (10 ml) дневно по време на хранене.
- Остра хемороидална криза: 3 сашета (3 x 10 ml) дневно през първите 4 дни, последвани от 2 сашета (2 x 10 ml) дневно през следващите 3 дни.

Ако сте приели повече от необходимата доза ВениХем Форте

Ако сте използвали по-голяма доза ВениХем Форте отколкото е необходимо, свържете се незабавно с Вашия лекар или фармацевт.

Опитът с предозиране с ВениХем Форте е ограничен, но съобщените симптоми включват диария, гадене, коремна болка, сърбеж и обрив.

Ако сте пропуснали да използвате ВениХем Форте

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, ВениХем Форте може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Тези нежелани реакции могат да бъдат:

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 човека):

- диария, трудно храносмилане, гадене, повръщане

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 човека):

- колит

Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 човека):

- замайване, главоболие, неразположение
- обрив, сърбеж, уртикария

С неизвестна честота (честотата не може да бъде оценена от наличните данни):


- изолирани случаи на оток (подуване) на лицето, устните и клепачите. В изключително редки случаи оток на Quincke (бързо подуване на тъкани като лице, устни, уста, език или гърло, които могат да доведат до затруднено дишане),
- коремна болка.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или ако забележите нежелани реакции, които не са описани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите за нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)



ул. „Дамян Груев“ № 8
1303, гр. София
Тел.: +359 2 8903 417
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ВениХем Форте

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте ВениХем Форте след срока на годност, отбелязан на картонената опаковка след „Годен до“. Срокът на годност се отнася до последния ден на дадения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ВениХем Форте

- Активното вещество е микронизирана пречистена флавоноидна фракция. Едно саше (10 ml) съдържа 1000 mg микронизирана пречистена флавоноидна фракция, съответстваща на 900 mg диосмин (90%) и 100 mg флавоноиди, изразени като хесперидин (10%).
- Помощни вещества: малтитол (E965), натриев бензоат (E211), лимонена киселина, аромат на портокал (съставен от естествени ароматни вещества, пропиленгликол (E1520), етанол и вода), гума гуар, пречистена вода.

Как изглежда ВениХем Форте и какво съдържа опаковката

Бежова или бледакафява суспензия с аромат на портокал в едnodозови сашета.

Всяко саше от PET/Alu/PE/PET/PE съдържа 10 ml перорална суспензия.

Предлага се в картонени кутии с 6, 15, 20, 30, 45 или 60 сашета.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба:

Хеген Фарма България ЕООД
ж.к. София Парк, бл. 118, ап. 1, 1766 София, България

Производител

Kern Pharma, S.L.
Venus, 72
Pol. Ind. Colón II
08228 Terrassa, Barcelona,
Испания

Дата на последно преразглеждане на листовката:

