

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg прах и разтворител за инжекционна супензия с
удължено освобождаване Доборение № /

DIPHERELINE S.R. 3,75 mg powder and solvent for prolonged-release suspension for injection

Трипторелин (като трипторелин ацетат)

Triptoreline (as triptorelin acetate)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го препоръчвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт

В тази листовка::

1. Какво представлява ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg и за какво се използва
2. Преди да използвате ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg
3. Как да използвате ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg
6. Допълнителна информация

1 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Това лекарство е аналог на естествен хормон. То се използва:

при мъже - за някои заболявания на простатата и костите; лечение на локално напреднал рак на простатата, самостоятелно или като съпътстващо и адjuvantno лечение към лъчетерапия; лечение на метастатичен рак на простатата.

при деца - за лечение на ранен пубертет.

при жени - за лечение на ендометриоза, за лечение на някои видове безплодие.

Това лекарство обикновено се комбинира с други хормони (наречени гонадотропини), и като се използва за оплождане в епруветка (*in vitro*). За лечение на някои маточни миоми преди операция.



ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg

Не използвайте ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg, ако сте алергични (свъръхчувствителни) към трипторелин, гонадотропин-освобождаващия хормон (GnRH), други аналоги на гонадотропин-освобождаващия хормон или към някоя от останалите съставки на ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg. Не използвайте ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg, ако сте бременна или кърмите.

Обърнете специално внимание при употребата на ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg

Има съобщения за депресия при пациенти, приемащи ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg, която може да бъде тежка. Ако приемате ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg и проявите депресивно настроение, информирайте Вашия лекар.

Мъже

Ако използвате лекарствени продукти за преодвратяване на кръвосъсирването, може да възникне посиняване на мястото на инжектиране.

В началото на лечението в тялото Ви ще се увеличи количеството на тестостерон. Това може да предизвика влошаване на симптомите на рака. Свържете се с Вашия лекар, ако това се случи. Лекарят може да Ви предпише лекарство (анти-андроген), за да предотврати влошаването на симптомите Ви.

В изолирани случаи през първите седмици на лечението ДИФЕРЕЛИН може, подобно на други аналоги на гонадотропин-освобождаващия хормон, да причини компресия на гръбначния мозък или блокиране на пикочния тракт (където преминава урината Ви). Ако тези състояния се появят, Вашият лекар ще Ви наблюдава и ще Ви предпише лекарства за тях.

След хирургическа кастрация трипторелин не предизвиква по-нататъшно намаляване на серумните нива на тестостерон и поради това не трябва да се използва след кастриране.

Диагностичните изследвания на хипофизно-гонадалната функция, проведени по време на или след прекратяване на лечението с ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg, могат да бъдат подвеждащи.

Ако трипторелин или други аналоги на гонадотропин-освобождаващия хормон се използват продължително време при възрастни, може да се появи изтъняване или отслабване на костите, особено ако пиете много алкохол, ако пушите, ако имате фамилна история за остеопороза (състояние, което засяга силата на костите Ви), имате лошо хранене или приемате антikonвулсанти (лекарства за епилепсия или припадъци) или кортикостероиди (стероиди). Ако имате някакъв проблем, който засяга костите Ви, като например остеопороза, информирайте Вашия лекар. Това може да има значение за начина, по който Вашият лекар ще реши да Ви лекува.

Ако имате диабет или страдате от сърдечни проблеми, информирайте Вашия лекар.

Ако имате уголемяване (доброкачествен тумор) на хипофизната жлеза, за което не знаете, това може да бъде открито по време на лечението с ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg. Симптомите включват внезапно главоболие, проблеми със зрението и парализа на очите.

Жени

Ако ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg или други аналоги на гонадотропин-освобождаващия хормон се използват продължително време при възрастни, може да се появи изтъняване или отслабване на костите, особено ако пиете много алкохол, ако пушите, ако имате фамилна история за остеопороза (състояние, което засяга силата на костите Ви), имате лошо хранене или приемате антikonвулсанти (лекарства за епилепсия или припадъци) или кортикостероиди (стероиди). Ако имате някакъв проблем, който засяга костите Ви, като например остеопороза, информирайте Вашия лекар. Това може да има значение за начина, по който Вашият лекар ще реши да Ви лекува.



Възможно е да имате вагинално кръвотечение през първия месец на лечението. След това обикновено месечните неразположения се прекратяват. Кажете на Вашия лекар, ако имате кръвотечения след първия месец от лечението.

Вашите месечни неразположения трябва да започнат след около 2 до 3 месеца след последната инжекция. Трябва да използвате някаква форма на контрацепция, различна от хапче, през първия месец от лечението и след последната инжекция, ако лечението не е срещу безплодие.

Деца

Момичета, които имат ранен пубертет, могат да имат известни вагинални кръвотечения през първия месец на лечението.

Ако имате прогресивен мозъчен тумор, моля информирайте Вашия лекар.

Моля разговаряйте с Вашия лекар, ако сте разтревожени за нещо от горепосоченото.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насконо сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецептта.

Бременност и кърмене

ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg не трябва да се използва по време на бременност и кърмене.

Не използвайте ДИФЕРЕЛИН, ако се опитвате да забременеете (освен ако ДИФЕРЕЛИН не се използва като част от лечението срещу безплодие).

Шофиране и работа с машини

Може да се чувствате замаяни, уморени или да имате проблеми с очите, като например замъглено зрение. Това са възможни нежелани реакции от лечението или от основното заболяване. Ако изпитвате някоя от тези нежелани реакции, не трябва да шофирате или да работите с машини.

3 КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75

Винаги използвайте ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75mg точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо попитайте Вашия лекар.

Обичайната доза е:

една мускулна инжекция през 4 седмици (28 дни).

Път на въвеждане

Мускулно приложение.

Прахът трябва да се разтвори в приложения разтворител непосредствено преди инжектиране. Получената суспензия не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

Внимание! Инжекцията трябва да се приготви в строго съответствие с указанията дадени в инструкцията за употреба. Всяко непълно инжектиране, водещо до загуба на обем на суспензията, по-голям от обикновено оставащия в спринцовката, трябва да се съобщава на лекуващия лекар.

При деца: дозата се определя според телесното тегло.

Деца с телесно тегло над 30 kg: една интрамускулна инжекция на всеки 4 седмици (28 дена).



Деца с телесно тегло между 20 и 30 kg: две трети от дозата по интрамускулен път, на всеки 4 седмици (28 дена), т.е., прилагане на две трети от обема на разтворената суспензия.

Деца с телесно тегло под 20 kg: половината от дозата по интрамускулен път, на всеки 4 седмици (28 дена), т.е., прилагане на половината от обема на разтворената суспензия.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75mg

Консултирайте се с лекуващия си лекар незабавно!

Ако сте пропуснали да използвате ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75mg

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза! При всички случаи консултирайте се с лекуващия си лекар.

Продължителност на лечение

Продължителността на лечение ще бъде приспособена към отделния случай. Спазвайте предписанието на Вашия лекар! Ако имате впечатление, че ефекта на ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75mg, е много слаб, говорете с лекуващия си лекар

4 ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75mg може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много от нежеланите реакции се получават поради промяната в нивата на тестостерон в тялото Ви. Тези реакции включват горещи вълни, импотенция и намалено сексуално желание.

В редки случаи може да изпитате тежка алергична реакция. Незабавно кажете на Вашия лекар, ако развиете симптоми като проблеми с прегълдането или дишането, подуване на устните, лицето, гърлото или езика, обрив.

Мъже

Много чести нежелани реакции, засягащи повече от 1 на 10 пациенти:

- Горещи вълни;
- Слабост;
- Прекомерно потене;
- Болка в гърба;
- Усещане за бодежи в краката.

Чести нежелани реакции, засягащи повече от 1 на 100 пациенти:

- Гадене;
- Умора, зачевряване, посиняване и/или болка на мястото на инжектиране, болка в мускулите и костите, болка в ръцете и краката, едем (събиране на течност в тъканите на тялото);
- Замайване, главоболие;
- Импотенция, загуба на сексуално желание.
- Депресия, промени в настроението



Нечести нежелани реакции, засягащи повече от 1 на 1000 пациенти:

- Пищене в ушите;
- Болки в корема, запек, диария, повръщане;
- Разсейност и сънливост, треперене, болка;
- Повлияване на някои кръвни изследвания (включително повишаване на функционалните изследвания на черния дроб);
- Увеличаване на телесното тегло;
- Загуба на телесно тегло, подагра (силна болка и подуване на ставите, обикновено в палеца на крака);
- Увеличаване на апетита;
- Болка в ставите, мускулни спазми, мускулна слабост, мускулна болка;
- Изтръпване или скованост;
- Неспособност да се заспи, чувство на раздразнение;
- Развитие на узаемени гърди при мъжете, болка в гърдите, намаляване на размера на тестисите, болка в тестисите;
- Трудности при дишане;
- Акне, загуба на коса, сърбеж, обрив;
- Високо кръвно налягане.

Редки нежелани реакции, засягащи повече от 1 на 10 000 пациенти:

- Червено или пурпурно оцветяване на кожата;
- Диабет;
- Световъргеж;
- Необичайно усещане в окото, замъгляване или смущения в зрението;
- Чувство за пълен стомах, изпускане на газове, сухота в устата, необичайно усещане за вкус;
- Болка в гърдите;
- Трудности при стоене в изправено състояние;
- Симтоми, подобни на грип, треска;
- Алергична реакция, анафилактична реакция (серозна алергична реакция, която причинява замайване или трудности при дишането);
- Възпаление на носа/гърлото;
- Повишена телесна температура;
- Загуба на телесно тегло;
- Скованост в ставите, подуване на ставите, мускулно-скелетната скованост, остеоартрит;
- Загуба на памет;
- Чувство на обърканост, намалена активност, чувство на повищено настроение или благополучие;
- Неспособност за еякулация;
- Недостиг на въздух в хоризонтално положение;
- Мехури;
- Кървене от носа;
- Ниско кръвно налягане.

Докладвано е и общо чувство на дискомфорт.

Ако имате узаемяване (добро-качествен тумор) на хипофизната жлеза, за което не знаете, това може да бъде открито по време на лечението с ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg. Симтомите включват внезапно главоболие, проблеми със зрението и парализа на очите.

При пациенти, лекувани с ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg, както и при други аналоги на гонадотропин-освобождаващия хормон, може да се открие увеличаване на броя на белие кръвни клетки.



Жени:

Много от нежеланите реакции се очакват поради намалените нива на естроген в тялото Ви. Тези много чести реакции включват главоболие, намаляване на сексуалното желание, промени в настроението, разстройване на съня, болка по време или след полов контакт, болезнен месечен цикъл, генитално кръвотечение, болка в таза, коремна болка, вагинална сухота, прекомерно потене и горещи вълни.

Други чести нежелани реакции, които могат да се проявят, включват болка в гърдите, мускулни спазми, болка в ставите, увеличаване на телесното тегло, позиви за повръщане, депресия, дискомфорт или болки в корема, зачеряване, възпаление и/или болка на мястото на инжектиране.

Други докладвани нежелани реакции са: повръщане, диария, кървене от носа, общо чувство на дискомфорт, увеличено кръвно налягане, болка и слабост в мускулите, чувство на обърканост, замайване, липса на месечни неразположения, подуване на устните, лицето, гърлото и/или езика, обрив по кожата, затруднения при дишане, необичайни усещания в очите и/или промени в зрението.

По време на лечение срещу безплодие, гонадотропините в комбинация с това лекарство, могат да предизвикат болка в таза и/или корема или недостиг на въздух при дишане. Ако това се случи, консултирайте се с Вашия лекар възможно най-бързо.

Деца:

Чести нежелани реакции: при момичета през първия месец от лечението може да се појви вагинално кръвотечение. Могат да се наблюдават и други чести нежелани реакции, като например реакции на мястото на инжектиране (зачеряване, възпаление и/или болка), главоболие, горещи вълни и/или реакции на свръхчувствителност.

Докладвани са също и следните нежелани реакции: увеличаване на телесното тегло, повишаване на кръвното налягане, замъглено или необичайно зрение, болка и/или дискомфорт в корема, повръщане, кървене от носа, чувство на неразположение, болка в мускулите, промени в настроението, нервност и обрив по кожата.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5 КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 MG

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°C.

Не използвайте ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка, флакона и ампулата.

Не използвайте ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg, ако забележите видими белези нарушаване на целостта на картонената опаковка, флакона и ампулата

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте вашия фармацевт как да унищожите ненужните ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.



6 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg

Активно вещество е: Трипторелин, като трипторелин ацетат.

- Другите съставки са: D,L лактит когликолид, манитол, кармелоза натрий, полисорбат 80
- Разтворител за парентерално приложение: вода за инжекции, манитол.

Как изглежда ДИФЕРЕЛИН S.R 3,75 mg и какво съдържа опаковката

Прах във флакон (стъкло), 2 ml разтворител в ампула (стъкло) със спринцовка и 2 игли (размери 0,90 x 40 mm). Картонена кутия, съдържаща 1 флакон и 1 ампула с 1 спринцовка и 2 игли.

Притежател на разрешението за употреба

IPSEN PHARMA

65, quai George Gorse 92100,

Boulogne Billancourt

ФРАНЦИЯ

Производител

Ipsen Pharma Biotech

Parc d'Activités du Plateau de Signes

chemin départemental N° 402

83870 Signes

Франция

Дата на последно одобрение на листовката





<

>




Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ

1 – ПОДГОТОВКА НА ПАЦИЕНТА ПРЕДИ РАЗТВАРЯНЕТО <ul style="list-style-type: none">○ Подгответе пациента, като дезинфекцирате глутеуса на мястото на инжектиране. Това действие трябва да се осъществи преди всички останали, тъй като веднъж разтворено, лекарството трябва да се инжектира незабавно.	
2 – ПРИГОТВЯНЕ НА ИНЖЕКЦИЯТА <p>Наличието на мехурчета на върха на лиофилизата е обично за външния вид на лекарството.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Извадете ампулата, съдържаща разтвора. Потупайте края на ампулата, за да върнете разтвора обратно в основното тяло на ампулата.○ Извадете флакона, съдържащ праха. Потупайте края на флакона, за да върнете натрупалия се прах обратно в основното тяло на флакона.○ Премахнете пластмасовата капачка на края на флакона.○ Завинтете игла на спринцовката. Все още не премахвайте предпазителя на иглата.○ Счупете ампулата с точката нагоре.○ Премахнете предпазителя на иглата от иглата. Вкарайте иглата в ампулата и изтеглете целия разтвор в спринцовката.	
<ul style="list-style-type: none">○ Вкарайте иглата вертикално през гумената запушалка във флакона. Инжектирайте бавно разтворителя, така че, ако е възможно, да мине през цялата горна част на флакона.	
<ul style="list-style-type: none">○ Изтеглете иглата над нивото на течността и разтворете супензионата като разклащате внимателно флакона, което означава да го разклащате хоризонтално. <p>Уверете се, че разклащането е достатъчно продължително, за да се получи хомогенна и млечна супензия.</p>	
<ul style="list-style-type: none">○ Проверете дали има неразтворен прах във флакона (ако има някакви остатъци от праха, продължавайте да разклащате, докато изчезнат).	
<ul style="list-style-type: none">○ Когато супензионата е хомогенна, натиснете надолу иглата и изтеглете цялата супензия (без да обръщате флакона). Малко количество ще остане във флакона и трябва да се изхвърли. Предвидено е допълнително количество, за да компенсира тази загуба.	




- Вземете цветния контейнер, за да поставите иглата за инжектиране. Премахнете от спринцовката иглата, която е използвана за приготвянето. Поставете другата игла на върха на спринцовката (завийте здраво).
- Премахнете предпазителя на иглата от иглата.



3 – ИНТРАМУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ

- Натиснете буталото, за да премахнете въздуха от спринцовката непосредствено преди да приложите инжекцията. За да се избегне утаяване, инжектирайте незабавно в глuteусния мускул, който вече е дезинфекциран.



4 – СЛЕД ПРИЛАГАНЕ

- Изхвърлете иглите в определен контейнер.

