

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. №	20060753
Разрешение №	72559 27-07-2026
MP	
Разрешение №	

Листовка: информация за потребителя

Диокет® 600 mg таблетки
Dioket® 600 mg tablets

Диосмин (Diosmin)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство, точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Диокет и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Диокет
3. Как да приемете Диокет
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Диокет
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Диокет и за какво се използва

Диокет принадлежи към групата на венотоничните (понишаващи тонуса на мускулатурата в стените на вените) и вазопротективни (укрепващи малките кръвоносни съдове) средства.

ATC code : C05CA03 (сърдечносъдова система)

Диокет се използва при възрастни за:

- Лечение на симптоми, свързани с венозно-лимфна недостатъчност (проблеми с венозния кръвоток): тежест в краката, болка, първоначален дискомфорт в легнало положение
- Лечение на функционалните симптоми при хемороидална криза
- Допълващо лечение при функционални нарушения, свързани с чупливост на капилярите

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Диокет

Не приемайте Диокет

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към диосмин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Обърнете специално внимание при употребата на Диокет

За постигането на пълна ефективност от лечението е необходимо спазването на определен здравословен начин на живот. Избягвайте прекомерното излагане на топлина и слънце, продължителното стоене прав, както и наднорменото тегло. Разходките и носенето на подходящи (медицински) чорапи, могат да имат благоприятен ефект върху Вашето кръвообращение.



При хемороидална криза прилагането на диосмин не отменя специфичното лечение на други анални заболявания. Лечението трябва да бъде краткотрайно - не повече от 15 дни. Ако симптомите все още съществуват или се влошат, трябва да се направи проктологична оценка и лечението да се преразгледа.

Деца

Неприложимо

Други лекарства и Диокет

Няма данни за взаимодействието на диосмин с други лекарства или други форми на взаимодействие. Въпреки това, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Поради липса на данни за излъчването на диосмин в кърмата, не се препоръчва кърмене по време на лечението.

Шофиране и работа с машини

Няма данни относно влиянието на Диокет върху способността за шофиране или работа с машини.

3. Как да приемате Диокет

Перорално приложение.

Приемайте таблетката с половин чаша вода.

Обичайната дозировка е:

- Венозна недостатъчност: 1 таблетка дневно – с храна
- Хемороидална криза: 2-3 таблетки дневно, с храна

Ако сте пропуснали да приемете доза Диокет

Неприложимо

Ако сте приели повече от необходимата доза Диокет

Няма данни за предозиране. Ако смятате, че сте приели повече от необходимата доза Диокет, моля уведомете Вашия лекар; той ще прецени какви действия да предприемете.

Ако спрете да приемате Диокет

Неприложимо

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 човека)

Стомашна болка

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 човека)

09360



Алергични реакции като кожен обрив, сърбеж (пруритус), копривна треска (уртикария),
подуване на лицето и гърлото

Подуване на корема

Диария

Лошо храносмилане

Гадене

Редки (може да засегнат до един на 1000 човека)

Повръщане

Храносмилателните нарушения рядко водят до прекратяване на лечението.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Диокет

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Диокет след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Диокет

Активно вещество: диосмин.

Всяка таблетка Диокет съдържа 600 mg диосмин.

Други съставки: поливинилпиролidon K30, микрокристална целулоза, царевично нишесте и магнезиев стеарат.

Как изглежда Диокет и какво съдържа опаковката

Диокет се предлага под формата на таблетки, опаковани в блистери. Всяка картонена кутия съдържа 30 таблетки (2 блистера по 15 таблетки).

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Stragen France SAS, 30 rue Edouard Nieuport, 69008 Lyon, Франция

Производител

Phytéo laboratoire, 11 rue de Montbazou, 37260 Monts, Франция

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Фьоникс Фарма ЕООД, Околовръстен път 199 А, 1700 София, тел: 02 965 8106



Дата на последно актуализиране на листовката 06/2026.

09360

