

Листовка: информация за потребителя

20010889

Феварин 100 mg филмокапачки таблетки
Feverin 100 mg film-coated tablets

86144746-55106

30. 06. 2021

Флувоксаминов малеат
(Fluvoxamine maleate)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че призначите на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Феварин и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Феварин
3. Как да приемате Феварин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Феварин
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Феварин и за какво се използва

Феварин принадлежи към групата на лекарствата, наречени селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRI). В мозъка на всеки човек има вещества, наречено серотонин. При дадени заболявания, напр. депресия, нивата на серотонин са по-ниски от обичайните. Предполага се, че Феварин спомага за повишаване на нивата на серотонин в мозъка.

Феварин съдържа активното вещество флувоксаминов малеат.

Феварин се прилага за лечение на депресия (голям депресивен епизод) при възрастни.

Феварин може също да се прилага за лечение на лица, които имат обсесивно-компултивно разстройство (повтаряещи натрапливи мисли с неконтролирано поведение).

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Феварин

Не приемайте Феварин

- Ако сте алергични към флувоксаминов малеат или към някоя от останалите съставки на това лекарството (изброени в точка 6).
- Ако вземате лекарства, наречени инхибитори на моноаминооксидазата (MAO-инхибитори) или сте ги взимали в последните две седмици. Вашият лекар ще Ви посъветва кога време след спиране на тези лекарства да започнете да приемате Феварин.
- Ако приемате тизанидин, лекарство за облекчаване на сковаността на гръдените и ограниченията мускулни движения (скелетно-мускулен релаксант).
- Ако приемате пимозид, невролептично лекарство, което се използва за лечение на шизофрения и други психични заболявания.



- Ако приемате рамелтеон, лекарство за лечение на нарушения на съння.
- Ако кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар преди да приемете Феварин, ако:

- насокоро сте имали сърдечна криза;
- ако сте бременна или бихте могла да бъдете бременна;
- ако боледувате от епилепсия;
- ако сте имали някакво кървене в миналото или редовно взимате лекарства, които могат да увеличат риска от кървене, или ако сте бременна (вижте „Бременност“);
- боледувате от диабет;
- лекували са Ви с електроконвулсивна терапия (електрошок);
- имали сте състояния на мания (приподигнато настроение, свръхвъзбуда) или хипомания;
- имате проблеми с бъбреците и черния дроб;
- имате проблеми с очите (повишено вътречно налягане или риск за остра тесно-ъгълна глаукома);
- ако Вие сте на възраст под 18 години;
- ако Вие сте на възраст над 65 години;
- ако приемате лекарствени продукти, съдържащи бупренорфин или бупренорфин/налоксон, тъй като тези продукти, приети в комбинация с Феварин, могат да доведат до серотонинов синдром, потенциално животозастрашаващо състояние (за симптомите, вижте точка 4 „Възможни нежелани реакции“) вижте също и „Други лекарства и Феварин“.

Понякога може да се появи състояние на неуморимост, невъзможност да стоите или седите спокойно (акатизия). Тези състояния могат да се засилят по време на първите седмици от лечението с Феварин, докато заработи антидепресантният ефект.

Съобщете незабавно на лекаря си ако имате такива симптоми! Вашият лекар ще прецени дали е необходима промяна на дозата.

Съобщавани са тежки кожни реакции при употреба на Феварин. Спрете приема на Феварин незабавно и се свършете с Вашия лекар, ако развиете обрив или лезии на лигавицата. Тежките обриви могат да включват обрив, започващ от крайниците, обикновено от двете страни на тялото и еволюиращ в концентрични кръгове, наподобяващи мишена (еритема мултиформа), широко разпространен обрив с мехури и лющеща се кожа, особено възникващ около устата, носа, очите и гениталиите (синдром на Стивън-Джонсън), обширен пилинг на кожата (повече от 30% от повърхността на тялото – токсична епидермална некролиза).

Лекарства като Феварин (наречени селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина/инхибитори на обратното захващане на серотонина и норадреналина) могат да причинят симптоми на нарушение на сексуалната функция (вж. точка 4). В някои случаи тези симптоми продължават след спиране на лечението.


Мисли за самоубийство или влошаване на депресията и тревожното състояние

Ако сте депресирани или сте с тревожно разстройство Вие може понякога да имате мисли за самонараняване и самоубийство. Това може да се засили скоро след започване на лечението с антидепресанти, тъй като тези лекарства изискват време, за да подействат - обикновено около 2 седмици, но понякога и по-дълго.

Вие можете да бъдете по-предразположение към подобни мисли:

- Ако преди това сте имали мисли за самоубийство или самонараняване.
- Ако сте в млада възраст. Информацията от клинични проучвания е показваща нови и по-висок риск от такова поведение при млади хора (под 25 години) с психични нарушения, които са лекувани с антидепресанти.

Ако по което и да е време у Вас се появят мисли са самонараняване или самоубийство, обрънете се незабавно към лекаря си или идете в болница веднага.



Може да е полезно за Вас да споделите с роднини или приятели, че имате депресия или тревожност и да ги помолите да прочетат тази листовка. Вие може да ги помолите да Ви кажат, ако мислят, че Вашата депресия или тревожност се влошават или ако се тревожат, че поведението Ви се променя.

Кажете на Вашия лекар ако имате усещане или преживяване за беда.

Деца и юноши

Деца и юноши под 18-годишна възраст не трябва да приемат това лекарство, освен ако те не се лекуват за обсесивно-компултивно разстройство (ОКР). Феварин не се прилага за лечение на депресия при лица под 18-годишна възраст.

Когато се приемат този тип лекарства, лица под 18-годишна възраст имат повишен риск от нежелани реакции като намерения и мисли за самоубийство, враждебност, агресия, поведение на противопоставяне и гняв.

Ако Вашият лекар е предписал Феварин на пациент под 18-годишна възраст и Вие искате да обсъдите повишенния рисков от нежелани реакции, моля, обърнете се към Вашия лекар. Трябва да му съобщите дали някой от изброените по-горе симптоми са се появили или са се влошили, докато Вие (или Вашето дете) приемате Феварин.

Също така, липсват данни за дългосрочна безопасност при деца и юноши по отношение на растежа, сързяването, познавателното и поведенческо развитие.

Други лекарства и Феварин

Някои лекарства могат да повлият начина на действие на Феварин, или да повишат риска от развитие на нежелани реакции. Така също Феварин може да повлияе начина на действие на някои други лекарства.

Информирайте Вашия лекар, ако взимате някое от следните лекарства:

- бензодиазепини (напр. триазолам, мидазолам, алпразолам и диазепам)
- трициклични антидепресанти (напр. кломипрамин, имипрамин, амитриптилин)
- невролептици (напр. клозапин, оланzapин, кветиапин) – за лечение на шизофрения, психози
- моноаминооксидазни инхибитори (МАО) включително линезолид (антибиотик)
- пимозид – за лечение на шизофрения и други психични заболявания
- такрин – за лечение на деменция при болестта на Алцхаймер
- селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRI), като циталопрам, есциталопрам, пароксетин, сертралин – за лечение на депресии, панически разстройства, тревожно разстройство
- лекарства, които съдържат жълт кантарион – за лечение на депресии
- литий – за лечение на маниакално-депресивни разстройства
- триптофан – за лечение на безсъние, тревожност, депресия
- циклоспорин - за потискане активността на имунната система
- метадон - за лечение на наркотична зависимост
- мексилетин - за лечение на променен сърден ритъм
- фенитоин или карбамазепин - за лечение на епилепсия
- пропранолол - за лечение на високо кръвно налягане и сърдечни заболявания
- роланирол - за лечение на болест на Паркинсон
- лекарства наречени триптани, прилаган за лечение на мигрена
- терфенадин, астемизол – за лечение на алергични заболявания
- цизаприд - за лечение на смущения във функцията на стомаха и/или гърлото/бройла
- силденафил - за лечение на еректилна дисфункция
- теофилин - за лечение на астма и бронхит



- трамадол – за обезболяване
- бупренофрин или бупренофрин/налоксон
- перорални антикоагуланти (като клопидогрел) - лекарства против образуване на тромби
- рамелтеон – за лечение на нарушения на съня.

Информирайте Вашия лекар ако приемате, накърно сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, вкл. лекарства.

Феварин с храна, напитки и алкохол

- Не пийте алкохол, ако приемате Феварин! Приемът на алкохолът заедно с Феварин може да влоши симптомите Ви или нежеланите лекарствени реакции
- Ако приемате много чай, кафе или други съдържащи кофеин напитки, можете да получите треперене на ръцете, прилошаване, сърцебиене, гадене, беспокойство, безсъние. Ако намалите количеството на кофеина, тези симптоми могат да изчезнат.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Бременност

Съществува ограничен опит по отношение на приложението на Феварин по време на бременност. Не взимайте Феварин ако сте бременна или планирате бременност, освен ако лекарят не прецени, че е абсолютно необходимо. Ако взимате Феварин и планирате бременност, моля, консултирайте се с Вашия лекар.

Ако приемате Феварин към края на бременността, може да съществува повишен рисков от тежко вагинално кървене скоро след раждането, особено ако имате анамнеза за нарушения на кръвосъсирването. Вашият лекар или акушерка трябва да знаят, че приемате Феварин, за да могат да Ви посъветват.

Съобщете на Вашия лекар, че приемате Феварин. Когато се приема по време на бременност, особено в последните 3 месеца на бременността, лекарства като Феварин могат да повишат риска от усложнения при новороденото, наречени персистираща белодробна хипертония на новороденото, които се проявяват с участено дишане и посиняване на бебето. Тези симптоми обикновено започват в първите 24 часа след раждането. Ако приемате лекарството през последните 3 месеца на бременността Вашето бебе може да развие и други симптоми като затруднения с храненето и/или дишането, прекалено ниска или прекалено висока телесна температура, непрекъснат плач, стряскане, раздразнителност, стегнати мускули, съниливост, треперене, трудно заспиване, повръщане. Съобщете на Вашия лекар, ако бебето Ви има такива признания след раждането!

Кърмене

Феварин преминава в кърмата в малки количества. Съществува рисков от ефект върху бебето. Затова Феварин не трябва да се приема по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Феварин не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини. Няма ефекти върху шофиране и психомоторните умения при работа с машини при здрави доброволци. По време на лечение с Феварин обаче е наблюдавана съниливост. Ето защо е необходимо да се внимава докато не се установи индивидуалния отговор към лекарството.

Информация, свързана с помощните вещества

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg). Натриятът може да се каже, че практически не съдържа натрий.



3. Как да приемате Феварин

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.

Препоръчителна начална доза при възрастни (18 и повече години):

- Лечение на депресия - 50 или 100 mg дневно, приети вечер.
- Лечение на обсесивно-компулсивно разстройство - 50 mg дневно, за предпочтение вечер.

Дозата трябва да се повишава постепенно до достигане на ефективната доза.

Обичайната ефективна доза за лечение на депресия е 100 mg дневно.

Обичайната ефективна доза за лечение на обсесивно-компулсивно разстройство обично е между 100 и 300 mg дневно.

Препоръчително е общата дневна доза над 150 mg да се прилага, разделена на 2 или 3 приеми.

Ако не започнете да се чувствате по-добре след няколко седмици, информирайте Вашия лекар, който ще прецени как да продължи Вашето лечение.

Употреба при деца и юноши

Деца и юноши под 18 години не трябва да приемат Феварин за лечение на депресия. Феварин трябва да се предписва на деца и юноши само за обсесивно-компулсивно разстройство. Началната доза за деца на и над 8 годишна възраст и юноши е 25 mg дневно, за предпочтение преди лягане. Препоръчително е общата дневна доза над 50 mg да се прилага, разделена на две дози. Ако двете дози не са еднакви, по-високата доза трябва да се приема преди лягане.

Максималната дневна доза за деца и юноши е 200 mg.

Начин на приложение

- Гълтайте таблетките с вода. Не ги дъвчете. Делителната черта е само за улесняване на счупването, ако Ви е трудно да погълнете цялата таблетка
- Можете да счупите таблетката, ако лекарят Ви е посъветвал.

Не спирайте внезапно приема на Феварин.

При внезапно спиране на приема на Феварин може да се появят оплаквания като:

- възбуда и тревожност
- объркане
- диария
- проблеми със съня
- замайване
- емоционална нестабилност
- главоболие
- раздразнителност
- гадене и/или повръщане
- сърцебиене
- сензорни нарушения (като мравучкане, чувство за удар от ток или зрителни нарушения)
- изпотяване
- треперене (треперене).

Тези оплаквания обично са леки до умерени по тежест, като настъпват най-често през пръвите дни след прекратяване на лечението с Феварин.



Когато спирате Феварин, Вашият лекар ще Ви информира как да намалите бавно дозата си за няколко седмици или месеци, като това ще помогне за намаляване на риска за поява на ефектите на отнемане. Повечето хора намират, че всички симптоми при спиране на Феварин са леки и отшумяват за две седмици. За някои хора тези симптоми може да са по-тежки или да продължат повече.

Ако получите тежки симптоми на отнемане, когато спирате приема на Феварин, моля, информирайте Вашия лекар. Той може да поискат да почнете отново да приемате Феварин с последващо постепенно намаляване на дозата.

Ако усетите някакви симптоми при спиране на лечението, обадете се на Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Феварин

Ако сте приели повече необходимата доза Феварин отколкото Ви е било предписано (ситуация известна като предозиране), свържете се незабавно с Вашия лекар или отидете незабавно до най-близкото лечебно заведение, като носите със себе си опаковката на лекарството.

Симптомите на предозиране включват, но не се ограничават до гадене, повръщане, диария и чувство на сънливост и замаяност. Сърдечни събития (бърз или бавен пулс, ниско кръвно налягане), чернодробни проблеми, гърчове и кома също са били съобщавани.

Ако сте пропуснали да приемете Феварин

Вие трябва да приемате Феварин, така както са Ви е предписан. Въпреки това, ако пропуснете доза, вземете я веднага щом се сетите, освен в случаите, когато вече е наблизило времето за следващата доза. Тогава приемете направо следващата доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства и Феварин може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежелани реакции, които се отнасят до този тип лекарства

През първите седмици на лечението с Феварин, докато лекарството подейства, могат да се появят или засилят мисли за самонараняване или самоубийство.

Информирайте Вашия лекар незабавно, ако се появят или засилят мислите за самонараняване или самоубийство.

Спрете приема на Феварин и се обадете на Вашия лекар незабавно, ако по кожата Ви се появи необичайна синина, или червени петна, или повръщате кръв или имате кръв в изпражненията.

Спирането на Феварин (особено изведенъж) често води до симптоми на отнемане.

Понякога пациентите се чувстват зле, когато Феварин започне да действа. Въпреки че това чувство не е приятно, то би трябвало да премине, ако продължите да взимате Феварин, така както Ви е предписал Вашият лекар. Това може да отнеме няколко седмици.

Възможни нежелани лекарствени реакции при прием на Феварин:

Чести нежелани реакции (може да засегнат между 1 и 10 пациента, на всеки 100 лекувани):

- анорексия – нарушение на храненето
- ажитираност (възбуда)
- тревожност



- безсъние
- запек
- диария
- замаяност
- сухота в устата
- гадене
- ускорен сърден ритъм
- прескачане на сърцето
- сънливост
- неразположение
- отпадналост
- главоболие
- лошо храносмилане
- нервност
- коремна болка
- повищено изпотяване
- трепор
- повръщане

Нечести нежелани реакции (може да засегнат между 1 и 10 пациента на всеки 1 000 лекувани):

- алергични кожни реакции (вкл. подуване на лицето, устните, езика, обрив и сърбеж)
- състояние на обърканост
- забавена еякулация
- замайване при бързо изправяне, поради понижаване на кръвното налягане при изправяне
- халюцинации
- нарушение на координация и равновесието
- нарушения на нервната система, като повишен тонус на мускулатурата, намалена гъвкавост на движенията, забавени движения и походка, трепор - т.н. екстрапирамидни симптоми
- мускулна и ставна болка
- аргесия

Редки нежелани реакции (може да засегнат между 1 и 10 пациента на всеки 10 000 лекувани):

- гърчове
- чернодробни оплаквания
- мания (превъзбуда)
- чувствителност към слънчева светлина
- галакторея

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка колко често се проявяват в хода на лечение):

- чувство, че не можете да си намерите място, да седите или да стойте прав спокойно (акатизия)
- променен вкус
- аноргазмия (неспособност за достигане на оргазъм)
- менструални нарушения (аменорея, хипоменорея, метрорагия, менорагия)
- тежко вагинално кървене скоро след раждането (послеродово кръвотечение), вижте „Бременност“ в точка 2 за повече информация
- нарушения при уриниране (често уриниране, липса на контрол на уринирането, неспособност за уриниране)
- серотонинов синдром - изпотяване, мускулно сковане или ~~стабилност~~ нестабилност, объркане, диария, раздразнителност, увеличена сърдечна честота, новинческа кръвно, тревожност
- невролептичен малигнен синдром - скован мускули, висока температура, забилно изпотяване, задух, възбуда, нарушение на походката, объркане, ~~затуха на приятелство~~, халюцинации, кома



- парестезии (мравучкане)
- кръвоизливи от стомашно-чревния тракт, гинекологични кръвоизливи, синини и/или червени петна по кожа и лигавици
- повишено отделяне на пролактин
- променено отделяне на антидиуретичен хормон – чувство за умора, слабост, обърканост, скованост и неконтролираност на мускулите
- мисли за самоубийство
- намаляване на теглото
- повишаване на теглото
- понижен натрий в кръвта
- разширение на зениците
- повишено вътречно налягане
- синдром на отнемане
- костни фрактури
- тежки кожни реакции като тежки кожни обриви или зачеряване, включително обрив, започвайки по крайниците, обикновено от двете страни на тялото и еволюиращи в концентрични кръгове, наподобяващи мишена (еритема мултиформа), широко разпространен обрив с мехури и лющеща се кожа, особено възникващи около устата, носа, очите и гениталиите (синдром на Стивън-Джонсън), обширен пилинг на кожата (повече от 30% от повърхността на тялото – токсична епидермална некролиза). Честотата на тези странични ефекти не е известна (не може да се оцени от наличните данни).

При пациенти, основно на 50 и повече години, които приемат такъв тип лекарства е наблюдаван повишен риск от костни фрактури.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
Тел.: +35 928903417
Уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Феварин

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Феварин след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.



Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Феварин

- Активното вещество е: флуоксаминов малеат.
- Другите съставки (помощните вещества) са:

Сърцевина на таблетката: манитол, царевично нишесте, прежелатинизирано нишесте, натриев стеарилфумарат, силициев диоксид, колоиден безводен.

Филмово покритие: хипромелоза, полиетилен гликол 6000, талк, титанов диоксид (E171).

Как изглежда Феварин и какво съдържа опаковката

Феварин 100 mg филмирани таблетки: Овални, двойноизпъкнали, с делителна черта за счупване, бели до почти бели филмирани таблетки, с надпис „313“ от двете страни на делителната черта.

Таблетките Феварин 100 mg се предлагат в опаковка по 30 броя.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Майлан ЕООД
Офис сграда „Сердика офиси“
бул. Ситняково № 48, ет. 7
1505 София, България

Производител

Mylan Laboratories SAS
Route de Belleville
Lieu dit Maillard
01400 Chatillon sur-Chalaronne
Франция

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Майлан ЕООД
Тел: +359 2 44 55 400
Факс: +359 2 44 55 401

Дата на последно преразглеждане на листовката:
март 2021

