

Листовка: информация за пациента

**ФИНАКОН 5 mg филмирани таблетки
FINACON 5 mg film-coated tablets**

Финастерид/Finasteride

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява **Финакон** и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете **Финакон**
3. Как да приемате **Финакон**
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате **Финакон**
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20170084
Разрешение №	Р6/1717/16-56236
Оборудване №	07. 10. 2021

1. Какво представлява **Финакон и за какво се използва**

Финастерид принадлежи към група лекарства, наречени инхибитори на 5 α -редуктазата.

Те действат, като намаляват размера на простатната жлеза при мъжете.

Финастерид смалва простатата при мъже, когато тя е уголемена. Финакон се използва за лечение и контрол на доброкачествено (нераково) уголемяване на простатата (доброкачествена хиперплазия на простатата-ДХП). Простатната жлеза се намира под пикочния мехур (но съществува само при мъже). Тя произвежда секрета, който е съставна част на семенната течност (спермата). Уголемената простатната жлеза може да доведе до състояние, наречено "доброкачествена простатна хиперплазия" (ДПХ). Финастерид причинява смалване на увеличената простата, подобрява уринарния поток и симптомите, причинени от ДХП и намалява риска от развитие на внезапна неспособност за уриниране (известна като остра ретенция на урината) и необходимостта от хирургична намеса.

Какво е ДПХ?

Ако имате ДХП, това означава, че Вашата простата е уголемена. Тя може да притисне канала, през който преминава урината, по пътя си във от тялото Ви.

Това може да доведе до проблеми като:

- усещане, че имате нужда да уринирате по-често, особено през нощта;
- усещане, че трябва да уринирате веднага;
- затруднено уриниране;
- когато уринирате, потокът на урината е слаб;
- когато уринирате, потокът на урината прекъсва;
- усещане, че не можете да изпразните докрай пикочния си мехур.

При някои мъже, ДПХ може да доведе до по-сериозни проблеми, като например:

- инфекции на пикочните пътища;
- внезапна неспособност за уриниране;



- необходимост от хирургична намеса.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Финакон

Не приемайте Финакон:

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към финастерид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако сте жена (тъй като това лекарство е предназначено за мъже);
- ако сте дете.

Не приемайте Финастерид ако някое от горните се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Финакон:

- ако имате голямо количество остатъчна урина във Вашия пикочен мехур след уриниране и/или сериозно намален уринарен поток. Ако случаят е такъв, трябва да бъдете изследвани за стесняване на уринарния тракт;
- ако имате увредена чернодробна функция. Нивото на финастерид във Вашата кръв може да се увеличи;
- ако Вашата сексуалната партньорка е бременна или е възможно да забременее, трябва да избягвате да влиза в контакт с Вашата семенна течност, която може да съдържа малко количество от лекарството;
- ако Ви правят кръвен тест за изследване на простатен-специфичен антиген (PSA- използван за откриване на рак на простатата). Уведомете Вашия лекар, че приемате финастерид. Финастерид може да повлияе кръвните нива на PSA, веществото, което се изследва.

Уведомете Вашия лекар, ако някое от горните се отнася за Вас в момента или в миналото.

Незабавно съобщете на Вашия лекар за всякакъв вид промяна в тъканите на гърдите, като например бучка, болка, нарастване на гърдите или отделяне на секрет от зърната, тъй като това могат да бъдат признаци на сериозно заболяване като рак на гърдата.

Деца и юноши

Финастерид не трябва да се приема от деца.

Други лекарства и Финакон

Финастерид обикновено не взаимодейства с други лекарства. Не са идентифицирани клинично значими лекарствени взаимодействия. Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Финакон с храна, напитки и алкохол

Финакон може да се приема със или без храна.


Бременност, кърмене и фертилитет

Финакон е предназначен единствено за мъже

Финастерид не бива да се приема от жени. Жени, които са бременни или биха могли да забременеят, не трябва да боравят с Финакон 5 mg филмирани таблетки, особено ако са счупени или натрошени. Ако Финастерид се абсорбира през кожата или се приеме през устата от бременна жена с плод от мъжки пол, детето може да се роди с аномалии на половите органи. Ако жена, която е бременна влезе в контакт с натрошени или счупени таблетки финастерид, говорете с Вашия лекар.

Когато интимната партньорка на пациента е бременна или е възможно да забременее, на пациента се препоръчва да намали до минимум контакта ѝ с неговата семенна течност (например чрез използване на презервативи) или да прекрати лечението с Финастерид.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за съвет, преди да приемете някакви лекарства.



Шофиране и работа с машини

Няма данни, които да предполагат, че финастерид повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Финакон съдържа лактоза монохидрат

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да вземете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Финакон

Винаги приемайте Финакон точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е една таблетка дневно (еквивалентна на 5 mg финастерид).

Филмираните таблетки може да се приемат на гладно или с храна. Лекарството трябва да се приема през устата, да се погълне цяло и не трябва да се разделя или разтрошава. Вашият лекар може да предпише финастерид заедно с друго лекарство (наречено доксазозин) за да Ви помогне да контролирате ДХП.

Въпреки, че подобрение в състоянието може да се наблюдава скоро, след започване на лечението, се препоръчва то да продължи най-малко 6 месеца, за да се определи обективно дали е постигнат благоприятен резултат от лечението.

Вашият лекар ще Ви каже с каква продължителност трябва да приемате Финакон 5 mg филмирани таблетки. Не прекъсвайте лечението по-рано, в противен случай симптомите могат да се възобновят.

Ако сте приели повече от необходимата доза Финакон

Ако сте приели повече от необходимата доза, незабавно се свържете с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Финакон

Ако забравите да приемете една доза Финакон, вземете я веднага щом си спомните, освен ако не е време за следващата доза; в този случай продължете да приемате лекарството както обикновено. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на Финакон

След приема на финастерид Вашето състояние може да покаже ранно подобрение. Въпреки това, може да са необходими най-малко шест месеца за настъпване на пълния ефект. Важно е да продължите да приемате финастерид толкова дълго, колкото Вашият лекар Ви каже, дори и ако не чувствате подобрение веднага.

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства Финакон може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните нежелани реакции, могат да настъпят при приложение на това лекарство.

Най-честите нежелани реакции са импотентност и понижено сексуално желание. Тези нежелани реакции често се появяват в началото на лечението, но обикновено не продължават дълго при повечето от пациентите, ако лечението продължи.



Алергични реакции

Прекратете приема на Финакон и незабавно се свържете с Вашия лекар, ако развиете някой от следните симптоми:

- подуване на лицето, устните, езика или гърлото, трудности при преглъщане, затруднено дишане (ангиоедем);
- обрив по кожата, сърбеж или уртикария.

Други нежелани реакции включват:

- невъзможност за получаване на ерекция (импотентност);
- намалено сексуално желание (понижено либидо);
- нарушения във функцията на черния дроб, установени при кръвни изследвания;
- болка в тестисите;
- невъзможност за получаване на ерекция, която продължава и след прекратяване на лечението;
- мъжки стерилитет и/или лошо качество на спермата;
- депресия;
- намалено сексуално желание (понижено либидо), което може да продължи и след прекратяване на лечението;
- нарушения в еякулацията, което може да продължи и след прекратяване на лечението.

Трябва незабавно да уведомите Вашия лекар за промени в гърдите: установяване на бучка, болка, уголемяване или отделяне на секрет от зърната, което може да се наблюдава при сериозни състояния, като например рак на гърдата.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8,

1303 София

тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Финакон

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°C.

Не използвайте Финакон след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Помислете Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.



6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Финакон

- Активното вещество: финастерид. Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg финастерид.
- Другите съставки са :
Ядро на таблетката: лактоза монохидрат; микрокристална целулоза (E460); прежелатинизирано нишесте; натриев нишестен гликолат (тип А); лаурил макроголглицериди и магнезиев стеарат (E572).

Филмово покритие: хипромелоза (E464), хидроксипропил целулоза (E463), титанов диоксид (E171), индиго кармин (132), талк, жълт железен оксид (E172).

Как изглежда Финакон 5 mg филмирани таблетки и какво съдържа опаковката:

Филмирана таблетка.

Финакон са сини, кръгли, двойноизпъкнали, със скосени ръбове, филмирани таблетки, с надпис "Е" от едната страна и "61" от другата.

Финакон 5 mg филмирани таблетки са опаковани в PVC-PVdC/Алуминиев блистер.

Финакон 5 mg филмирани таблетки се предлагат в опаковки от 30 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

ФАРМАКОНС АД

бул. „Пейо К. Яворов” № 44 ет.1

София 1164

България

Дата на последно преразглеждане на листовката

08/2021

