

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

990081

Разрешение №

861/MK/Mb-59592

Фусидин® 20 mg/g маз

18-07-2022

Fucidin® 20 mg/g ointment

натриев фузидат (sodium fusidate)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да навреди, независимо то това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Фусидин® и за какво се използва
2. Преди да приемете Фусидин®
3. Как да приемете Фусидин®
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Фусидин®
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФУСИДИН® И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Фусидин® е антибиотик получен от Фузидиум кокцинеум (*Fusidium coccineum*), притежаваш силна антибактериална активност срещу редица Грам-положителни микроорганизми. Стафилококите, включително щамове резистентни към пеницилини или други антибиотици, са особено чувствителни към Фусидин®. Терапевтичната ефикасност на локално приложения Фусидин® се дължи частично на изразената антибактериална активност на продукта срещу микроорганизмите причиняващи кожните инфекции, и отчасти на способността на този антибиотик да прониква през неувредената кожа.

За какво се използва Фусидин®

Фусидин® е показан за лечение на инфекции на кожата причинени от микроорганизми чувствителни на натриев фузидат.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФУСИДИН®

Не употребявайте Фусидин®

При свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

Обърнете специално внимание при употребата на Фусидин®

Повишено внимание се налага когато Фусидин® маз се прилага в областта на окото, тъй като продуктът може да предизвика дразнене, ако попадне в окото.

Продължителната употреба може да доведе до селекция на резистентни микроорганизми.

Прием на други лекарства

Няма данни



Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Фусидин® приложен локално не повлиява или незначително повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Фусидин® маз

Фусидин® маз съдържа цетилов алкохол и ланолин. Тези помощни вещества могат да причинят локални кожни реакции (напр. контактен дерматит).

Фусидин® маз съдържа бутилхидрокситолуен (E321), който може да причини локални кожни реакции (напр. контактен дерматит) или раздразнение на очите и лигавиците.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФУСИДИН®

Дозировка и приложение

Възрастни и деца

Дозировката и продължителността на лечението се определят от лекар.

Фусидин® се прилага върху засегнатия участък 2-3 пъти дневно в продължение на 7 дни. Той може да се използва със или без оклузивна превръзка.

Прилагане върху кожата.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Фусидин®

Малко вероятно е да се наблюдава предозиране

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Фусидин® е изключително добре поносим. Най-често наблюдаваните нежелани реакции са различни кожни реакции и по-специално реакции в мястото на приложение, като контактен дерматит, обрив, парене, сърбеж. Наблюдавани са също така свръхчувствителност и конюнктивит.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ФУСИДИН®

Съхранявайте на място, недостъпно за деца

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да не се използва след изтичане срока на годност, обозначен на опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Фусидин®

Всеки грам от лекарството съдържа: Натриев фузидат 20 mg в неутрална основа за маз.

Помощни вещества: ланолин, цетилов алкохол, течен парафин, бял мек парафин, α-токоферол рацемат, бутилхидрокситолуен (E321).



Как изглежда Фусидин® и какво съдържа опаковката
Туби по 15 g

Притежател на разрешението за употреба:

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Дания

Производител:

LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma)
285 Cashel Road
Dublin 12
Ирландия

LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l
Via E. Schering 21
20054 Segrate (MI)
Italy

Дата на последна редакция на текста
04/2022

