

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка	Приложение 2
Към Рег. №	20220091
Разрешение №	62011 / 23-03-2023
ВГ/МА/МР	
200 mg/30 mg меки капсули	
Ибупрофен / Псевдоефедрин	

Листовка: информация за потребителя

Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули
Ибупрофен / Псевдоефедрин

Grippostad StopCold 200 mg/30 mg soft capsules
Ibuprofen / Pseudoephedrine hydrochloride

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули
3. Как да приемате Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули и за какво се използва

Какво представлява Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули

Грипостад СтопКолд 200mg/30mg меки капсули съдържа две активни съставки, ибупрофен и псевдоефедрин.


- Ибупрофен принадлежи към група лекарства, наречени „нестероидни противовъзпалителни средства“ (НСПВС). Той помага за намаляване на болката и понижаване на висока температура (треска).
- Псевдоефедринът принадлежи към група лекарства, наречени „вазоконстриктори“. Помага за изчистване на носните пътища и облекчава запушването на носа.

За какво се използва Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули

Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули се използва за облекчаване на симптомите на назална конгестия (запушен нос) при остър рино-синусит с предполагаем вирусен произход и главоболие и/или повишена температура при възрастни и юноши на възраст над 15 години. Използвайте това лекарство само ако имате запушен нос заедно със симптомите, изброени по-горе, като главоболие и висока температура. Не използвайте, ако имате само един от изброените по-горе симптоми.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Грипостад СтопКолд 200mg/30mg меки капсули

Само за перорално приложение и краткосрочна употреба (максималната продължителност на лечението без лекарско предписание е 5 дни). Нежеланите ефекти могат да бъдат сведени до



минимум, като се използва най-ниската ефективна доза за най-краткото време, необходимо за контролиране на симптомите.

Ако симптомите се влошат, не се подобрят или се появят други симптоми, които не са свързани с първоначалното състояние, лечението трябва да се прекрати и да се консултирате с лекар или медицински специалист.


Не приемайте Грипостад СтопКолд ако:

- сте алергични към ибупрофен или псевдоефедрин или към някоя от останалите съставки на това лекарство, изброени в точка 6, или сте имали алергична реакция към подобно лекарство в миналото, като аспирин/ацетилсалицилова киселина или други НСПВС;
- Ако имате признаци на алергична реакция, които включват кожен обрив, копривна треска, сърбеж, затруднено дишане, стягане в гърдите, подуване на устата, лицето, устните или езика;
- някога сте имали стомашно-чревни проблеми след прием на Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули, ибупрофен, аспирин/ацетилсалицилова киселина или други НСПВС в миналото, като стомашни язви, стомашно кървене или перфорация;
- в момента имате стомашна язва или стомашно кървене или други признаци на кървене;
- имате активен мозъчно-съдов кръвоизлив (или анамнеза за кръвоизлив) или други тежки кръвоизливи;
- имате необяснима дисфункция на кръвотворната система;
- имате тежки чернодробни или тежки бъбречни проблеми;
- ако сте бременна или кърмите;
- сте на възраст под 15 години;
- имате тежки сърдечни проблеми, включително:
 - тежка сърдечна недостатъчност;
 - високо кръвно налягане;
 - тежко сърдечно заболяване;
 - стенокардия (болка в гърдите);
 - някога сте прекарвали инсулт;
- ако сте прекарвали сърдечен удар или инсулт в миналото или са налице рискови фактори за тези състояния;
- Ако приемате:
 - други лекарства, съдържащи НСПВС за облекчаване на болката, като ибупрофен или аспирин/ацетилсалицилова киселина;
 - други лекарства за изчистване на носните пътища орално (през устата) или назално (през носа), като псевдоефедрин, фенилпропаноламин, фенилефрин или ефедрин;
 - лекарства за лечение на депресия, наречени неселективни инхибитори на моноаминооксидазата (МАОИ), като ипрониазид, или ако сте ги приемали през последните 14 дни;
 - други лекарства за лечение на депресия, наречени трициклически антидепресанти, като амитриптилин;
- имате диабет, проблеми с щитовидната жлеза или тумор на над бъбречната жлеза (наречен феохромоцитом);
- имате глаукома (повишено налягане в окото);
- имате проблеми с отделянето на урина, поради проблеми с простатата или други причини.

Не приемайте Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули, ако някое от горните се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули ако:



- имате инфекция - моля, вижте раздела "Инфекции" по-долу;
- имате сърдечни проблеми, включително сърдечна недостатъчност, стенокардия (гърдна болка), или ако сте имали инфаркт, байпас, периферна артериална болест (лоша циркулация в краката или стъпалата поради стесняване или запушване на артериите), или който и да е вид инсулт (включително „мини-инсулт“ или преходна исхемична атака);
- имате високо кръвно налягане, диабет, висок холестерол, имате фамилна анамнеза за сърдечни заболявания или инсулт или ако сте пушач;
- имате астма - това е така, защото съществува риск от астматичен пристъп;
- имате проблеми с черния дроб или бъбреците;
- имате проблеми с простатата;
- имате проблеми с кръвенето;
- някога сте имали стомашно-чревни проблеми в миналото, като стомашни язви, стомашно кървене, язвен колит или болест на Крон;
- имате системен лупус еритематозус (SLE) - заболяване, засягащо имунната система, причиняващо болки в ставите, кожни промени и други проблеми;

Псевдоефедриновият хидрохлорид може да предизвика положителна реакция при антидопинговите проверки. Не приемайте Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули, ако това може да Ви повлияе.

Може да се получи намаление на кръвния поток към зрителния нерв при приема на Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули. Ако развиете внезапна загуба на зрение или намалено зрение, като сляпо петно или продължително замъглено виждане, спрете приема на Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули и се свържете с Вашия лекар или незабавно потърсете медицинска помощ. Вижте раздел 4.

Ако развиете генерализиран възпалителен кожен обрив (зачервяване на кожата), свързан с пустици, спрете приема на Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули и се свържете с Вашия лекар или незабавно потърсете медицинска помощ. Вижте раздел 4.

Внезапна коремна болка или ректално кървене може да се появи при приема на Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули, поради възпаление на дебелото черво (исхемичен колит). Ако развиете тези стомашно-чревни симптоми, спрете приема на Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули и се свържете с Вашия лекар или незабавно потърсете медицинска помощ. Вижте раздел 4.

Обърнете специално внимание при употребата на Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули.


Кожни реакции

Съобщавани са сериозни кожни реакции, свързани с лечението с Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули. Трябва да спрете приема на Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули и незабавно да потърсите медицинска помощ, ако развиете кожен обрив, лезии на лигавиците, мехури или други признаци на алергия, тъй като това може да са първите признаци на много сериозна кожна реакция. Вижте раздел 4.

По време на варицела е препоръчително да се избягва употребата на ибупрофен.

Инфекции

Грипостад СтопКолд може да скрие признаците на инфекции, например повишена температура и болка. Поради това е възможно Грипостад СтопКолд да забави подходящото лечение на инфекцията, което може да доведе до повишен риск от усложнения. Това се наблюдава при пневмония, причинена от бактерии и бактериални кожни инфекции, свързани с варицела. Ако приемате това лекарство, докато имате инфекция и симптомите на инфекцията продължават или се влошават, трябва да се консултирате незабавно с лекар.



Инфаркт и инсулт

Противовъзпалителните/обезболяващи лекарства като ибупрофен могат да бъдат свързани с леко повишен риск от инфаркт или инсулт, особено когато се използват във високи дози. Не превишавайте препоръчителната доза или продължителността на лечението.

Възрастни хора

Ако сте възрастен човек, приемащ Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули, е по-вероятно да получите нежелани реакции като стомашно кървене или перфорация (признаците могат да включват стомашна болка и киселини). Това може да бъде животозастрашаващо. Вижте „Възможни нежелани реакции“ в точка 4 за повече информация.

Деца и юноши

Не давайте Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули на деца под 15 години. Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули ако сте на възраст от 15 до 17 години и не сте пили течности или сте дехидратирани поради диария или боледуване.

Това е така, защото има по-висок риск от бъбречни проблеми с Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули, когато сте дехидратирани.

Други лекарства и Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули

Едновременният прием на Грипостад СтопКолд и други лекарства от групата на вазоконстрикторите, използвани за лечение на запушен нос, независимо от начина на приложение – перорално или назално, трябва да се избягва.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това включва лекарства, отпускани без рецепта и билкови лекарства.


Не приемайте Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули ако приемате някои от следните лекарства:

- други лекарства, съдържащи НСПВС, включително селективни инхибитори на циклооксигеназа-2 за облекчаване на болката, като ибупрофен или аспирин/ацетилсалицилова киселина, други лекарства за изчистване на носните пътища орално (през устата) или назално (през носа), като псевдоефедрин, фенилпропаноламин, фенилефрин или ефедрин;
- лекарства за лечение на депресия, наречени неселективни инхибитори на моноаминооксидазата (МАОИ), като ипрониазид, или ако сте ги приемали през последните 14 дни;
- други лекарства за лечение на депресия, наречени трициклически антидепресанти, като амитриптилин.

Не приемайте Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули, ако някое от горните се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Грипостад СтопКолд 200/30 mg меки капсули, ако приемате някое от следните лекарства:

- лекарства за лечение на депресия, наречени обратими инхибитори на моноаминооксидаза А и селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина;
- инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRIs) като флуоксетин;
- линезолид;
- бромокриптин, перголид, лизурид, каберголин, ерготамин или дихидроерготамин;
- лекарства, които са антикоагуланти (т.е. разреждащи кръвта/предотвратява съсирването, например аспирин/ацетилсалицилова киселина, варфарин, тиклопидин);
- хепарин, когато се използва за лечение или за предотвратяване на кръвен съсирек;
- литий, когато се използва за лечение на тежки проблеми с настроението;
- метотрексат;



- лекарства, които понижават високото кръвно налягане (АСЕ инхибитори като каптоприл, бета-блокери като атенолол, антагонисти на рецепторите на ангиотензин II като лосартан или други отводняващи таблетки (диуретици);
- дигоксин или хинидин, използвани за лечение на сърдечни проблеми;
- циклоспорин или такролимус, използвани след трансплантация;
- калий -съхраняващи диуретици като амилорид или спиронолактон;
- фенитоин, използван за лечение на епилепсия;
- пробенецид и сулфинпиразон, използвани за лечение на подагра;
- зидовудин, използван за лечение на ХИВ;
- сулфониурейни производни като гликлазид или глимепирид, използвани за лечение на диабет;
- хинолонови антибиотици като ципрофлоксацин;
- гинко билоба;
- антиациди;
- мифепристон, използван при прекъсване на бременността;
- кортикостероиди (вид противовъзпалително лекарство) като хидрокортизон;
- аминогликозиди като гентамицин или амикацин;
- фуразолидон, антибактериален;
- гуанетидин, резерпин или метилдопа.

Уведомете Вашия лекар, че приемате Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули, ако трябва да Ви бъде направена упойка преди операция или процедура. Вашият лекар ще Ви помоли да спрете приема на Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули няколко дни преди упойката. Трябва също да кажете на вашия анестезиолог (лекарят, който Ви поставя упойката), че сте приемали Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули.

Някои други лекарства също могат да повлияят или да бъдат повлияни от лечението с Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули. Следователно винаги трябва да потърсите съвет от Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули.

Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули с алкохол

Не приемайте алкохол, докато приемате Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули.

Бременност, кърмене и фертилитет

Не приемайте Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули ако сте бременна или кърмите. Може да причини проблеми с бъбреците и сърцето при нероденото Ви бебе. Може да повлияе на Вашата склонност и тази на Вашето бебе към кървене и може да бъде причина, раждането да започне по-късно или да бъде по-продължително от очакваното. Ако се приема повече от няколко дни от 20-та седмица от бременността нататък, Грипостад СтопКолд може да причини проблеми с бъбреците при нероденото Ви бебе, което може да доведе до намалено количество на околоплодната течност, която заобикаля бебето (олигохидрамнион) или стеснение на кръвоносен съд (дуктус артериозус) в сърцето на бебето. Ако мислите, че може да сте бременна или планирате да имате бебе, попитайте Вашият лекар или фармацевт за съвет преди да приемате това лекарство.

Ибупрофен може да повлияе на способността на жената да забременее. Този ефект е обратим след прекратяване на лечението с ибупрофен.

Шофиране и работа с машини

След като сте приели Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули, може да се почувствате замаяни, да имате необичайно главоболие, проблеми със зрението или слуха, включително да виждате или чувате неща, които ги няма (халюцинации). Ако това се случи, не шофирайте, не карайте велосипед и не използвайте никакви инструменти или машини.



Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули съдържа сорбитол (Е 420) и калий.

Това лекарство съдържа 63,00 mg сорбитол във всяка капсула.

Сорбитолът е източник на фруктоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че Вие (или Вашето дете) имате непоносимост към някои захари или ако Ви е поставена диагноза наследствена непоносимост към фруктоза (ННФ) - рядко генетично заболяване, при което човек не може да разгражда фруктозата, посъветвайте се с Вашия лекар, преди Вие (или Вашето дете) да приемете или да приложите това лекарство.

Това лекарство съдържа калий, по-малко от 1 mmol (39 mg) на капсула, т.е. практически "не съдържа калий".

3. Как да приемате Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

Възрастни и деца над 15-годишна възраст

Колко да приемете

- Препоръчителната доза е 1 капсула на всеки 4 до 6 часа.
- Ако симптомите Ви са по-тежки, можете да приемате 2 капсули едновременно
- Не приемайте повече от 6 капсули за 24 часа.

Прием на това лекарство

Поглъщайте капсулите цели с голяма чаша вода, за предпочитане след храна.

Колко дълго да приемате това лекарство

Не приемайте това лекарство повече от 5 дни.

- Това лекарство е само за краткосрочна употреба, приемайте най-ниската доза за най-краткото време, необходимо за лечение на Вашите симптоми.
- Трябва да говорите с лекар, ако не се чувствате по-добре или ако се чувствате по-зле след 5 дни. Те ще ви кажат дали е безопасно да продължите да приемате това лекарство.

Ако сте приели повече, Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули, отколкото трябва, или ако деца са приели лекарството случайно, веднага се свържете с лекар или най-близката болница, за да получите мнение за риска и да ви дадат съвет за предприемане на действия.

Вземете опаковката с лекарства със себе си.

Симптомите могат да включват гадене, болки в стомаха, повръщане (може да има кръв), главоболие, звънене в ушите, объркване и треперещо движение на очите. При високи дози се съобщава за сънливост, гръдна болка, сърцебиене, загуба на съзнание, гърчове (главно при деца), слабост и замаяност, кръв в урината, усещане за студено тяло и проблеми с дишането. Не продължавайте с приема на Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули, ако случайно сте приели повече от необходимата доза (предозиране).


Ако сте забравили да вземете Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули

- Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Шансът да получите нежелани реакции може да бъде намален чрез приемане на най-ниската доза за най-кратко време, необходимо за



лечение на симптомите

Следните нежелани реакции могат да възникнат с приема на това лекарство:

Спрете приема на Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули веднага и уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако забележите някоя от следните нежелани реакции:

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 души

- Гадене;
- кървене от стомаха или червата, признаците включват повръщане на кръв, кръв в изпражненията или изпражнения с черен цвят.

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 души

- тежко главоболие, което е по-болезнено от обикновено.

Много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 души

- сърдечен пристъп;
- ускорен пулс или сърцебиене;
- алергична реакция към Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули, признаците включват кожен обрив, уртикария, сърбеж, затруднено дишане, стягане в гърдите, подуване на устата, лицето, устните или езика;
- образуване на мехури по кожата или лигавиците като вътрешността на устата, признаците включват усещане за парене, със зачервяване, мехури и язви.

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка

- инсулт;
- поведенчески проблеми като чувство на възбуда, тревожност, безпокойство или нервност;
- червен, люспест широко разпространен обрив с подутини под кожата и мехури, локализирани главно в кожните гънки, торса и горните крайници, придружени от треска в началото на лечението (остра генерализирана екзантематозна пустулоза). Спрете да използвате Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули, ако развиете тези симптоми и незабавно потърсете лекарска помощ. Вижте също раздел 2;
- възпаление на дебелото черво поради недостатъчно кръвоснабдяване (исхемичен колит);
- намален приток на кръв към зрителния нерв (исхемична невропатия на зрителния нерв).

Спрете приема на Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули веднага и уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако забележите някоя от нежеланите реакции, изброени по-горе.

Други нежелани реакции

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако получите някоя от следните нежелани реакции:

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 души

- лошо храносмилане, болки в стомаха, повръщане, диария, запек, газове.

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 души

- язва на стомаха;
- трудно заспиване;
- чувство на сънливост или умора;
- чувство на замаяност или раздразнителност;
- проблеми със зрението;



- главоболие, което не изчезва;
- петна по кожата като обрив или сърбеж;
- възпален стомах или черва, влошаване на съществуващо възпалително заболяване на червата;
- свръхчувствителност като хрипове и затруднено дишане при пациенти, които някога са имали бронхиална астма или алергично заболяване.

Редки: могат да засегнат до 1 на 1 000 души

- бъбречни проблеми;
- шум в ушите

Много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 души

- депресия;
- сърдечна недостатъчност;
- бъбречна недостатъчност;
- високо кръвно налягане;
- болезнена или възпалена уста;
- възпалена задстомашна жлеза (панкреатит);
- стесняване на червата (чревна стриктура);
- асептичен менингит, влошаване на инфекциозни възпаления;
- проблеми с кръвните Ви клетки - може да е по-вероятно да получавате синини или да получите инфекции;
- чернодробни проблеми, включително нарушена чернодробна функция, хепатит или жълтеница (пожълтяване на кожата или очите).

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка

- сухота в устата, чувство на жажда;
- болка в гърдите;
- анормален спазъм, припадъци;
- усещане за виене на свят (световъртеж);
- нивата на хематокрита намаляват и хемоглобинът намалява;
- да виждате или чувате неща, които ги няма (халюцинации)
- кожен обрив, промяне в цвета на кожата, задържане на течности (оток);
- рядко уриниране, кръв или протеин в урината (показани в тестовите);
- може да възникне тежка кожна реакция, известна като DRESS синдром. Симптомите на DRESS включват: кожен обрив, треска, подуване на лимфните възли и увеличаване на еозинофилите (вид бели кръвни клетки). Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако получите някоя от изброените по -горе нежелани реакции;
- кожата става чувствителна към светлина.

Съобщете на вашият лекар или фармацевт ако се появи някоя от по-горе изброените странични реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули



Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:“ Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте при температура под 25 ° C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация.

Какво съдържа Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули

Активните вещества са ибупрофен 200 mg и псевдоефедрин хидрохлорид 30 mg.

Другите съставки са:

- Съдържание на капсулата: калиев хидроксид, макрогол 600 (E1521), пречистена вода
- Желатинова капсулна обвивка: сорбитол течен, частично дехидратиран (E420), желатин, пречистена вода, естествен бета каротин, модифицирано хранително нишесте (E1450), алфа токоферол (E307), черно печатно мастило (Opacode Black-S-1-17823) ИН: шеллак 45% (20% естерифициран) в етанол, железен оксид, черен.

Как изглежда Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули и какво съдържа опаковката

Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули е оранжева, прозрачна, продълговата, мека желатинова капсула, съдържаща бистра до светло оранжева прозрачна течност, отпечатана с „IBP“ с черно мастило.

Грипостад СтопКолд 200 mg/30 mg меки капсули се доставят в блистер от Алюминий/PVC/PVdC в картонена опаковка.

Всяка опаковка съдържа 10, 20 или 30 капсули.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Германия

Производители

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Германия

Qualimetrix S.A.

Messogion Avenue 579

Agia Paraskevi 153 43

Гърция

Този лекарствен продукт е разрешен под следните имена в ЕИО:

Германия Ibuprofen / Pseudoephedrine Stada 200 mg/ 30 mg Weichkapseln

България Грипостад СтопКолд 200 mg/ 30 mg меки капсули

Румъния Ibuprofen / Pseudoephedrine Stada

Дата на последно преразглеждане на листовката

03.01.2023

