

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. № ..... 62587	20000271
Разрешение № ..... БОМН/1	30-05-2023
Листовка: информация за потребител Хепароид 100 IU/mg ointment Heparoid 100 IU/mg ointment Хепариноид Heparinoid	

Листовка: информация за потребител

Хепароид 100 IU/mg ointment

Heparoid 100 IU/mg ointment

Хепариноид

Heparinoid

**Прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да използвате този лекарствен продукт, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### **Какво съдържа тази листовка:**

1. Какво представлява Хепароид и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате Хепароид
3. Как да използвате Хепароид
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Хепароид
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

#### **1. Какво представлява Хепароид и за какво се използва**

Хепароид съдържа активно вещество хепариноид. Хепариноид действа като разтваря малки кръвни съсиреци в повърхностните кръвоносни съдове и подобрява снабдяването с кръв на кожата.

Хепароид е препарат - локален антикоагулант, който, нанесен върху кожата успокоява болката и възпалението като в допълнение допринася за излекуване на възпалението на вените, включително и на варикозни язви. Използва се за подобряване на циркулацията след натъртане (включително хематом) или нараняване на меките тъкани, включително увреждане на мускулите, сухожилията, ставните капсули и връзки; пост-травматични отоци и за подобряване образуването на белези след наранявания или операции.

Хепароид е предназначен за употреба от възрастни, деца и юноши.

#### **2. Какво трябва да знаете преди да използвате Хепароид**

##### **Не използвайте Хепароид, ако**

- сте алергични към хепариноид или някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в т.б.);
- имате проблеми с кръвосъсирването

##### **Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Хепароид.

Хепароид не трябва да се нанася върху отворени рани, лигавици и в очите.



Ако по случайност малко дете погълне по-голямо количество от лекарствения продукт, това може да доведе до гадене и повръщане. В този случай предизвикайте повръщане или го улеснете и потърсете лекарска помощ.

#### **Други лекарства и Хепароид**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Хепароид не може да се използва едновременно с някои други лекарствени продукти за локално приложение, например с продукти, съдържащи тетрациклин, хидрокортизон или салицилова киселина. Едновременно с него не използвайте и други свободно продавани лекарствени продукти за локално приложение без да сте се консултирали с Вашия лекар. Когато лекар Ви изписва други лекарствени продукти, предупредете го, че употребявате Хепароид.

#### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременните жени могат да използват Хепароид само за кратко време и след препоръка от лекар.

През последното тримесечие на бременността лекарственият продукт не трябва да се използва изобщо, защото може да предизвика усложнения като кръвоизлив по време на раждането.

По време на периода на кърмене мазта може да се използва за кратко и само за малки по площ участъци от кожата.

#### **Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини**

Не повлиява дейности, изискващи повищено внимание, като шофиране и работа с машини.

#### **Хепароид съдържа цетостеарилов алкохол**

Той може да причини локални кожни реакции (напр. контактен дерматит)

#### **Хепароид съдържа пропилен гликол**

Това лекарство съдържа 50 mg пропилен гликол в 1 g маз. Той може да причини раздразнение на кожата. Не използвайте това лекарство при бебета по-малки от 4 седмици с отворени рани или големи области на увредена кожа (напр. изгаряния) без консултация с Вашия лекар или фармацевт.

#### **Хепароид съдържа консерванти метил и пропил парагидроксибензоат**

Тези съставки могат да предизвикат алергични реакции (с възможно отложено начало).

### **3. Как да използвате Хепароид**

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Хепароид е само за външно приложение. Да не се погъльща.

Количество маз, което ще използвате, зависи от размера на третирания участък. Ако лекарят не предпише друго, засегнатото място и областта около него се намазва 2 - 3 пъти дневно с приблизително 1 mm дебел слой маз, който се втрива леко в кожата.

При заболяване на вените може да се приложи компресивна превръзка. При големи и болезнени подкожни кръвоизливи, лекуваното с мазта място, може в началото да се покрие с непропускаща въздух превръзка, най-добре през нощта. При варикозна язва мазта трябва да се втрива в кожата около нея.

Не забравяйте да измивате ръцете си след нанасяне на Хепароид, освен ако това не е третираната зона.

Потърсете медицински съвет, ако след 3 дни симптомите не отшумят или се влошат.

#### **Ако сте използвали повече от необходимата доза Хепароид**



В случай на случайно погъщане на големи количества от мазта от малко дете, може да се появи гадене и дори повръщане. Препоръчително е да се предизвика повръщане и да се потърси медицинска помощ.

#### **Ако сте пропуснали да използвате Хепароид**

Използвайте лекарството веднага щом се сетите и продължете употребата по обичайния график.

#### **Ако сте спрели употребата на Хепароид**

Ако оплакванията в следствие на нараняване не отшумят след 3 дни лечение или се влошат или се появят нежелани реакции, спрете приложението и се посъветвайте с Вашия лекар.

Ако имате никакви други въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При чувствителни пациенти по време на лечение може да се появи дразнене на кожата.

Нечесто (може да засегне до 1 на 100 души) могат да се появят парене, сърбеж, зачерявания на кожата или обрив. Ако забележите тези или други нежелани реакции, консултирайте се с Вашия лекар.

Рядко (може да засегне до 1 на 1000 души) по време на лечението може да се наблюдава свръхчувствителност на кожата.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез: Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

### **5. Как да съхранявате Хепароид**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25 °C. Да не се замразява.

Не използвайте това лекарство след изтичане срока на годност, посочен върху външната опаковка и върху тубата. Срокът на годност изтича в последния ден на отбелязания месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще подпомогнат опазването на околната среда.

### **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

#### **Какво съдържа Хепароид**

Активното вещество е хепариноид (100 IU/mg) 2 mg в 1 g маз

Помощни вещества: твърд парафин, течен парафин, цетостеарилов алкохол, стеаринова киселина, бял пчелен восък, моноглицериди на наситени висши мастни киселини, етексифран C<sub>12</sub>-C<sub>14</sub> алкоали, пропилен гликол (E1520), троламин, метил паракидроксибензоат, пропилен паракидроксибензоат, пречистена вода.



**Какво представлява Хепароид и съдържание на опаковката**

Една туба с маз и листовка за пациента в кутия.

Опаковка: 30 g, 100 g

**Притежател на разрешението за употреба и производител:**

**Притежател на разрешението за употреба**

Zentiva k.s.

U kabelovny 130,

Dolní Měcholupy

102 37, Prague 10

Чешка република

**Производител**

Zentiva k. s.,

U Kabelovny 130

102 37 Prague 10

Чешка Република

Sanofi Winthrop Industrie

196 Rue du Maréchal Juin

45200 Amilly

Франция

**Дата на последно преразглеждане на листовката**

28.02.2023

