

ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Хербион Исландски лишей 6mg/ml сироп
Гъст екстракт от Исландски лишей

Herbion Iceland moss 6mg/ml сироп
Cetraria islandica thallus extractum spissum

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

Към Рег. №

20150189

В6/МА/МБ-98700

Районен №

21-11-2019

Особение №

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете листовката. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7-14 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Хербион Исландски лишей сироп и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Хербион Исландски лишей сироп
3. Как да използвате Хербион Исландски лишей сироп
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Хербион Исландски лишей сироп
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Хербион Исландски лишей сироп и за какво се използва

Хербион Исландски лишей сироп е традиционен растителен лекарствен продукт, който се препоръчва като омекчаващо средство за симптоматично лечение на дразнене на лигавицата на устната кухина и фаринкса, придружено със суха кашлица.

Екстрактът от Исландия лишей съдържа високи количества водоразтворими полизахариди, които покриват, защитават и овлажняват устната кухина, като по този начин се облекчава дразненето и сухата кашлица.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Хербион Исландски лишей сироп

Не приемайте Хербион Исландски лишей сироп:

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към екстракт от Исландски лишей или към някоя от останалите съставки на това лекарство.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Хербион Исландски лишей сироп:

- Ако се появи затруднение в дишането, повишена температура, хронична кашлица, дрезгав глас или кървави храчки, трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.
- Ако състоянието Ви не се подобри след 7 до 14 дни от приема на продукта, трябва да се консултирате с Вашия лекар.



На деца от 4 до 6 годишна възраст лекарството трябва да се дава след поставяне на диагноза и при последващо наблюдение от лекар.

Други лекарстваи Хербион Исландски лишей сироп

Моля, кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате,наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Няма съобщения Хербион Исландия лишей сироп да оказва влияние върху действието на други лекарства.

Хербиион Исландски лишей сироп с храна и напитки

Препоръчва се да се пие много чай или други топли напитки по време на приема на Хербион Исландия лишей сироп, но не веднага след приема на лекарството!

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Хербиион Исландия лишей сироп не се препоръчва по време на бременност и кърмене, поради недостатъчно данни за използването на екстракт от Исландски лишей при бременни жени и кърмачки.

Шофиране и работа с машини

Няма съобщения Хербион Исландски лишей сироп да повлиява върху способността за шофиране и работа с машини.

Хербион Исландски лишей сироп съдържа сорбитол и етанол (алкохол)

Това лекарство съдържа 760 mg сорбитол в 1 ml сироп. Една мерителна лъжица (5 ml сироп) съдържа 3 800 mg сорбитол. Сорбитолът е източник на фруктоза. Ако пациент има наследствена непоносимост към фруктоза, рядко генетично заболяване, не трябва да използва това лекарство. Пациентите с наследствена непоносимост към фруктоза не могат да разграждат фруктозата, която се съдържа в това лекарство, което може да причини сериозни нежелани реакции.

Това лекарство съдържа малки количества етанол (алкохол), по-малко от 100 mg в една доза.

3. Как да използвате Хербион Исландски лишей сироп

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза за възрастни и юноши на възраст над 16 години е 15 ml сироп четири пъти дневно.


Употреба при деца

Препоръчителната доза за деца от 10 до 16 години е 10 ml сироп четири пъти дневно.

Препоръчителната доза за деца от 4 до 10 годишна възраст е 5 ml сироп четири пъти дневно.

На деца от 4 до 6 годишна възраст лекарството трябва да се дава след медицински преглед и по съвет на лекар. На тях трябва да им се дава Хербион Исландски лишей от техните родители или от възрастни болногледачи.

Да не се яде или пие веднага след като се приеме Хербион Исландски лешен сироп, защото лекарството може да бъде отстранено от лигавицата на устата и гърлото **върв**е скоро.



Продължителността на лечението зависи от естеството и тежестта на заболяването като лечението може да продължи за по-дълъг период от време. Препоръчва се да продължите да приемате лекарството още няколко дни, след като клиничните признаци на заболяването са изчезнали.

Разклатете бутилката преди употреба.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Хербион Исландски лишей сироп
Не приемайте по-големи от препоръчаните дози.
Няма съобщения за случаи на предозиране.

Ако сте пропуснали да използвате Хербион Исландски лишей сироп
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни):

- Реакция на свръхчувствителност, проявяваща се като сърбеж, зачервяване на кожата или затруднено дишане.

Ако се появи алергична реакция, спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар!

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Хербион Исландски лишей сироп

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се замразява!

Сиропът трябва да се използва в рамките на 3 месеца след първо отваряне на бутилката.



Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Хербион Исландски лишей сироп

- 1 ml от сиропа съдържа 6 mg гъст екстракт от Исландски лишей, талус (*Cetraria islandica* (L.) Acharius, thallus)(16-18:1), еквивалентен на 96–108 mg Исландски лишей. Екстрагент: пречистена вода.
- Другите вещества са: течен (некрystalизиращ) сорбитол (E420), ксантинова гума (E415) натриев бензоат (E211), лимонена киселина (E330), аромат на лимон (съдържа следи от етанол). Вижте точка 2 „Хербион исландски лишей съдържа сорбитол и етанол“.

Как изглежда Хербион Исландски лишей сироп и какво съдържа опаковката

Жълто-кафява до кафява, слабо опалесцираща течност със специфичен мирис и вкус и възможна слаба седиментация (забележима утайка).

Първичната опаковка е кафява стъклена бутилка от 150 ml (тип III), бяла капачка от HDPE (защитена от деца), крайник от HDPE/LDPE и дозираща лъжичка от PP (5 ml).

Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба и производител:

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

Дата на последно преразглеждане на листовката

