

Листовка: информация за пациентъ

20160318

Ангал Ментол 2 mg/ml+0,5 mg/ml спрей за устна лигавица, разтвор.
хлорхексидинов диглюконат/лидокаинов хидрохлорид

BG/MK

ASTBOP.

11-10-2022

Angal Menthol 2 mg/ml+0,5 mg/ml oromucosal spray, solution chlorhexidine digluconate/lidocaine hydrochloride

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 - Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
 - Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
 - Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Ангал Ментол и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ангал Ментол
 3. Как да използвате Ангал Ментол
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате Ангал Ментол
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Ангал Ментол и за какво се използва

Ангал Ментол е лекарство с локално действие в устната кухина и фаринкса при възрастни и деца над 6 години.

Има антисептичен ефект и локално обезболяващо действие, което започва от втората минута след приложение и може да има противовирусен ефект срещу някои вируси.

Ангал Ментол се препоръчва при:

- лечение на симптомите на зачервено, възпалено гърло, заболявания на фаринкса и устната кухина, съпроводени с раздразнение и болезнено прегъщане, като възпаление на венците, устната лигавица и афти;
 - в случаи на бактериална инфекция, съпроводена с висока температура е необходимо допълнително лечение;
 - не съдържа захар, което го прави подходящ и за диабетици.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ангал Ментол

Не използвайте Ангал Ментол:

- ако сте алергични към активните вещества или към някое от помощните вещества на това лекарство (изброени в точка б);
 - при деца под 6-годишна възраст;
 - при алкохолна зависимост;
 - при деца с прекарали състояния с мускулни крампи (включително температурни гърчове), тъй като продуктът съдържа левоментол.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Ангал Ментол.



Обърнете специално внимание при употребата на хлорхексидин/лидокайн:

- ако имате температура, силни болки в гърлото или затруднено прегълъдане;
- ако имате сърдечна недостатъчност;
- ако приемате лекарства за лечение на сърдечни ритъмни нарушения (аритмия);
- ако имате влошена чернодробна функция;
- ако сте предразположени към реакции на свръхчувствителност.

Да се избягва контакт с очите. При попадане в очите, незабавно изплакнете с обилно количество чиста вода за поне 15 минути, дръжте клепачите отворени.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако някое от изброените предупреждения се отнася или се е отнасяло до Вас макар и в миналото.

Комбинацията хлорхексидин/лидокайн не е съвместима с някои вещества, които се срещат често в пластите за зъби. По тази причина, трябва да има поне 30 минути между употребата на Ангал Ментол спрей и миенето на зъбите.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако симптомите Ви не се повлияват или се влошават след 3-4 дни.

Деца

Не използвайте това лекарство при деца под 6-годишна възраст.

Други лекарства и Ангал Ментол

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, насконо сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, дори такива без лекарско предписание.

Не приемайте Ангал Ментол с лекарства, които потискат функцията на ензима холинестераза (неостигмин, дистигмин, пиридостигмин) и други лекарства за лечение на миастения (автоименно нарушение, което води до отслабване на мускулите Ви).

Изискава се повищено внимание при употребата на Ангал Ментол, ако приемате лекарства за лечение на нарушения на сърдечния ритъм (аритмия).

Да не се приема хлорхексидин/лидокайн с други лекарства за облекчаване на възпалено гърло (антисептици), поради възможни взаимодействия. Това не е приложимо, когато продуктите съдържат същите съставки. При едновременно приложение на таблетки за смучене и спрей, съдържащи хлорхексидин/лидокайн, да не се превишиава максималната дневна доза.

Комбинацията от спрей и таблетки за смучене да не се използва при деца.

Ангал Ментол с храна, напитки и алкохол

Препоръчва се, да не се употребяват храни и напитки един час след приложение на лекарството.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Ангал Ментол съдържа алкохол. Моля вижте „Ангал Ментол съдържа алкохол“.

Ако са спазени изброените предпазни мерки и предупреждения, Ангал Ментол може бъде използван при бременност и кърмене. Информирайте Вашия лекар, че приемате това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефекта на това лекарство върху способността за шофиране и работа с машини.

Ангал Ментол съдържа натрий и етанол.



Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 100 ml, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

Този лекарствен продукт съдържа малки количества етанол (алкохол) до 180 mg за 5 впръсквания, еквивалентни на 4,5 ml бира или 2 ml вино за 5 впръсквания.

Количеството алкохол в това лекарство може да повлияе способността Ви за шофиране или работа с машини. Причината за това е, че той може да повлияе на Вашата преценка и бързината на реакциите Ви. Ако имате епилепсия или чернодробни проблеми, говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете това лекарство. Количество алкохол в това лекарство може да промени начина, по който действат други лекарства. Говорете с Вашия лекар или фармацевт ако приемате други лекарства. Ако сте бременна или кърмите, говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете това лекарство. Ако имате алкохолна зависимост, говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете това лекарство.

3. Как да използвате Ангал Ментол

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възрастни и деца над 12-годишна възраст: 3 до 5 впръсквания, 6 до 10 пъти дневно.


Деца над 6-годишна възраст: 2 до 3 впръсквания, 3 до 5 пъти дневно.

Не използвайте това лекарство при деца под 6-годишна възраст.

Ангал Ментол спрей може да се комбинира с таблетки за смучене, но максималната дневна доза не трябва да се надвишава. Възрастните могат да използват и двете форми на лекарството до десет пъти дневно. Пример: ако вземете една таблетка за смучене, можете също да вземете девет дози спрей (3 до 5 впръсквания) в същия ден. Ако вземете две таблетки за смучене, можете също да вземете осем дози спрей в същия ден и т.н. Децата не трябва да използват комбинацията от спрей и таблетки за смучене.

Начин на приложение

1. Преди употреба, изправете апликатора перпендикулярно на бутилката.
2. Отворете широко устата, насочете апликатора към гърлото и натиснете бутона. По време на прилагането задръжте дъха.



В случай, че спреят няма да се използва за период от време, се препоръчва почистване на дозатора след последната употреба чрез следната процедура:

1. Спреят трябва да се обърне обратно и трябва да се натисне бутона, докато наличният в апликатора разтвор е отстранен (апликатора не пръска повече разтвор).
2. Апликаторът трябва да се откачи от бутилката и да се постави в топла вода за няколко минути.
3. Апликаторът се изважда от водата и се изчаква да се изсуши.



- За да се блокира механизма на бутилката, сухият апликатор трябва да се постави върху него, така че да сочи на долу.

Продължителност на приложение

Не използвайте хлорхексидин/лидокаин повече от 3-4 дни и не го ползвайте твърде често. Да се използва само за облекчаване на болката и намаляване на раздразнението от възпаленото гърло. Консултирайте се с Вашия лекар ако симптомите Ви не се повлияват или се влошават след 3-4 дни.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Ангал Ментол

Ако сте използвали хлорхексидин/лидокаин повече от колкото трябва, трябва да потърсите консултация с лекар или фармацевт.

При правилно използване рисъкът от предозиране е много малък.

Въпреки, че този лекарствен продукт е предназначен за локална употреба, съществува вероятност за предозиране поради грешка или невнимание, особено при деца.

Симптоми на предозиране могат да са: затруднено прегълъщане, главоболие, сънливост, умора, замаяност, шум в ушите, затруднено дишане, изтръпване около устата, нарушения на сърденчния ритъм, нарушение на говора или слуха, раздразнителност, понижаване на кръвното налягане, повръщане, замъглено виждане.

Ако сте пропуснали да използвате Ангал Ментол

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели да използвате Ангал Ментол

Не са необходими специални мерки.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако забележите някое от следните, спрете употребата на лекарството, свържете се незабавно с Вашия лекар или позвъните в най-близката болница:

- Подуване на ръцете, краката, глазените, лицето, устата или гърлото, което може да причини затруднение при прегълъщане и дишане;
- Обрив по цялото тяло;
- Уртикария;
- Загуба на съзнание.

Това са много сериозни нежелани реакции, които показват много тежка алергична реакция от лекарството. В такива случаи се изисква спешна медицинска помощ.

Могат да се появят следните нежелани реакции. Изброени са по честоти:

Много чести засягат повече от 1 на 10 человека

Чести засягат от 1 на 10 человека на 100

Нечести засягат от 1 на 10 человека на 1 000

Редки засягат от 1 на 10 человека на 10 000

Много редки засягат по-малко от 1 на 10 000 человека

С неизвестна честота от наличните данни не може да бъде направена оценка



Чести: гадене, повръщане, коремна болка, кожни реакции на свръхчувствителност

Редки: сърбящ обрив след контакт с лекарството, тежки реакции на свръхчувствителност, включително анафилактичен шок

Много редки: уртикария (копривна треска)

С неизвестна честота: сънливост, замаяност, загуба на ориентация, обърканост (също объркана реч), световъртеж, треперене, психоза, нервност, скващане, изтъръване, конвулсии, загуба на съзнание, кома, шум в ушите, беспокойство (може да е интензивно, с мускулна възбуда), еуфория, зрителни нарушения (включително замъглено или двойно виждане), затруднено прегълъщане, афти, преходна промяна във вкуса или парещо усещане по езика, усещане за горещина или студ, потрепвания или трепор на мускулите, кожна свръхчувствителност към слънчева светлина (отложено във времето) или други кожни или зъбни реакции, лющене на лигавицата, затруднено дишане, участено и повърхностно дишане, внезапен дихателен арест, загуба на сила и енергия, кръвни промени, характеризирани с главоболие, замаяност, умора, затруднено дишане и посиняла кожа.

Дългосрочна употреба на хлорхексидин в устната кухина може да доведе до преходно кафяво оцветяване на зъбите при някои хора. Оцветяването може да бъде почистено. Когато приложението е ограничено в областта на гърлото, не са докладвани случаи на оцветяване на зъбите.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Ангал Ментол

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхранява под 25°C.

Не използвайте Ангал Ментол след срока на годност, отбелаян на кутията/етикета след надписа "Годен до:". Първите два символа означават месеца, следващите два или четири символа-годината. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Ангал Ментол може да се използва до 3 месеца след първото отваряне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Политайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ангал Ментол

- Активните вещества са: хлорхексидинов диглюконат 2 mg/ml и лидокаинов хидрохлорид 0,5 mg/ml.
- Другите съставки са: етанол, глицерол, безводна лимонена киселина, левоментол, цинеол, захарин-натрий, пречистена вода.

Как изглежда Ангал Ментол и какво съдържа опаковката

Ангал Ментол е наличен в бутилка със спрей помпа, съдържаща 30 ml спрей за устна лигавица (абсорбция през лигавицата на устната кухина).



Притежател на разрешението за употреба

Sandoz d.d.

Verovškova 57,

1000 Ljubljana

Словения

Производители

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A.

Rijksweg 9, 2880 Bornem

Белгия

и

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57, 1526 Ljubljana,

Словения

Дата на последно преразглеждане на листовката

ММ/ГГГГ

