

Леветирацетам СТАДА Арцинеймител 500 mg филмирани таблетки
Levetiracetam STADA Arzneimittel 500 mg film-coated tablets

Леветирацетам СТАДА Арцинеймител 1000 mg филмирани таблетки
Levetiracetam STADA Arzneimittel 1000 mg film-coated tablets

Леветирацетам (Levetiracetam)

Прочетете внимателно цялата листовка преди Вие или Вашето дете да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признатите на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Леветирацетам СТАДА Арцинеймител и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Леветирацетам СТАДА Арцинеймител
3. Как да приемате Леветирацетам СТАДА Арцинеймител
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Леветирацетам СТАДА Арцинеймител
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Леветирацетам СТАДА Арцинеймител и за какво се използва
Леветирацетам СТАДА Арцинеймител съдържа активното вещество леветирацетам, което е антиепилептично лекарство (лекарство за лечение на пристъпите при епилепсия).

Леветирацетам СТАДА Арцинеймител се използва:

– самостоятелно при възрастни и юноши на възраст 16 и повече години с новодиагностицирана епилепсия за лечение на определена форма на епилепсия. Епилепсията е заболяване, при което пациентите имат повторящи се припадъци (пристипи). Леветирацетам се използва при форма на епилепсия, при която пристъпът първоначално засяга само едната страна на мозъка, но може след това да обхване по-големи зони от двете страни на мозъка (парциален пристъп със или без вторична генерализация). Леветирацетам Ви е назначен от Вашия лекар, за да се намалият броят на припадъците.

– като допълнение към други антиепилептични лекарства за лечение на:

- парциални пристъпи с или без генерализация при възрастни, юноши, деца и кърмачета на възраст 1 и повече месеца;
- миоклонични пристъпи (кратки, резки потрепвания на мускул или група мускули) при възрастни и юноши на възраст 12 и повече години с ювенилна миоклонична епилепсия;
- първично генерализирани тонично-клонични пристъпи (големи припадъци, включително загуба на съзнание) при възрастни и юноши на възраст 12 и повече години с идиопатична генерализирана епилепсия (форма на епилепсия, за която се присма, че има генетична причина).



- 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Леветирацетам СТАДА Арцинеймител**
Не приемайте Леветирацетам СТАДА Арцинеймител
- Ако сте алергични към леветирацетам, или към някоя от останалите съставки на Леветирацетам СТАДА Арцинеймител, изброени в точка 6.

Предупреждения и предпазни мерки

Ако имате бъбречни проблеми, следвайте лекарските указания. Вашия лекар може да препечни дали Вашата дозировка трябва да се коригира;

Ако забележите някакво забавяне на растежа или неочеквано развитие на пубертет на Вашето дете, моля информирайте Вашия лекар;

Ако забележите повишаване на тежестта на пристъпите (например, нарастване на броя им), моля информирайте Вашия лекар;

Малка част от хората, лекувани с антиепилептици като Леветирацетам СТАДА

Арцинеймител са имали мисли за самонараняване или самоубийство. Ако имате симптоми на депресия и/или мисли за самоубийство, моля обърнете се към Вашия лекар.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако някоя от следните нежелани реакции стане сериозна или продължи повече от няколко дни:

Ненормални мисли, чувство на раздразнителност или реагиране по-агресивно от обикновено, или ако Вие или Вашето семейство и приятели забележите важни промени в настроението или поведението.

Деца и юноши

Леветирацетам СТАДА Арцинеймител не е показана при деца и юноши под 16 години като самостоятелно лечение (монотерапия).

Други лекарства и Леветирацетам СТАДА Арцинеймител

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насърко сте приемали други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Леветирацетам СТАДА Арцинеймител може да се прилага по време на бременност само ако след внимателна оценка Вашият лекар счете, че е необходимо.

Не трябва да спирате лечението, без да го обсъдите с Вашия лекар. Не може да се изключи напълно риска от вродени дефекти за Вашето неродено дете. Не се препоръчва кърмене по време на лечението.

Шофиране и работа с машини

Леветирацетам СТАДА Арцинеймител може да повлияе върху способността за шофиране и работа с машини, тъй като може да предизвика сънливост. Това е по-вероятно в началото на лечението или след увеличаване на дозата. Не използвайте каквато и да е техника или машини докато се установи, че способността Ви да изпълнявате тези дейности не е засегната.

3. Как да приемате Леветирацетам СТАДА Арцинеймител

Винаги приемайте Леветирацетам СТАДА Арцинеймител точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Леветирацетам СТАДА Арцинеймител трябва да се приема два пъти дневно, веднъж сутрин и веднъж вечер, по едно и също време всеки ден.

Приемайте предписания брой таблетки точно както Ви е казал Вашия лекар.



Леветирацетам СТАДА Арцинаймител трябва да се приема два пъти дневно, веднъж сутрин и веднъж вечер, по едно и също време всеки ден.

Монотерапия

Дозировка при възрастни и юноши (от 16-годишна възраст):

Обичайна доза: между 1000 mg и 3000 mg всеки ден.

Когато първоначално започнете да приемате Леветирацетам СТАДА Арцинаймител, Вашият лекар ще Ви предпише по-ниска доза в продължение на 2 седмици, преди да Ви даде най-ниската обичайна доза.

Например: ако дневната Ви доза е 1 000 mg, Вие можете да приемате по 500 mg сутрин и по 500 mg вечер.

Допълващо лечение

Дозировка при възрастни и юноши (12-17 години) с тегло 50 kg или повече:

Обичайна доза: между 1000 mg и 3000 mg всеки ден.

Например: ако дневната Ви доза 1000 mg, Вие можете да приемате по 500 mg сутрин и по 500 mg вечер.

Дозировка при кърмачета (1 - 23 месеца), деца (2 - 11 години) и юноши (12-17 години) стегло под 50 kg:

Вашият лекар ще предпише най-подходящата форма на Леветирацетам СТАДА Арцинаймител съобразно възрастта, теглото и дозировката.

Пероралният разтвор е по-подходяща форма за кърмачета и деца на възраст под 6 години и за деца и юноши (от 6 до 17 години) с тегло под 50 kg и когато таблетките не позволяват точно дозиране.

Начин на приложение:

Поглъщайте таблетките Леветирацетам СТАДА Арцинаймител с достатъчно количество течност (например чаша вода).

Може да приемате Леветирацетам СТАДА Арцинаймител със или без храна. След перорално приложение може да се усети горчивият вкус на леветирацетам.

Продължителност на лечението:

- Леветирацетам СТАДА Арцинаймител се прилага за хронично лечение. Вие трябва да приемате Леветирацетам СТАДА Арцинаймител толкова продължително, колкото Ви е посъветвал Вашия лекар.
- Не спирайте лечението с Леветирацетам СТАДА Арцинаймител без съвет от Вашия лекар, тъй като това може да увеличи пристъпи Ви.

Ако сте приели повече от необходимата доза Леветирацетам СТАДА Арцинаймител
Възможните нежелани лекарствени реакции при предозиране на Леветирацетам СТАДА Арцинаймител са сънливост, тревожност, агресия, намалено внимание, потискане на дишането и кома.

Уведомете Вашия лекар, ако сте приели повече от необходимите таблетки. Вашият лекар ще предприеме най-добрите възможни мерки при предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете Леветирацетам СТАДА Арцинаймител

Уведомете Вашия лекар, ако сте пропуснали една или повече дози.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на Леветирацетам СТАДА Арцинаймител:



При спиране на лечението, както и при другите антиепилептични лекарства, Леветирацетам СТАДА Арцинеймител трябва да се прекъсва постепенно с цел избегване увеличаване на пристъпите.

Ако Вашият лекар реши да спре лечението с Леветирацетам СТАДА Арцинеймител, ще Ви обясни как постепенно да спрете приема.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства Леветирацетам СТАДА Арцинеймител може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Незабавно уведомете Вашия лекар или отидете до най-близкия център за спешна медицинска помощ, ако получите:

- слабост, чувство за премляване или замайване или имате затруднено дишане, тъй като те могат да са признаки на тежка алергична (анафилактична) реакция;
- подуване на лицето, устните, езика и гърлото (едем на Квинке);
- грипподобни симптоми и обрив по лицето, последвани от обширен обрив с висока температура, повишени стойности на чернодробните ензими, наблюдавани при изследвания на кръвта и повишаване на определен вид бели кръвни клетки (еозинофилия) и увеличени лимфни възли (лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми [DRESS]);
- симптоми като малък обем урина, умора, гадене, повръщане, обърканост и подуване на краката, глезните или стъпалата, тъй като това може да бъде признак на внезапно намаляване на бъбречната функция;
- кожен обрив, при който може да се образуват мехури и да изглежда като малки мищени (тъмно петно в центъра, заобиколено от по-светла област с тъмен пръстен около ръба) (еритема мултиформе);
- широко разпространен обрив с мехури и лющене на кожата, особено около устата, носа, очите и половите органи (синдром на Стивънс-Джонсън);
- по-тежка форма на обрив, причиняващ лющене на кожата на повече от 30% от повърхността на тялото (токсична епидермална некролиза);
- признаки на сериозни психични промени или ако някой около Вас забележи признаки на обърканост, сомнолентност (съниливост), амнезия (загуба на памет), нарушения на паметта (забравяне), необичайно поведение или други неврологични признаки, включително неволеви или неконтролирани движения. Това може да са симптоми на енцефалопатия.

Най-често съобщаваните нежелани реакции са назофарингит, съниливост, главоболие, умора и замаяност. В началото на лечението или при увеличаване на дозата, нежеланите реакции, като съниливост, умора и замаяност може да са по-чести. Тези реакции ще намаляват с времето.

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти)

- Назофарингит;
- сомнолентност (съниливост), главоболие.

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 пациенти)

- анорексия (загуба на апетит);
- депресия, враждебност или агресивност, тревожност, безсъние, нервност или раздразнителност;
- конвулсия, нарушение в равновесието (загуба на равновесие), замайване (чувството на нестабилност), летаргия (липса на енергия и ентузиазъм), треперене (неволно треперене).



- вертиго (чувство на световъртеж);
- кашлица;
- болки в корема, диария, диспепсия (смущение в храносмилането), повръщане, гадене;
- обрив;
- астения/ умора (изтощение).

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 пациенти

- намален брой тромбоцити, намален брой левкоцити;
- намаляване на теглото, повишаване на теглото;
- опит за самоубийство и мисли за самоубийство, психични разстройства, необичайно поведение, халюцинации, гняв, объркване, паническа атака, емоционална нестабилност/промени в настроението, беспокойство;
 - амнезия (загуба на памет), нарушения на паметта (забравяне), нарушена координация/атаксия (липса на координация на движенията), парестезия (изтръпване), нарушение на вниманието (загуба на концентрация);
 - диплопия (двойно виждане), замъглено зрение;
 - отклонение от нормалните стойности на резултатите от изследване на черния дроб;
 - косопад, екзема, пруритус;
 - мускулна слабост, миалгия (болка в мускулите);
 - нараняване.

Редки: могат да засегнат до 1 на 1000 пациенти

- инфекция;
- намален брой на всички видове кръвни клетки;
- тежки алергични реакции (DRESS, анафилактична реакция [тежка и значима алергична реакция], оток на Квинке [подуване на лицето, устните, езика и гърлото]);
- намаление на концентрацията на натрий в кръвта;
- самоубийство, личностни нарушения (поведенчески проблеми), промяна в мисленето (забавено мислене, невъзможност за концентрация);
- делириум;
- енцефалопатия (вижте подточка „Незабавно уведомете Вапия лекар“ за подробно описание на симптомите);
- неконтролирани мускулни спазми засягащи главата, тялото и крайниците, трудност при контролиране на движенията, хиперкинезия (повишен активност);
- панкреатит;
- чернодробна недостатъчност, хепатит;
- внезапно намаляване на бъбренчната функция;
- кожен обрив, който може да е под формата на мехури и да изглежда като малки мищени (тъмни петна в центъра, заобиколени от по-бледи зони, с тъмен пръстен около ръба) (еритема мултиформе), широко разпространен обрив с мехури и лющене на кожата, особено около устата, носа, очите и половите органи (синдром на Стивънс-Джонсън) и по-тежка форма, причиняваща лющене на кожата в повече от 30% от повърхността на тялото (токсична епидермална некролиза).
- рабдомиолиза (разрушаване на мускулната тъкан) и свързано повишение на креатинин фосфокиназата в кръвта. Значително по-високо разпространение се наблюдава при пациенти от японски произход в сравнение с пациенти от неяпонски произход.
- накуцване или затруднено ходене.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вапия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:



Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ №8
1303 София
тел.: +3592 8903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Леветирацетам СТАДА Арциймител

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте лекарството след срока на годност отбелзан върху картонената кутия и блистера след “Годен до:”

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Леветирацетам СТАДА Арциймител:

Активното вещество е леветирацетам.

Леветирацетам СТАДА Арциймител 500 mg филмирани таблетки

Всяка таблетка съдържа 500 mg леветирацетам.

Помощни вещества:

Ядро на таблетката: кросповидон (тип В) (E1202), Повидон К30, колоиден, безводен силициев диоксид (E551), магнезиев стеарат (E470b).

Филмово покритие:

Леветирацетам СТАДА Арциймител 500 mg филмирани таблетки

Хипромелоза (E464), макрогол /PEG 400 (E1521), титанов диоксид (E171), талк (E553b), жълт железен оксид (E172).

Леветирацетам СТАДА Арциймител 1000 mg филмирани таблетки

Всяка таблетка съдържа 1000 mg леветирацетам.

Помощни вещества: Ядро на таблетката: кросповидон (тип В) (E1202), Повидон К30, колоиден, безводен силициев диоксид (E551), магнезиев стеарат (E470b).

Филмово покритие:

Леветирацетам СТАДА Арциймител 1000 mg филмирани таблетки

Хипромелоза (E464), макрогол /PEG 400 (E1521), титанов диоксид (E171), талк (E553b).

Как изглежда Леветирацетам СТАДА Арциймител и какво съдържа опаковката

Леветирацетам СТАДА Арциймител 500 mg са жълти, елипсовидни, двойноизпъкнали таблетки с делителна черта от едната страна и размери 16,5 mm x 7,7 mm. Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.



Леветирацетам СТАДА Арцнаймител 1000 mg са бели, елипсовидни, двойноизпъкнали филмирани таблетки с делителна черта от едната страна, с размери 19,2 mm x 10,2 mm. Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.

Блистерните опаковки Леветирацетам СТАДА Арцнаймител съдържат 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120 или 200 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката

Април 2022

